

**تشخيص الأمراض
النفسية للراشدين**
مستمدة من

**DSM-4
&
DSM-5**



أ.د. محمد أحمد شلبي
أ.د. محمد إبراهيم الدسوقي
د. زيزى السيد إبراهيم



مكتبة الأنجلو المصرية

الفهرس

الفصل الأول

المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الاضطرابات النفسية لدى الراغبين: نسخة عربية مستندة إلى الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع DSM-4

١٠	- تمهيد.....
١٣	- مشكلة الدراسة.....
١٦	- المقابلات الإكلينيكية الشائعة لتشخيص الاضطرابات النفسية.....
٢٠	- أدوات الفحص السريع.....
٢٢	- الدراسات السابقة.....
٢٥	- منهج البحث وإجراءاته.....
٢٥	- عينة البحث.....
٢٨	- وصف بناء "المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الاضطرابات النفسية لراغبين".....
٣٠	- إجراءات التحقق من الصلاحية القياسية (السيكومترية) للمقابلة الإكلينيكية ونتائجها.....
٣٨	المراجع.....

الفصل الثاني

نص المقابلة الإكلينيكية

لتشخيص الاضطرابات النفسية DSM-4

٤٥	التعليمات.....
٤٧	مسح عام للأعراض والمشكلات النفسية المرضية.....
٥٠	الفصام.....
٥١	أولاً: توهمات (هذاءات).....
٥٢	ثانياً: الهلوس.....
٥٣	ثالثاً: اضطراب التفكير.....
٥٥	الفصام.....

DSM-4 & DSM-5

٥٥	أنواع الفصام
٥٦	المجموعة الأولى: معايير تشخيص أنواع الفصام
٦٠	المجموعة الثانية: الفصام الهدانى (البارانويا)
٦٢	المجموعة الثالثة: ذهان الهلاوس البصرية والسمعية
٦٣	الاكتاب
٦٣	نوبية الاكتاب الأساسية أو العظمى
٦٤	أنواع الاضطراب الاكتابي
٦٥	نوبات الهوس
٦٨	الهوس النوعى
٦٩	اضطراب القلق العام
٧١	الوسواس القهري
٧٢	أولاً: الوسواس
٧٢	ثانياً: الأفعال القهريّة
٧٣	اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة
٧٥	اضطراب الضغط الحاد
٧٧	الهلع ورعب الأماكن المفتوحة أو الواسعة
٨٠	الرعب
٨٢	اضطرابات الجسمية نفسية المنشأ
٨٨	اضطراب الجسمى الشكل غير المحدد
٨٨	اضطرابات الشخصية
٩٠	الفئة (أ) من اضطرابات الشخصية
٩٢	الفئة (ب) من اضطرابات الشخصية
٩٥	الفئة (ج) من اضطرابات الشخصية

الفصل الثالث

تشخيص اضطرابات النفسية

لدى الراسدين: نسخة عربية مستندة

إلى الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس DSM-5

١٠٣	معايير تشخيص الفصام
١٠٤	المجموعة الأولى: معايير تشخيص أنواع الفصام
١٠٦	المجموعة الثانية: الفصام البارانويا والتوهمى (الضلالات)
١٠٩	المجموعة الثالثة: ذهان الهلاوس البصرية أو السمعية
١١٠	الاكتاب

١١٠	الاضطراب ثنائي القطب
١١٠	الاضطراب والأعراض
١١٧	الاضطراب الدوري (النوابي)
١١٩	الاضطرابات الافتتاحية
١٢٩	اضطراب قلق الانفصال
١٣٠	الصمت الانتقائي
١٣١	الرهاب النوعي
١٣٢	اضطراب القلق الاجتماعي
١٣٣	اضطراب الهلع
١٣٥	نوبة الهلع النوعي
١٤٢	اضطراب القلق غير النوعي (غير المحدد)
١٤٣	أولاً: الوساوس
١٤٤	ثانياً: الأفعال القهيرية
١٥٩	الجسمية والاضطرابات ذات الصلة
١٦٥	اضطرابات الشخصية
١٦٧	الفئة (أ) من اضطرابات الشخصية
١٧٠	الفئة (ب) من اضطرابات الشخصية
١٧٤	الفئة (ج) من اضطرابات الشخصية

الفصل الأول
المقابلة الإكلينيكية
لتشخيص الأضطرابات النفسية
 لدى الراشدين: نسخة عربية مستندة إلى
 الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع والخامس



الفصل الأول

المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الأضطرابات

النفسية لدى الراشدين: نسخة عربية مستندة

إلى الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع DSM-4^(١)

أ.د / محمد أحمد شلبي
قسم علم النفس - جامعة المنيا

أ.د / محمد إبراهيم الدسوقي
قسم علم النفس - جامعة المنيا

د / زيزي السيد إبراهيم
قسم علم النفس - جامعة المنيا

تهدف الدراسة الحالية إلى بناء أداة تشخيصية للأضطرابات الإكلينيكية للراشدين تتسم بالشموليّة وبساطة الاستخدام معاً. هذه الأداة أعدت لتشخيص الأضطرابات النفسية (المحور الأول) وأضطرابات الشخصية مشقة من DSM-IV. وهي عبارة عن مقابلة إكلينيكية مبسطة يستخدمها اختصاصي علم النفس أو اختصاصي الطب النفسي في عمل تشخيصات لمشكلات المرضى. تم التحقق من ثبات وصدق المقابلة، وذلك بتطبيقها على عينة مرضية (ن = ٤٠) بمستشفيات وعيادات الطب النفسي بمدينة المنيا تتواءٍ مع التصنيفات الإكلينيكية لهم بعضهم من المرضى الداخليين (ن = ٣٦) وعدد من المرضى المترددين على العيادات الخارجية (ن = ٤) وقام الباحثين بحساب ثبات القائمين بالتقدير على عدد ١٢ حالات مرضية وكانت قيمته

١ - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-4)

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلفين
الراسلات الخاصة بهذه الأداة تم مع المؤلف الأول
المجلة المصرية لعلم النفس الإكلينيكي والإرشادي (٢٠١٣)، مجلد (١)، ٢، ص ص ١٦٦-٢٠٨

مرتفعة (٩٧، ٩٩)، كما تم حساب صدق المحك من خلال الارتباط بين تشخيص الطبيب النفسي المعالج للحالة والتشخيص الذي تسفر عنه المقابلة الإكلينيكية وكانت قيمته مرتفعة كذلك (٩٧، ٩٠). استخدم كذلك صدق المحكمين وحسبت نسبة الاتفاق على ملاءمة البنود ومدى كفايتها للتشخيص. وأخذت اقتراحات خبراء الطب النفسي المشاركون في التحكيم في الاعتبار. تشير النتائج بصفة عامة إلى دقة الأداة وكفاءتها الواضحة للـ "المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الأمراض النفسية للراشدين" في المساعدة في عملية التشخيص السينكانتري. وتقوّت في عدد من الجوانب حيث أثاحت للقائمين بالتقدير اكتشاف الأنماط النوعية من الأضطرابات كما ساهمت الأداة بشكل ناجح في الكشف عن التشارك المرضي Co-morbidity حيث قدمت بروفيلاً كاملاً لما يعاني منه المريض من أعراض كافية لتشخيصه تحت فئات أخرى من الأضطراب النفسي. تعد النتائج الأولية لتقنيين المقابلة واعدة وتتبّي بالكثير من الشمولية والدقة في تشخيص الأضطرابات النفسية الشائعة لدى الراشدين وتتنسّم بالبساطة كذلك في طريقة الاستخدام والتصرّح، كما تم وضع عدد من التوصيات لبحوث قادمة حول الأداة.

تمهيد :

هناك مرحلتان بارزتان في عملية جمع المعلومات الإكلينيكية وفي اتخاذ القرار المتعلق بالصعوبات والأضطرابات النفسية والانحرافات السلوكية التي تواجه العميل. المرحلة الأولى جمع المعلومات بطريقة تتسم بالكافية، حيث يقوم الاختصاصي النفسي الإكلينيكي خلالها بوضع الفروض حول مشكلات المريض وأسبابها وصياغة تلك الفروض حول ما قد يكون قد ساهم في ظهور أو استمرار تلك المشكلة وتفاقمها (ليندزاي & بول، ٢٠٠٠، ص ٣). أما المرحلة الثانية من جمع المعلومات فتتعدد في التعامل بطريقة تتسم بالمرونة والдинامية مع ما يتوفّر من معلومات وترتيبها بصورة انتقائية تمكننا من اختبار الفروض حول الحالة وتحديد أولويات التدخل المبني على تقدّيرات دقيقة للمزاج أو السلوك المضطرب. والأدوات التي تُستخدم في جمع المعلومات الأولية ومعلومات دراسة الحالة المرضية تعد بذلك هي حجر الزاوية لتكوين فهم علمي دقيق يمكن الاختصاصي

الإكلينيكي من وضع فروض صحيحة حول طبيعة الاضطراب ومن ثم اتخاذ القرارات السليمة في إجراءات التدخل العلاجي وإدارة الحالة. والعديد من أدوات التشخيص الإكلينيكي للأمراض النفسية أصبح متوفراً في يد الاختصاصي الإكلينيكي ومتاح للاستخدام. ولكن تبقى مشكلة تتعلق بالرضا عن كفاءة الأدوات المستخدمة حالياً والتي يعتمد بعضها على المقاييس التي تعتمد على أسس قياسية (سيكومترية) أو تعتمد على تصنيفات الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (د ت ح ض ن) DSM-IV. والقضية المهمة التي يجب مناقشتها هنا، هي المواقف المثلثة للأداة التي يستخدمها الاختصاصي النفسي الإكلينيكي لجمع المعلومات واختبار الفرض؟. فالرغم من أن عدّى من الأدوات متاحة إلا أنها تتّوّع في طريقة التطبيق والحصول على نتائج من خلالها، كما تتّوّع أيضاً في درجة البساطة والتعقيد في البناء وطريقة الاستخدام والكفاءة في التشخيص. وبالرغم من القيمة التشخيصية لبعض الأدوات المتاحة للاختصاصي النفسي الإكلينيكي والطبيب النفسي، إلا أن عدم البساطة في استخدام الأداة والتقييدات الإجرائية لها قد تجعل المختصين متخوفين من استخدامها. فمثل هذه الأدوات برغم ما قد تقدمه من معلومات تفصيلية حول الحالة إلا أنها تتطلب من الاختصاصي الإكلينيكي انتباها حاداً وتقطّعاً شديداً لمواضع الانتقال والتوقف والتحول من جزء إلى آخر وغيره مما قد يكون من الصعب عمله مع الاختصاصيين المبتدئين أو غير الحاصلين على تدريبات متخصصة حول استخدام تلك الأدوات (مثال ذلك مقابلة الإكلينيكية لتشخيص الاضطرابات النفسية Structured Clinical Interview for DSM-IV SCID المبنية عن الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع DSM-IV 1994 (ابراهيم، ٢٠٠٤، ابراهيم ٢٠٠٦).

إن الاعتماد على الدراسات المفردة للحالات تعد مصدراً ثرياً لجمع المعلومات التي تيسر التشخيص الإكلينيكي وإدارة الحالة. ويؤكد ذلك عديد من الباحثين والعلماء (ليندساي وباؤل، ٢٠٠٠) والفحص الدقيق والشامل للحالة يقدم للاختصاصي النفسي الإكلينيكي معلومات تتسم بالدقة والكفاية والمصداقية التي ترفع جودة قرارات التدخل العلاجي وإدارة الحالة بالاشتراك مع فريق العمل. واستخدام دراسة الحالة من أجل جمع معلومات

كافية ودقيقة تتطلب عديداً من المهارات والأدوات النفسية التي تمكن الاختصاصي النفسي الإكلينيكي من جمع المعلومات بطريقة تسم بالتنظيم والمصداقية والملاءمة كذلك. وتعد اختبارات التشخيص من الأدوات التي تعين القائم بجمع المعلومات على الوصول إلى توصيف دقيق لما هو موجود من أعراض ومظاهر للاضطراب لدى المريض. مع ملاحظة أن أدوات التشخيص التي تبني على أنظمة التصنيف العالمية للأمراض النفسية تتوزع في بنائها، منها المقاييس التي تهتم بتشخيص واحد من الاضطرابات الإكلينيكية بشكل منفرد؛ مثل ذلك: مقاييس لتشخيص اضطراب الشخصية الوسواسية وفقاً للدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للاضطرابات النفسية (Samuel, & Obsessive - Compulsive Personality Disorder Scales Widiger, 2010).

ومقياس تشخيص اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة Post traumatic Diagnostic Scale الذي أعدته "ادنا فوا" وزملاؤها Foa, et al 1997 وتم تحريره وترجمته للغات عديدة؛ منها تحريره باللغة الفرنسية على يد "هيران" وأخرون (Heran et al. 2011)، وكذلك مقياس تشخيص اضطراب الوجданى Bipolar disorder (Zimmerman, M., et Zimmerman, M., et al. 2010). وتشخيص الاكتئاب الأساسي Major depressive disorder كما حدثه "زيمerman" وزملاؤه (Zimmerman, M., et al 2010) وغير ذلك من المقاييس التي تختص بتقدير وتشخيص اضطراب واحد أو زمرة لأحد الاضطرابات النفسية، وهذا هو النوع الأكثر انتشاراً من المقاييس التشخيصية. وعلى الجانب الآخر نجد الاختبارات التشخيصية الشاملة، وهي نادرة نسبياً في التراث، وتكون في صورة مقابلة إكلينيكية تشخيصية من خلالها يتم تقدير مختلف الاضطرابات النفسية الإكلينيكية وليس اضطراباً واحداً. ومن أمثلة هذه المقابلات الشاملة المقابلة الإكلينيكية المبنية على الدليل التشخيصي الرابع للاضطرابات النفسية. وفي الدراسات العربية نجد أن الأدوات التشخيصية الشاملة تكاد تكون غير متوفرة، وإن استخدمت فقد تستخدم بطرق فردية حيث أنها لم يتوفّر لها ترجمة وتعريف للتأكد من صلاحيتها القياسية (السيكومترية) بطرق منهجية محكمة.

ويمثل البحث الحالي محاولة علمية جادة لبناء مقابلة مقننة للتشخيص الطب النفسي (السيكاني) للاضطرابات النفسية الإكلينيكية المحور الأول للراغبين، وذلك بهدف توفير أداة تشخيصية شاملة ومحكمة منهgia لتعيين الاختصاصي النفسي الإكلينيكي والقائمين بالتشخيص السيكاني من عمل تشخيصات دقيقة لمشكلات المرضى وفقاً للنظم التصنيفية الحديثة.

مشكلة الدراسة :

لا تزال مشكلة فحص الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية من المعضلات العلمية، وتمثل مشكلة في مجال الخدمة النفسية، وقد أجريت بحوث عديدة لاستخدام تصنيفات DSM-IV (د ت ح ض ن) في شكل مقابلات نفسية إكلينيكية مقننة - سيعرض أهمها في جزء لاحق في هذا البحث - ولكن تظل هناك مشكلة في تقدير الدرجات، فإن الاختيارات المتاحة في اعتمادها على الجمع المتواصل للدرجات قد توقع القائم بالتشخيص في خطأ واقعى وتجربى نتيجة العيوب المرتبطة بمقاييس التقرير الذاتي (صفوت فرج، ١٩٨٥)، (عبد الخالق، ٢٠٠٠) في التشخيص الإكلينيكي. ومثال على ذلك الدرجة التي يحصل عليها شخص في قائمة "بيك" لتقدير الاكتئاب قد تكون على النحو التالي:

- صفر = لا يوجد
١ = يوجد بدرجة طفيفة
٢ = يوجد بدرجة متوسطة
٣ = يوجد بدرجة شديدة.

وإذا تم تجميع الدرجات (جميعها) فإن الشخص الذي يختار (٣) في بنود قليلة قد لا يشخص على أنه مريض بالاكتئاب، بينما الذي يختار خمسة بنود (بدرجة طفيفة أو متوسطة) قد يشخص بالمرض، على الرغم من أنه طبقاً لـ DSM-IV فإنه شدة الأعراض هي المحك الذي يشخص أن الفرد مريض وبشدة، ولذلك حاولنا في الدراسة الحالية أن نجمع بين مزايا DSM-IV وتقديم طريقة مقتصرة لحساب الدرجات تبعاً لل اختيار الأعلى فقط. وهنا يجب الإشارة إلى أهمية إعطاء وزن نسبي لبنود المقاييس خاصة في المجال الإكلينيكي والشخصية، حيث أن البنود لا تكون بالقيمة نفسها لدى الفرد أو

لدى كل الأفراد، فهناك بنود محورية وهامة للغاية في حياة الفرد أكثر من غيرها. (شلبي، ١٩٨٩؛ ١٩٩٥؛ ٢٠٠٥؛ شلبي، الضوى، هاشم، ٢٠٠٠) وبهتم البحث الحالي ببناء أداة تشخيصية تتسم بالمصداقية والبساطة للاضطرابات النفسية والتغلب على انخفاض الكفاءة التشخيصية لعديد من الأدوات النفسية في تشخيص الأمراض النفسية رغم أن بعضها منها مثل استئناف منيسوتا المتعدد الأوجه الشخصية MMPI واستئناف آيزنك الشخصية EPQ ، لازال يستخدما حتى الآن، ولكن بدون أي حماس سواء من الطبيب النفسي أو الاختصاصي الإكلينيكي حيث أن الأول (MMPI) يحتاج لوقت للتطبيق، واعتماده على تصنیفات قديمة للاضطرابات وعدم توافق البنود مع (د ت ح ض ن) DSM-IV والمقياس الثاني EPQ (آيزنك الشخصية) لا يتسم بالكفاءة في تشخيص الأمراض مثلًا مقياس العصبية الجمع بين القلق والاكتئاب والوسواس والرهاب والأمراض الهستيرية، وهذا لا ينطبق على الواقع، فكل مرض مظاهره الخاصة، ويجب أن لا الخلط بينها وبين بعضها بعضا.

وكذا الحال في قائمة "بك" للاكتتاب فإن الدراسات الحديثة توصي بعدم استخدام هذه القائمة في التشخيص، ولكن فقط في قياس شدة المرض (ليندساي وباؤل ٢٠٠٠).

نقد الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع المعدل (د ت ح ض ن) نظام تصنیفي فنوي:

يذكر الصبوة (الصبوة، م، ٢٠١١) أن هناك مجموعة من الانتقادات توجه لتصنيف (د ت ح ض ن) وهي:

- ١ - ينتقد بعض علماء النفس مفهوم الفئات حيث لا يوجد بها مستويات مترجة، مثلًا السمة غير موجودة (١) ثم موجودة بدرجة بسيطة (٢) ثم بدرجة متوسطة (٣) ثم بدرجة فوق متوسطة (٤) ثم موجودة بدرجة شديدة (٥)، حيث يقع كل فرد على نقطة معينة خاصة بعد نفسى معين، مثلًا سمه الانبساط يفترض أن (x) يحصل على درجة ١٥ ويشير ذلك إلى أن السمة لدى الفرد هي فوق متوسط الجمهور

العام إذا كان المقياس مقنن. وهذا عكس ما يحدث في الفئات حيث يتم وصف الفرد إما مريض وإما غير مريض ولا درجة وسطى.

ويتبين أغلب علماء النفس مفهوم البعد، وهذا المصطلح بحاجة للمراجعة فالظواهر النفسية ليست مماثلة للظواهر الطبيعية، ويبدو أن الأنساب للإستخدام هي المناهج الكيفية وهذا ما يتم في مجال الطب النفسي والذي يعتمد على الملاحظات والخبرة الإكلينيكية وليس من خلال المعاملات الإحصائية.

- ٢- ينتقد بعض علماء النفس قلة البحوث التي تستخدم مفاهيم القياس النفسي مثل الثبات والصدق للتحقق من تصنيفات الدليل التشخيصي الرابع (د ت ح ض ن)، مع ملاحظة أن المنهجية الصارمة لا تقييد كثيرة ميدان الاضطرابات النفسية وكذلك علم الشخصية، حيث لا يقدم علماء النفس نظريات متقدمة بشأنها، بل أن علماء النفس لا يتفقون على مصطلحات متقدمة على تعريفها الإجرائي.

ويذكر الصبوة (المرجع السابق) عدة مزايا لتصنيفات الدليل التشخيصي الرابع للاضطرابات النفسية (د ت ح ض ن):

١- أن هذا التصنيف ييسر التواصل المهني وترامك للمعرفة العلمية بشأن الاضطرابات النفسية.

٢- أن هذه التصنيفات توظف في المجال الإكلينيكي، كما أنها غير مرتبطة بالنظريات والتي لا يتفق بشأنها علماء النفس مثل نظرية التحليل النفسي.

٣- التشخيص الدقيق (طبقاً لمفهوم الفئات) ييسر اختيار العلاج المناسب للمربيض.

وتقترح المقابلة الإكلينيكية المقترنة في الدراسة الحالية ما يلي:

- إضافة محركات إضافية في تشخيص الفيروس.
- وإضافة الفيروس المبكر كفئة مرضية إضافية في الفيروس.
- وتم تقسيم الفيروس إلى ثلاثة مجموعات تتسم الأولى بالتدبر العقلي والثانية تتسم بالمحافظة على القدرات العقلية وتتسم الثالثة بوجود عرض واحد مع وجود تكامل وسواء في الشخصية.

- وتم إضافة أعراض إضافية لمرض الاكتئاب.
- وتم إضافة أعراض إضافية لمرض القلق.
- ويتم التعامل مع الوساوس العقلية والأفعال الفهارية باعتبارها من مصدر عقلي واحد وتنتمي لفئة واحدة.
- وكما تم فصل بعض الجمل التي تتضمن عرضين إلى جملتين منفصلتين وذلك فيأغلب الحالات الأضطرابات النفسية بالمقابلة.

وتهدف الدراسة الحالية إلى إعداد أدلة التشخيص الأضطرابات النفسية التي تمثل المحور الأول وهي مشتقة من (د ت ح ض ن) DSM-IV وتتضمن أيضاً أضطرابات الشخصية، وهي تصنف ضمن المحور الثاني من الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للأضطرابات النفسية DSM-IV عن طريق تكوين مقابلة إكلينيكية مبسطة يستخدمها اختصاصي علم النفس أو اختصاصي الطب النفسي حيث تقدم طريقة تصحيح جديدة للبنود، وهي تجمع بين مزايا المقابلة الإكلينيكية والمقاييس النفسية التقليدية.

ويتمثل تساؤل الدراسة في الآتي:

هل يمكن بناء مقابلة تشخيص الأضطرابات النفسية تجمع بين الفئات المرضية كما يصفها دليل التشخيص الرابع للأضطرابات النفسية (د ت ح ض ن)، وبين المقاييس النفسية التقليدية التي تخضع للمواصفات القياسية (السيكومترية)؟

وهل استخدام طريقة جديدة في حساب قيم البنود (مبني على الوزن النسبي لكل بند) سيوفر الطريقة المناسبة للتشخيص؟

المقابلات الإكلينيكية الشائعة لتشخيص الأضطرابات النفسية :

شهدت العقود الأربع الماضية استخدام وتطوير مقابلات مقننة وشبه مقننة لتشخيص الأضطرابات النفسية، وهناك عدم قناعة بما وصل إليه حال التشخيص النفسي، وأظهرت عدد من البحوث التقليدية بوجود عدم اتفاق بين الأساليب المختلفة لتشخيص الأضطرابات النفسية.

ونعرض بياجاز للمقابلات المقننة ونصف المقننة والواسعة الاستخدام، والأدوات المستخدمة جميعها مصممة للراشدين لتشخيص

المقابلة الإكلينيكية لتشخيص اضطرابات النفسية لدى الراغبين: DSM-4

الاضطرابات النفسية (الموجودة في المحور الأول لـ DSM-IV)، حيث يتم تطبيق بنود فئة مرضية معينة وليس كل الأسئلة المتاحة في المقابلة.

ذكر سومرفيلد وأنطونى (Summerfeldt & Antony, 2002: ch 1) أن هناك سبعة أدوات واسعة الاستخدام :

أولاً: جدول المقابلة الإكلينيكية لتشخيص اضطرابات القلق :

Anxiety Disorder interview schedule for DSM-IV (ADIS-IV) ومقاييس ADIS-IV نصف مقن، وهو عبارة عن مقابلة إكلينيكية تشخيصية لاضطرابات القلق طبقاً لمحكمات (دت ح ض ن) DSM-IV، وتشمل تشخيص اضطرابات المزاجية، والجسمانية وأضطرابات التعاطي. وهو واسع الانتشار بين الباحثين لتشخيص اضطرابات القلق. وهي مصممة للاستخدام في المجال الإكلينيكي والبحث العلمي.

وهناك صورتان للمقياس، والنسخة المعيارية تمد الأخصائي بمعلومات عن التشخيص الحالي فقط، وهناك النسخة (الصورة) الثانية - HDIS-IV II، وتمدنا بمعلومات تشخيصية للزمن الحالي والماضي.

ثانياً: جدول المقابلة الشخصية (DIS): Diagnostic Interview schedule

و هذا المقياس مقن بالكامل وهو مصمم للمتخصص والرجل العادي لتشخيص مدى واسعاً من اضطرابات النفسية وملامحها (مثل مدتها ومتى بدأت والعلاج المستخدم) وقد صدرت النسخة الكاملة الحديثة منها عام 1995 (DIS-IV) وظهرت النسخة الأولى عام 1978 لاستخدامها مع الأعداد الكبيرة في البحوث الوبائية.

ومقياس (DIS) مصدر أساسى للمقابلة التشخيصية الدولية المركبة (DIDI) composite international diagnostic interview (CIDI)، نسخة موسعة عن (DIS) حيث يسمح بـ

أ - البحوث الوبائية عبر الثقافات المختلفة.

ب - التشخيص طبقاً لـ (دت ح ض ن) DSM (والتصنيف الدولى للأمراض النفسية (ت د م ن). International classification of diseases ICD لمنظمة الصحة العالمية الصورة الحديثة لـ CIDI

DSM-4 & DSM-5

مصممة لكي تتسق وتوافق DSM-IV (د ت ح ض ن) وكذلك النسخة العاشرة من (ICD-10) وهي (2.1)

ثالثاً: تقويم الرعاية الأولية للأضطرابات العقلية :

Primary care Evaluation of mental disorder (PRIME-MD)

وهو أداة موجزة (مختصرة) سهلة التقديم ونصف مقننة وتستخدم للتشخيص السريع في موافق الرعاية الأولية (spitzer et al., 1994) وتم تطويرها لتناسب DSM-IV (د ت ح ض ن)، وتستخدم مع المرضي الجدد حيث هناك شك بوجود اضطراب نفسي.

ويكون المقياس من :

١- استئثار المريض:

ويكون من صفحة واحدة يملأها المريض قبل رؤية الطبيب العام.
وتقىون من ٢٥ سؤالاً عن الحالة النفسية.

٢- دليل التقويم الإكلينيكي (CEG): The clinician Evaluation Guide

ويكون من ٩ صفحات تتضمن خمس فئات تشخيصية لكي تكشف المزيد عن المريض بناءً على أسئلة استئثار المريض.

والفئات التشخيصية الخمسة هي :

- ١- المزاج
- ٢- القلق
- ٣- الأضطرابات الجسمانية
- ٤- اضطرابات الأكل
- ٥- الاعتماد على العاققيـر

رابعاً : جدول الأضطرابات الوجدانية والفصام:

Schedule for affective & schizophrenia (SADS)

وهو مقياس يستخدمه الطبيب النفسي لتشخيص مدى واسع من الأضطرابات النفسية طبقاً للمعكـات التشخيصية البحثـية Research (RDC) diagnostic criteria وهو مقصور على الاكتئاب والفصام وهذا يقلل من أهميته.

المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الاضطرابات النفسية لدى الراشدين: **DSM-4**

وهناك أكثر من منه دراسة استخدمت المقابلة الإكلينيكية (النسخة القديمة) واستمرت هذه الشعبيّة للنسخة الأحدث (SCID) المستمدّة من (د ت ح ض ن) **DSM-IV**.

وهناك صورتان من المقابلة الأولى مخصصة للطبيب والثانية مخصصة للبحث العلمي، وهناك صورة مكملة ومنفصلة للاضطرابات الشخصية.

ونسخة الطبيب النفسي تمدنا بقياس مفزن شامل للاضطرابات النفسية (المحور الأول).

خامساً: المقابلة العصبية الطبيعية الدولية:

The Mini-international Neurological interview (MINI)

وهي مقابلة مفنة لتشخيص الاضطرابات النفسية طبقاً (د ت ح ض ن) **DSM-IV** و **ICD-10** وهي تغطي اضطرابات القلق واضطرابات الأكل والاضطرابات الوجدانية والاعتماد على العقاقير والاضطرابات الذهنية.

وهي تهتم بالأعراض الحالية للمرض وهو مقياس قصير يستغرق حوالي ١٥ دقيقة ويستخدم للبحث العلمي والتشخيص.

سادساً: جداول القياس الإكلينيكي للأمراض النفسية والعصبية:

Schedules for clinical Assessment in neuro-psychiatry (SCAN)

ويتكون من مجموعة من الأدوات لقياس الخبرات والسلوكيات الشائعة في الاضطرابات النفسية الكبيرة وكذلك للمقارنة في التشخيص عبر الثقافات المختلفة وهو مزيج من الأدوات النفسية للتشخيص فهو لا يؤكد على التشخيص لفنان معيينة للاضطرابات ولكن لكي يوضح ويتحقق من المؤشرات الرئيسية للأعراض المرضية وقد أصدرته منظمة الصحة العالمية (WHO) (1998).

ويتكون من أربعة مكونات :

١ - صورة الطبيب وهي مقابلة نصف مفنة

- ٢- قاموس للمفردات الصعبة للتشخيص الفارق
- ٣- معلومات مستمدة من المحيطين بالفرد
- ٤- تاريخ الحالة

سابعاً: نسق التشخيص المستمد من الأعراض (الرعاية الأولية) :

Symptom-Driven Diagnostic system for primary care (SDDS-PC)

وهو مقابلة موجزة وقصيرة ومقنة ويستخدمها الطبيب للتعرف على الاضطرابات النفسية الشائعة في مواقف الرعاية الأولية وقد تم تصميمه لكي يتفق مع محكّات DSM-III-R (د ت ح ض ن) وتم تطويره ليتفق مع DSM-IV.

ويختبر الاكتئاب والتعاطي والقلق العام والهلع والوسواس القهري وسلوك الانتحار ويجب على بنودها المريض، ويتبعها مقابلة قصيرة (٥ دقائق) للتشخيص وبحريها الطبيب.

أدوات الفحص السريع :

(Bufka, Crawford, & Levitt, 2002: ch 2) للمقاييس القصيرة المستخدمة في الفحص السريع للأمراض النفسية، ويستخدم اختصاصي علم النفس عدة مقاييس للفحص السريع الذي يقوم به الممارس العام أو أخصائي علم النفس أو هيئة التمريض، وسنعرض لأكثر هذه الأدوات انتشاراً، ويطلق عليها مقاييس التقرير الذاتي - self report measures

١- استبيان الصحة العامة (GHQ):

ويكشف الاضطرابات الإنفعالية (غير الذهنية) ويكون المقياس من ٦٠ بند تشير إلى شدة المرض خلال الـ ٤ أسابيع الماضية وهناك صورة مختصرة من ٣٠ بند ويستغرق تطبيق النسخة الأصلية حوالي ١٥ دقيقة.

٢- قائمة الأعراض الـ ٩٠ - Revised Symptom Checklist - 90 :

ويكون من ٩٠ بند لقياس الأمراض النفسية، وهو لا يشخص المرض ولكن يستخدم لفحص وجود مرض نفسي وكذلك لشدة المرض خلال الأسبوع الأخير.

المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الاضطرابات النفسية لدى الراشدين: DSM-4

ويقيس تسعه أبعاد هي القلق والاكتئاب والعداية والحساسية الاجتماعية والرهاب والبارانويا والذهان والأمراض الجسمية ذات المنشأ النفسي والوسواس القهري وتشير الدرجة التي حصل عليها المريض لاحتمال وجود المرض.

٣- القائمة الموجزة للأعراض (BSI):

وهو صورة موجزة من المقياس السابق، ويكون من ٥٣ بند وهناك ارتباط عالي بين المقياس الأصلي SCL-90-R والمصورة المختصرة (BSI).

وتصم للتعرف على الأفراد المحتمل وجود مرض نفسي لديهم لأجل إجراء فحص شامل لهم لتشخيص المرض.

ويتكون المقياس من ثلاثة مقاييس فرعية :

أ - الأعراض النفسية المرضية (السيكاترية)

ب- الأعراض الاجتماعية

ج- الاكتئاب

٤- البيان الصحي متعدد الأبعاد : الوظائف النفسية الاجتماعية:

Multidimensional Health profile, part 1 Psychosocial functioning (M H P.P):

ويتكون من مكونين: الأول لقياس الوظائف النفسية الاجتماعية والثاني لقياس الوظائف الصحية ويكون الأول (MHP-P) من ٥٨ بندًا يقيس أربعة مجالات: الصحة العقلية والعلاقات الاجتماعية وضغوط الحياة ومهارات مواجهة الضغوط.

والمقياس لا يتبنى أي توجه نظري أو إكلينيكي واضح، ولا يستخدم في التشخيص ولكنه يوضح مجالات نفسية واجتماعية في حياة الفرد يمكن أن تكون هامة لممارس الطبي العام.

٥- استخبار الفحص السريع للتشخيص الطب النفسي:

Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire (PDSQ):

ويتكون من ١٢٦ بند للتقرير الذاتي وذلك لفحص ١٣ اضطرابات نفس من (DSM-IV) في خمسة مجالات هي (الأكل، والحالة المزاجية، والقلق،

DSM-4 & DSM-5

وتعاطي المخدرات، ولاضطرابات الجسمية نفسية (المنشا) وهو استئثار شامل للأمراض النفسية، ولا يستغرق وقتاً طويلاً (١٥ دقيقة تقريباً) والفتات الـ ١٣ تطابق تصنيف DSM-IV، وهو أول استئثار يقيس فنات (DSM-IV).

٦- مقياس التعرف على السلوكيات والأعراض النفسية:

Behavior and Symptom Identification Scale (BASIS-32):

ويتكون من ٣٢ بند، ويفحص الأعراض السيكاتيرية والقدرات الوظيفية. ويستخدم لقياس التحسن من الحالة المرضية. ولا يقدم معلومات عن التشخيص الطبي، ويقيس خمسة مجالات هي :

العلاقة بالنفس والآخرين والحياة اليومية، وجودة الأدوار الاجتماعية والاكتئاب والقلق والإدمان والذهان وكما هو واضح فهو لا يتبنى أي توجه نظري أو إكلينيكي واضح.

الدراسات السابقة :

هناك دراسات عديدة قامت على فكرة إعداد استبيانات تستهدف تشخيص الأمراض النفسية من منظور سيكومترى (المقياس النفسي)، وتعتبر المقابلة الإكلينيكية المقتننة المشتقة عن (د ت ح ص ن) Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I) SCID بالمقابلات الإكلينيكية التقليدية. ويتم التشخيص بناء على DSM (د ت ح ص ن) ويكون من نوع فنات تشخيصية، ويمكن للأختصاصي استبعاد واحد أو أكثر من هذه الفنات، حيث يركز فقط على الفتاة الأكثر قرباً من أعراض المرض.

وفي دراسة أجريت على جامعيين للمقارنة بين التشخيص الطبي النفسي للاكتئاب وارتباطه بالتشخيص المبني على المقابلة الإكلينيكية التشخيصية، أظهرت النتائج وجود ارتباط جيد بين الطريقتين Sanche - villegas s, A. Schlatter, t., Ortu no, F., Lahortiga, F., Pla. J., Beinto, S., Martinez - Gonzalez, (2008)

وحاول عدد من الباحثين الرومانيين تقديم استئثار للفرز والتصنيف بهدف التشخيص الطبي The psychiatric diagnostic screening questionnaire (PDSQ)

وهو أداة للتقدير الذاتي لتشخيص أمراض المحور الأول في (د ت ح ص ن) DSM-IV وقد سبق لباحثين آخرين إعداده Zimmerman & lish (Zimmerman, 2002) cited in Zimmerman, 1995 ، وقد استبعد الباحثون مقاييس الأضطرابات الخاصة بالجسم مثل فقدان الشهية العصبية في الوقت الذي أضافوا فيه الذهان، والهوس والديسنيميا، ويكون الاستئثار من ١٠٢ بندًا (Zimmerman & Mattia, 1999 cited in Zimmerman, 2002) .

والنسخة النهائية لهذا الاستئثار والتى تم استخدامها كذلك في الدراسة الرومانية تتكون من ثلاثة عشر مقاييس فرعية بها ١٢٥ بندًا. وقد استبعد الهوس والديسنيميا بسبب وجود مشكلات عديدة بشأن تقييمهم، وطبقت البطارية على عينة تكونت من ٣٥٦ مريض، مقابل ١٢٢٥ شخص سوي وتتراوح أعمارهم ما بين ١٨ - ٨١ سنة. وقد أظهرت النتائج أيضاً إمكانات في تشخيص الأضطرابات النفسية بهذا المقاييس Cimca, Albu, Perte, Budau, Miclea, & Miclea (2011).

كما أجريت دراسة على ٢,٥٥١ راشد تراوحت أعمارهم بين (١٨ - ٢٣ سنة) من الشباب الاسترالي، بهدف فحص الارتباطات بين المقاييس ذات التوجه المبني على (د ت ح ص ن) DSM مثل التقرير الذاتي للشباب Young Adult Self-Report (YASR) وبين المقابلة المقترنة structured للشباب YASR يتبايناً باضطرابات المزاج (القلق والاكتئاب) وبصفة عامة وجده أن قوائم الاكتئاب والقلق المبنية على DSM (د ت ح ص ن) لا تظهر أفضليّة في توافقها مع المقابلة المقترنة Dingle, Clavarin, Williams, Bor, Najman & Alati (2010).

كما وضع "زيممان" استئثاراً لتشخيص الأمراض النفسية (Zimmeman, & Mattia 1999).

ولكن لم يلق الاهتمام أو الرعاية، ويبدو أن الطريقة التقليدية في تكوين القوائم والاستئثارات ليست هي الطريقة المناسبة في تشخيص الأمراض النفسية، وهو ما تجنبناه في المقابلة التشخيصية في البحث الحالي.

كذلك أجريت دراسة على ٣١٢ راشد باستخدام قائمة مراجعة لأعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة - (The PTSD checklist - Civilian version (PCL-C) DSM-IV، وتم إجراء تحليل عامل أظهر وجود ثلاثة عوامل تنقق وتندعم الأعراض المذكورة في (دت ح ض ن) DSM-IV والخاصة باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وهي تكرار استعادة خبرات الصدمة والتجنب والإثارة المفرطة (Calbari, Anagnostopoulos, & & Calbari, 2010) (626 مريض نفسياً وطبق عليهم القائمة التشخيصية للأكتاب Diagnostic Inventory for Depression (DID) و كذلك المقابلة المقتننة الإكلينيكية Structured Clinical Interview for DSM-IV). وتبين أن هذه القائمة ارتبطت ارتباطاً دالاً مع التشخيص الطبي النفسي للأكتاب Zimmer- man, Sheeran & Young, D. (2003)، كما أجريت دراسة على ١٨٣ فرداً تراوحت أعمارهم ما بين ١١ - ١٨ سنة، وحاول الباحث أن ينتقي أفضل بنود من استئثار التقرير الذاتي للشباب (YSR) لتشخيص القلق بالمقارنة بالمقابلة Anxiety Disorders Interview Schedule for Children (ADIS-C) Ferdinand, (2007).

ومما هو جدير بالذكر أن غالبية الدراسات السابقة قد اعتمدت في جمع بياناتها على آراء الخبراء من الأطباء النفسيين والمعالجين النفسيين (Achenbach & Dumenci , 2001; Lengua & Sadowski, 2001; Achenbach et al., 2003)

وتظهر الدراسات السابقة عدة ملاحظات :

- لا يوجد قائمة أو استئثار واحد يشمل الجوانب المرضية في المحور الأول بالإضافة إلى اضطرابات الشخصية وسنحاول تحقيقه في الدراسة الحالية.
- لا يوجد اتفاق بين الدراسات السابقة حول كفاءة المقابلات والقوائم التشخيصية المنبقة عن (دت ح ض ن) DSM-IV

٣- تستخدم المقابلات والاستبارات النفسية الاختبارات التقليدية مثل (لا يوجد) و(موجود بدرجة بسيطة) و(موجود بدرجة متوسطة) و(موجود بدرجة كبيرة) ويؤدي ذلك الى الدخول في نفس دائرة المغلقة نفسها، ويعني ذلك الفشل في تحديد الوزن النسبي لكل بند وهو ما يؤكد نظام التشخيص في (د ت ح ض ن) DSM-IV.

منهج البحث وإجراءاته :

تمثل مقابلة الإكلينيكية الشخصية المقتننة أداة أكثر كفاية عند استخدامها في الإجراءات التي يقوم عليها التشخيص السيكاتري (الطب النفسي) للاضطرابات النفسية؛ حيث أنها تتيح للقائم بعملية التقييم تسجيل الملاحظات السلوكية والاستفادة منها في عملية اتخاذ القرار التخفيسي، وهي بذلك تتيح للاختصاصي القائم بالتشخيص الاعتماد على أكثر من مصدر للمعلومات على عكس أساليب التقرير الذاتي بمفردها أو الاعتماد على المشاهدة الإكلينيكية وحدها، وهي بذلك توفر للقائم بالتشخيص معلومات تتسم بالثراء والشمولية، الأمر الذي يعد مقدمة ملائمة للخروج بتشخيص دقيق لمشكلات المريض، وما يترتب عليه من تخلات علاجية ملائمة لهذه المشكلات المرضية.

ويعتمد الباحثون على منهج الملاحظة والخبرة مع الحالات المرضية لتوضيح وإضافة عناصر جديدة في الاضطرابات النفسية، وقد حاول الباحثون تبسيط البنود لدرجة فهمها واستيعابها لأى شخص مهتم بالاضطرابات النفسية

عينة البحث :

تكونت عينة البحث من ٤٠ مريضاً من المرضى النفسيين المحتجزين بمستشفىبني أحمد للطب النفسي بمدينة المنيا، والمرضى المترددون على العيادات الخارجية فيها وفيما يلى مواصفات العينة وفقاً للمتغيرات ذات الأهمية للبحث الراهن. متوسط أعمار العينة هو ٣٠,٥ عاماً بانحراف معياري قدره (٩,٨٥) سنة، وتتراوح أعمار المرضى في عينة البحث بين ١٦ و ٥٤ عاماً بمدى قدرة ٣٨ سنة.

بالنسبة لمتغير الجنس في عينة البحث فان نسبة الذكور تزيد كثيراً عن نسبة الإناث حيث تمثل نسبة الذكور ٥٨,٢% من أفراد العينة بينما تمثل الإناث نسبة ١٧,٥%

جدول (١) يوضح توزيع متغير التعليم ويظهر في الجدول أن نسبة غير المتعلمين بالعينة كانت مرتفعة وقدرها ٢٥,٥% من العدد الكلي للعينة، اما نسبة الحاصلين على شهادة متوسطة فهي ٣٧,٥% من العينة الكلية للبحث، والحاصلين على الشهادة الابتدائية نسبتهم ١٧,٥%， بينما الحاصلون على تعليم إعدادي فإن نسبتهم ١٢,٥%， والحاصلون على شهادة جامعية يمثلون أقل نسبة وهي ٧,٥%

جدول (١)
توزيع متغير التعليم في عينة البحث والبيانات الوصفية له
(ن = ٤٠)

مستوى التعليم	النكرار	النسبة المئوية
ابتدائي	٧	١٧,٥
إعدادي	٥	١٢,٥
ثانوي	١٥	٣٧,٥
جامعي	٣	٧,٥
أمي	١٠	٢٥,٥
المجموع	٤٠	١٠٠

ويوضح جدول (٢) توزيع متغير الحالة الزوجية والبيانات الوصفية له ويظهر في الجدول ان نسبة الأفراد غير المتزوجين في العينة بلغت ٥٥,٢% ونسبة المتزوجين هي ٣٢,٥% وكان هناك ١٥% من افراد العينة مطلقين.

جدول (٢)

يوضح توزيع الحالة الزواجية لعينة البحث والبيانات الوصفية له
(ن = ٤٠)

الحالات الزواجية لأفراد العينة	النسبة المئوية	النوع
أعزب	٥٢,٥	٢١
متزوج	٣٢,٥	١٣
مطلق	١٥	٦
المجموع	١٠٠	٤٠

وبالنسبة لتوزيع المهن في عينة البحث والبيانات الوصفية له يعمل ٣٧,٥% من أفراد العينة في أعمال حرفية بدون تعليم أو بتعليم في المرحلة الابتدائية، وي العمل ٢٧,٥% من أفراد العينة بأعمال فنية بشهادة الإعدادية، بينما يعمل ٥% من أفراد العينة بأعمال فنية بشهادة متوسطة وهي الثانوية العامة أو الدبلوم وما في مستواه، وفرد واحد من أفراد العينة يعمل في وظيفة تخصصية بشهادة جامعية ويمثل نسبة ٢,٥% من أفراد العينة وهناك ٢٢,٥% لم يعملون من قبل و ٥% لا يعملون الآن بسبب المرض.

وبالنسبة للتاريخ المرضي في عينة البحث وجد أن ٨٧,٥% لهم تاريخ مرضي سابق أي أصيروا بنوبات سابقة خضعوا فيها للعلاج و ١٢,٥% ليس لديهم تاريخ نوبات سابقة من المرض النفسي الذي يعالجون منه الأن.

وبالنسبة لعدد مرات دخول المستشفى للمريض في عينة البحث والبيانات الوصفية له، فهناك نسبة ٦٥% من المرضى احتجز لأول مرة بالمستشفى، ونسبة ١٥% محتجزين للمرة الثانية بالمستشفى، ونسبة ١٠% احتجز لأكثر من مررتين بالمستشفى، ونسبة ١٠% لم يحتجز بالمستشفى رغم وجود أعراض مرضية نفسية.

وبالنسبة لازمان المرض في عينة البحث، هناك ١٥% من عينة البحث الكلية مرضى لفترة أقل من عام، ونسبة ٣٥% مرضى لمدة تتراوح ما بين عام إلى عامين و ٥٠% من المرضى بالعينة الكلية يعانون من المرض النفسي لفترة تزيد عن العامين.

وصف بناء "المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الاضطرابات النفسية للراشدين":

تم مراجعة الإنتاج الفكري للأدوات التي يستخدمها الاختصاصي النفسي في عملية التشخيص بعدد من الاضطرابات النفسية للوقوف على مدى كفاءتها وجدواها. وأسفرت المراجعة عن وجود قليل من تلك الأدوات التي تساهم بشكل دقيق في عملية التشخيص، وذلك لما لأدوات التقرير الذاتي من مشكلات في التقييم الطب النفسي. كما وجد عديد من الأدوات التي تستخدم بالعيادات النفسية داخل مصر لا يحدث لها تطوير متزامن مع التغييرات العالمية في نظم التصنيف الطب النفسي. وأن الأدوات التي تم بناؤها وفقاً لأنظمة تصنيف الأمراض النفسية المعيارية أما أن تكون مهتمة بقياس اضطرابات فردية كالقلق والاكتتاب والفصام والوسواس، بما لا يجعلها أداة تشخيص أولية تكفي لجمع كل المعلومات المتوفرة حول مشكلات المريض من حيث الأعراض أو وجود تاريخ مرضي سابق ... الخ. أو أن تلك الأدوات لم يتم تطويرها بالاشتراك مع عضو الفريق العلاجي المستنول عن التشخيص بالأساس وهو الطبيب النفسي. وفي محاولتنا لسد الفجوات المذكورة تم بناء المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الاضطرابات النفسية للراشدين وفقاً للدليل التشخيصي والإحصائي الرابع DSM-IV. حيث تمثل الأقسام الفرعية للمقابلة والبنود المكونة لها نتاجاً لاطلاع عليه في لغته الأصلية والنسخ المترجمة منه إلى اللغة العربية. كما تم الاطلاع كذلك على المقابلة الإكلينيكية للتشخيص المبنيقة عنه والمعروفة باسم المقابلة الإكلينيكية المقترنة لتشخيص الاضطرابات النفسية (م ع ت ض ن) SCID-II و SCID-I ووضعت بنود المقابلة في معظمها وفقاً لمعايير الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للفصام، كالفصام المبكر والفصام ذى العرض الواحد. كما تم إضافة اضطراب القلق ذو العرض الواحد ضمن اضطرابات القلق حيث لم تكن تلك الاضطرابات مدرجة ضمن الصورة الرابعة المعدلة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية DSM-IV. وأسفرت تلك الخطوة عن البناء الراهن لأجزاء المقابلة والتي تمثلت في (٥١) اضطراباً نفسياً ممثلة في الفئات الكبرى للفصام والاضطرابات المزاجية واضطرابات القلق والاضطرابات الجسمية واضطرابات الألم والتوهם.

المرضى بالإضافة إلى اضطرابات الشخصية التسعة المصنفة في الدليل الشخصي والإحصائي الرابع للاضطرابات النفسية وكانت متمثلة في الاضطرابات التالية: الف quam ويضم ف quam العرض الواحد والفصام المتاثر و النوع التخسي (الكتانوني) والفصام المبكر والفصام غير المتميز والفصام المتبقي والاضطراب الفصامي المؤقت واضطراب الف quam الوجذاني والاضطراب الذهانى الوجيز والاضطراب الذهانى المشارك واضطراب ذهانى ناتج عن مرض جسمى واضطراب ذهانى ناتج عن تعاطى المخدرات وذهان غير محدد والفصام الذهانى (البارانويا) والاضطراب الضالى (هذه). واضطرابات المزاج وتضم: الاكتئاب الأساسى ومحكمات تشخيص الديستيميا ونوبات الهوس ونوبة الهوس الخفيف ونوبة الهوس الوحيدة والاضطراب ثنائى القطب I واضطراب ثنائى القطب II واضطراب ثنائى القطب III واضطراب ثنائى القطب IV واضطراب ثنائى القطب غير المحدد واضطراب المزاج الناتج عن أمراض جسمية واضطراب المزاج الناتج عن تعاطى المواد المخدرة والهوس النوعي. ثم اضطرابات القلق وتتمثل في: القلق العام وقلق العرض الواحد والتوسواس القهري واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة واضطراب الضغط الحاد واضطراب الهلع ورهاب الأماكن المتسعة والهلع غير المصحوب برهاب الأماكن المتسعة والهلع المصحوب برهاب الأماكن المتسعة والرهاب المحدد (البسيط) والرهاب الاجتماعي. ويليها اضطرابات الجسمية نفسية المنشأ والاضطراب الجسمى غير المميز والاضطراب التحولى والاضطراب الألم والألم المقتربن بأسباب نفسية والألم المقتربن بأسباب نفسية ومرض جسدي وتوهم المرض واضطراب التشوه الوهمي للجسم والاضطراب الجسمى الشكل غير المحدد، وختمت المقابلة بوضع معاير تشخيص اضطرابات الشخصية التالية: اضطراب الشخصية الذهانية (البارانويا) واضطراب الشخصية الفصامية واضطراب الشخصية فصامية السنمط واضطراب الشخصية المضادة للمجتمع واضطراب الشخصية البينية واضطراب الشخصية البوسقيرية واضطرابات الشخصية التجنبية واضطراب الشخصية الاعتمادية واضطراب الشخصية الوسواسية.

وتحتملت المقابلة في بدايتها وصفاً موجزاً للمحتواها، تلتها البيانات الأساسية والديمografية للمريض وتاريخ الحالة والمشكلة الراهنة.

وارفق بالمقابلة أسلمة "المسح الشامل" التي توجه الاختصاصي إلى فنة الاضطراب النوعي الذي سيجمع بيانات عنه، جنباً إلى جنب مع سؤال الإحالة الذي أتى بها المريض إلى التقييم.

تمت كتابة البنود ومراجعتها من ناحية البناء والتركيب اللغوي وملاءمة المفردات من قبل فريق البحث بشكل فردي، ثم تم مراجعتها في لقاءات دورية بين فريق البحث وعدد من الزملاء في التخصص. ثم بدأت مرحلة التحقق من صلاحية الأداة للتشخيص حيث تم التحقق من الثبات والصدق للمقابلة كما سيتم وصفه في الفقرات التالية.

إجراءات التحقق من الصلاحية القياسية (السيكومترية) للمقابلة الإكلينيكية ونتائجها :

صدق المحكمين: تضمن الفريق العلاجي للمرضى النفسيين العديد من التخصصات، فهو يضم الطبيب النفسي والاختصاصي النفسي والاختصاصي الاجتماعي واحتياطي خدمة المجتمع وكذلك فريق التمريض النفسي، وبرغم التكامل بين أدوارهم في التقييم ووضع خطة العلاج وتنفيذها، إلا أن الطبيب النفسي ما زال يحتل موقع قائد الفريق العلاجي في الثقافة المحلية وذلك لما له من خبرة ذات طبيعة متكاملة في الناحية الحيوية والفارمакولوجية والتفسية كذلك، لذلك فإنهم بمثابة الخبراء في عملية التشخيص بالتعاون مع بقية الفريق العلاجي وخاصة الاختصاصي النفسي الإكلينيكي، لذلك فإن صدق المحكمين اعتمد في التحقق على عدد من الأطباء النفسيين (١٢) من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما بعدها في الطب النفسي ولهم سنوات خبرة في التشخيص الطبي النفسي والعمل في مواقع العيادات الطبية لا تقل عن ٧ سنوات.

تكون فريق المحكمين من أطباء بقسم الطب النفسي والعصبي بجامعة المنيا والأطباء العاملين بمستشفىبني احمد للطب النفسي بمحافظة المنيا، وقاموا بتقييم بنود المقابلة والفنانات الفرعية فيها لتحديد مدى ملاءمة كل منها لتشخيص الاضطراب المطلوب تشخيصه وفقاً لمعايير التشخيص التي

وضعها الدليل الشخصي والإحصائي الرابع للاضطرابات النفسية - DSM-IV والمهمة الثانية للمحكمين هي تحديد المواقف والعبارات التي تحتاج إلى تعديل أو تبديل أو حذف من بنود المقابلة، والحكم على مدى الاتساق في الترتيب والتسلسل وملاءمة المفردات اللغوية المستخدمة.

وتم توزيع 12 استمارة تحكيم على خبراء الطب النفسي بجامعة المنيا ومستشفى بنى أحمد للطب النفسي بمدينة المنيا، وتم استرجاع عدد 9 منها، ثم تم فحص نتائج التحكيم في ضوء العناصر المحكّات الثلاثة السابقة وهي:

- 1- الملاحظات المتعلقة ببناء البنود وتسلسلها وكفايتها داخل المقابلة.
- 2- التعديلات اللازمة على مستوى بناء اللغة والمفردات المستخدمة في بنود المقابلة.
- 3- الانفاق حول تصنيف الاضطرابات ومعايير تشخيص الاضطرابات النفسية موضع التقييم

وجاءت النتائج الخاصة بآراء المحكمين كالتالي:

- 1- اتفق المحكمون التسعة على ملائمة المقابلة من حيث الغرض الذي بنيت من أجله وهو تشخيص الاضطرابات النفسية وأضطرابات الشخصية لدى المرضى النفسيين الراغبين.
- 2- اتفق المحكمون بالإجماع على أن المقدمة والبيانات الأساسية وبنود المسح الشامل أجزاء جوهيرية للحصول على المعلومات التي تدور حولها.
- 3- اقترح بعض المحكمين (وكان عددهم 3) إضافة بعض البنود التي توضح ترتيب المريض بين أخوه ووعدد الأخوة ومكان الإقامة إذا كان من الريف أو من الحضر.
- 4- اقترح بعض المحكمين (وكان عددهم 3) إضافة بعض الأسئلة للمسح الشامل ليغطي كل الاضطرابات النفسية كما صنفت داخل المقابلة.
- 5- اقترح أحد المحكمين تبسيط الكلمات حتى يفهمها المرضى ونزعها من السياق المرضي المنفر، كاستبدال كلمة "ضلالات" بكلمة "أفكار" أو هذهات أو اعتقادات أو إضافة كلمة لتوضيح معنى السؤال بشكل أكثر دقة وأكثر تبسيطًا.
- 6- وفيما يتعلق بالاضطرابات النفسية التي يتم تشخيصها من خلال المقابلة

جاءت نتائج التحكيم كما هي موضحة بالجدول (٣) ويمكن وصفها في التالي:

١. اتفق المحكمون التسعة على ملائمة الفئات التصنيفية وطرق قياسها كما عرضت في المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الإضطرابات النفسية.
٢. اتفق المحكمون بالإجماع على ملائمة بنود قياس ٤٨ اضطراباً من مجموع ٦٠ اضطراباً نفسياً تقوم المقابلة بتقييمها من دون إدخال أية تعديلات عليها.
٣. اقترح المحكمون بعض التعديلات على بنود اثنى عشر اضطراباً متضمنة في المقابلة؛ وهي بنود تشخيص الفصام والاكتئاب الأساسي والديستيميا والهوس والقلق العام والوسواس القهري واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة.

جدول (٣) نسب اتفاق المحكمين حول المقاييس الفرعية من المقابلة والتعديلات المقترحة لبعضها

التعديل المطلوب	نسبة الاتفاق	اضطراب النفسي موضع التحكيم	التعديل المطلوب	النسبة الثانية الاتفاق٪	اضطراب النفسي موضع التحكيم
١٠٠% تعديل إلى اكتئاب مزمن		الديستيميا	%٣٠ ترتيب البنود وففات الأعراض	٦٠	الفصام
٣٠% تأكيد عدم رجوع الاضطراب إلى تعاطي المخدرات	٦٠	نوبات الهوس	%٣٠ غير مصنف في (د ت dsm-٥) ح ض ن	٦٠	فصام العرض الواحد
١٠٠% بشرط أنها لا تكتفي للإيذاع بمستشفى		نوبة الهوس الخفيف		١٠٠	الفصام المتأثر
	١٠٠	نوبة هوس وحيدة		١٠٠	النوع الكتاتوني (التخسيبي)
٣٠% تعديل البنود	٦٠	اضطراب ثانٍ القطب I	%٣٠ غير مصنف في (د ت ح ض ن)	٦٠	الفصام المبكر

المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الاضطرابات النفسية لدى الراشدين: DSM-4

التعديل المطلوب	نسبة الاتفاق	الاضطراب النفسي موضع التحكيم	التعديل المطلوب	النسبة المتوية الاتفاق %	الاضطراب النفسي موضع التحكيم
	% ١٠٠	اضطراب ثانٍ القطب II المستخدم	تعديل المصطلح القطب II	٦٠	الفصام غير المتميّز
٦٠ % تعديل البنود	٦٠	اضطراب ثانٍ القطب III		١٠٠	الفصام المتبقى
٦٠ % تعديل البنود	٦٠	اضطراب ثانٍ القطب IV		١٠٠	الاضطراب الفصامي المؤقت
	١٠٠	اضطراب ثانٍ القطب غير محدد البنود	٦٠ % تعديل الاضطراب الفصام الوجوداني	٣٠	اضطراب الفصام الوجوداني
	١٠٠	اضطراب مزاجي ناتج عن أمراض جسمية		١٠٠	الاضطراب طراب الذهانى الوجيز
	١٠٠	اضطراب المزاج الناتج عن تعاطي المواد المخدرة		١٠٠	الاضطراب طراب الذهانى المشترك
	١٠٠	الهوس النوعي		١٠٠	اضطراب ذهانى ناتج عن مرض جسمى
١٠٠ % تعديل البنود ودمج المتشابه منها		القلق العام		١٠٠	اضطراب ذهانى ناتج عن تماطي المخدرات
		قلق العرض الواحد	١٠ تعديل البنود	٩٠	ذهان غير محدد
٦٣ % تحديد أن زمن الانشغال بالأعراض يزيد عن ساعة باليوم	٦٠	الوسواس القهري		١٠٠	البار لنوبا (الفصام الذهانى لو الاضطهادى)
٣٠ % نمجهما في الفترة السابقة	٦٠	الاقفال القهريّة		١٠٠	الاضطراب طراب الضالى (هذهاء):
١٠٠ % مع إضافة فقرة الأعراض لا تقل عن ٤ أسابيع		اضطراب طراب ضغوط ما بعد الصنيمة	٦٣ % بشرط تحقق عرض ١ ٢ &	٦٠	الاكتاب الأساسي

DSM-4 & DSM-5

التعديل المطلوب	نسبة الانفاق	الاضطراب النفسي موضع التحكيم	التعديل المطلوب	النسبة المئوية الانفاق %	الاضطراب النفسي موضع التحكيم
	١٠٠	توهم المرض		١٠٠	اضطراب الضغط الحاد
	١٠٠	اضطراب التشوّه الوهمي للجسم		١٠٠	اضطراب الهلع
	١٠٠	اضطراب طراب الجسمي الشكل غير المحدد		١٠٠	رهاب الأماكن الواسعة
	١٠٠	اضطراب طراب الشخصية البارانوائية (الذهانية)		١٠٠	الهلع غير المصحوب برهاب الأماكن الواسعة
	١٠٠	اضطراب طراب الشخصية الفاصامية		١٠٠	الهلع المصحوب برهاب الأماكن الواسعة
	١٠٠	اضطراب طراب الشخصية فاصامية النمط		١٠٠	الرهاب المحدد (البسيط)
	١٠٠	اضطراب طراب الشخصية المضادة للمجتمع		١٠٠	الرهاب الاجتماعي
	١٠٠	اضطراب طراب الشخصية البنية		١٠٠	الاضطرابات الجسمية نفسية المنشأ
	١٠٠	اضطراب طراب الشخصية المهستيرية		١٠٠	الاضطراب الجسدي غير المميز
	١٠٠	اضطراب طراب الشخصية التجنبية		١٠٠	الاضطراب التحولي
	١٠٠	اضطراب طراب الشخصية الاعتمادية		١٠٠	اضطراب الألم

المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الاضطرابات النفسية لدى الراشدين: DSM-4

التعديل المطلوب	نسبة الاتفاق	موقع التحكيم	الاضطراب المطلوب	التعديل المطلوب	نسبة الموافقة الاتفاق %	موقع التحكيم
	١٠٠	اضطراب طراب الشخصية			١٠٠	الألم المقترب بأسباب نفسية
		الشخصية اللوسوائية			١٠٠	الألم المقترب بأسباب نفسية ومرض جسدي

- ونتيجة لنتائج هذه الخطوة تم إعادة صياغة بعض البنود وإجراء العديد من التعديلات المقترنة من المحكمين ومنها الآتي :
- إضافة البيانات التي اقترحها بعض المحكمون إلى قائمة البيانات الأساسية.
- ضم اضطراب فصام العرض الواحد تحت اضطراب الفصام غير المحدد.
- عدم اعتبار قلق العرض الواحد اضطراباً مستقلاً وضممه تحت اضطراب القلق العام أو تصنيفه وفقاً للفئة الفرعية الملاعنة ضمن اضطرابات القلق.

صدق الارتباط بمحك خارجي :

تمت إجراءات صدق الارتباط بمحك خارجي عن طريق تطبيق المقابلة على عينة من المرضى المودعين بمستشفى الطب النفسي (٣٦) ومجموعة من المرضى بالعيادة الخارجية (٤) وأخذ التشخيص الذي وضعه الطبيب المعالج للمريض كمحك صدق للمقابلة الإكلينيكية في تشخيص الاضطرابات النفسية للراشدين، وكانت نسبة الاتفاق بين نتائج المقابلة وتشخيص الطبيب هي ٩٧ % حيث صنفت المقابلة (٣٩) مريضاً من العدد الكلي للعينة موضع البحث تصنيفاً مطابقاً للتشخيص الذي وضعه الطبيب سلفاً في ملف المريض.

تفوّقت المقابلة في أنها استطاعت في بعض الحالات تصنيف الفئة الفرعية للاضطراب مثل: تحديد نوع الفصام لدى المريض، أو تحديد شكل الاضطراب ثانوي القطب... وهكذا.

كما نجحت المقابلة في تحديد أكثر من اضطراب لدى المريض الواحد حيث حدثت المقابلة للأعراض الأخرى الثانوية التي يعاني منها المريض بالإضافة إلى الاضطراب الأولى لديه مثل وجود أعراض قلق عام مع الفضام أو حدوث أعراض وسواسية مع الاضطراب المزاجي ... وهكذا. وحسب كذلك معامل الارتباط بين التخخيص الذي نتج عن إجراء المقابلة وتشخيص الطبيب (المحك) وكانت قيمته تساوي (٠٠,٩٧٥).

حساب ثبات ما بين المصححين (القائمين بالتقدير):

لما كان ثبات المقدرين (ثبات المصححين) inter-rater reliability من المعايير القياسية المهمة لضمان موضوعية التقييم للمقابلات النفسية بصفة عامة وذات أهمية خاصة في المقاييس الإكلينيكية القائمة على منهج المقابلة؛ فقد تم التحقق من ثبات ما بين المصححين (القائمين بالتقدير) وفقا للإجراءات التالية:

تم تدريب عدد ثمانى باحثين من قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة المنيا على كيفية إجراء المقابلة وكيفية تسجيل النتائج على يد فريق البحث الرئيسي قبل البدء في التطبيق الفعلى في موقع العيادات النفسية. ثم قسم الباحثين إلى أربعة فرق كل فريق منها يتكون من باحثين يقوم كل منهما بإجراء المقابلة وتسجيل استجابات المريض بشكل مستقل عن الآخر أثناء تطبيق المقابلة. وكذلك الاطلاع على ملف المريض للحصول على تشخيص الطبيب وملء المعلومات التي لم نتمكن من الحصول عليها من المريض مثل الشكوى على لسان الأهل والمشكلة التي جعلته يتطلب العلاج بالمستشفى..... الخ. وتم ذلك على عدد ١٢ مريضا من المرضى المودعين بمستشفى الطب النفسي ببني احمد بمدينة المنيا. ثم بعد ذلك تم تجميع الحالات التي طبقها كل باحث ومقارنة نتائجه بنتائج زميله في فريق التقدير على نفس المريض، وكشفت النتائج عن اتفاق الباحثين في نتائج المقابلة في الاتي عشر حالة التي تم اختبار ثبات ما بين المصححين (القائمين بالتقدير) لها. بما يكشف عن مستوى مرتفع من ثبات القائمين بالتقدير، وكان معامل الارتباط بين التقديرات التي أعطاها المقدر الأول والتقديرات التي أعطاها المقدر الثاني للمريض نفسه هو ارتباط تام

المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الأضطرابات النفسية لدى الراشدين: **DSM-4**

(١٠٠%) كما اتفقت تقييرات الباحثين مع التشخيص الذي أعطاه الطبيب لمرضى عينة ثبات المقدرين.

وبهذا فإن النتائج الأولية تشير إلى الصلاحية القياسية للمقابلة الإكلينيكية لتشخيص الأضطرابات النفسية للراشدين المطورة عن الـ (د ت ح ض ن) DSM-IV في ضوء عينة البحث. ويوصي فريق البحث بعده من الخطوات التي يمكن من خلالها تعليم هذه النتائج في مجال التشخيص السيكاتري بقدر أعلى من الثقة، وهي كالتالي:

- إجراء مزيد من البحوث للتحقق من صدق المقابلة وبنائها في تشخيص مدى أوسع من الأضطرابات النفسية حتى نتمكن من تعليم النتائج التي توصل إليها البحث الراهن.
- القيام بخطوة التحقق من صدق المحكمين بواسطة مجموعة من علماء النفس الإكلينيكي ذوي الخبرة في مجال تشخيص وعلاج الأضطرابات النفسية
- تطبيق المقابلة على عينة كبيرة من المرضى وكذلك عينة من الأسواء للتحقق من صدق التكوين بطرق أخرى للمقابلة والتحقق من قدرتها على التمييز بين المجموعات الطرفية.

المراجع

أولاً: مراجع باللغة العربية :

- الرابطة الأمريكية للطب النفسي (٢٠١٠). الدليل التخريصي والإحصائي الرابع للاضطرابات النفسية : المعايير التخريصية. ترجمة (أمينة السماك وعادل مصطفى) مكتبة المنار الإسلامية: الكويت.
- إبراهيم، زيري السيد (٢٠٠٤). تقييم نتائج برنامج للعلاج المعرفي السلوكي على عينة من المرضى المصابين بالاكتئاب: رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الآداب جامعة المنيا.
- إبراهيم، زيري السيد، (٢٠٠٦). العلاج المعرفي للاكتئاب : أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، القاهرة: دار غريب للنشر.
- الصبوة، م، (٢٠١١). علم النفس الإكلينيكي المعاصر. القاهرة: الأنجلو المصرية.
- شلبي، محمد (٢٠٠٥). سمات الشخصية واستراتيجيات المواجهة: تقييم بعض المفاهيم النفسية واختبار لنموذج بحثي. مجلة الأدب والعلوم الإنسانية، جامعة المنيا، ٥٦، ٣٢٧-٢٠٣.
- شلبي، محمد (١٩٩٥). المكونات البارزة في مفهوم الذات التلقائي لدى طلبة وطالبات الجامعة: دراسة في منهج البحث. مجلة الأدب والعلوم الإنسانية، جامعة المنيا، ١١، ٣٢-١٧، ١١.
- شلبي، محمد (١٩٨٩). النسبة النفسية: منحى معرفي - فردي في دراسة الشخصية. القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- شلبي، محمد؛ الضوى، هدى؛ هاشم، عصام (٢٠٠٠). البحث عن النماذج العاملية الشائعة في الشخصية: دراسات في مناهج البحث. مجلة علم النفس المعاصر والعلوم الإنسانية، ١٢، ٢٠٨-٩١.
- عكاشة، أحمد، عكاشة، طارق (٢٠١٠). الطب النفسي المعاصر. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

- عبد الخالق، احمد محمد، (٢٠٠٠). استئنارات الشخصية (٣ ط)، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، الطبعة الثالثة.
- فرج، صفت، (١٩٨٥). القياس النفسي، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.
- لينسي، س. ج. ل. وباؤل، ج. ي (٢٠٠٠). قضايا الفحص العملي في علم النفس الإكلينيكي، في (صفوت فرج مترجم): مرجع في علم النفس الإكلينيكي للراشدين، القاهرة: الأنجلو المصرية.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- American Psychiatric Association (2000). *DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS, FOURTH EDITION, TEXT REVISION*, Published by, Washington, DC
- Achenbach, T.M., Dumenci, L., Rescorla, L.A. (2003). DSM-oriented and empirically based approaches to constructing scales from the same item pools. *Journal of Clinical Child Adolescent Psychology*, 32:328-340
- Achenbach, T.M., Dumenci, L. (2001). Advances in empirically based assessment: revised cross-informant syndromes and new DSM oriented scales for the CBCL, YSR, and TRF: Comment on Lengua, Sadowksi, Friedrich, and Fischer (2001). *Journal of Consultant & Clinical Psychology*, 69:699-702.
- Achenbach, T.M., Dumenci, L., Rescorla, L.A. (2003). DSM-oriented and empirically based approaches to constructing scales from the same item pools. *Journal of Clinical Child Adolescent Psychology*, 32:328-340.

DSM-4 & DSM-5

- Bufka, L., Crawford, J., & Levitt, J., (2002). Brief screening assessment for managed Care & primary care, In : M., M., Antony & D. Barlow (eds.), *Handbook of Assessment & Treatment Planning For Psychological Disorders*, NY.: The Guilford
- Calbari, E., & Anagnostopoulos, F., (2010), Exploratory factor analysis of Greek Adaptation of the PTSD check list - civilian version. *Journal of Loss & Trauma*, 15 ; 339-350
- Cimca, A., Albu, M., Perte, A., Budau, O., Miclea, S., & Miclea, M., (2011). The Romanian adaptation of the psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire (PDSQ), *Cognition, Brain, Behavior, An Interdisciplinary Journal*, 69-93.
- Dingle K, Alati R, Williams, G.M., et al (2010) The ability of YSR DSM-oriented depression scales to predict DSM-IV depression in young adults: a longitudinal study. *Journal Affect Disorder*, 121:45-51
- Dingle, K., Clavarin 6, A., Williams, G.M. , Bor , W. , Najman, J., & Alati, R. (2010). Predicting depressive and anxiety disorders with the YASR internalizing scales empirical and DSM-oriented. *Social Psychiatric Epidemiology* (2011) 46:1313-1324
- Ferdinand, R. F., (2007). Predicting anxiety diagnosis with the Youth Self-Report. *Depression & Anxiety*, 24-32,40
- Hearn, M.; Ceschi, G.; Brillon, P.; Fuirst, G.;& Linden,M. V. 2012, A French Adaptation of the Posttraumatic Diagnostic Scale, *Canadian Journal of Behavioural Science* , 44, No. 1, 16-28
- Lengua, L. J., Sadowski, C.A., Friedrich, W.N., Fisher, J., (2001) Rationally and empirically derived dimensions of children's symptomatology: expert ratings and

- confirmatory factor analyses of the CBCL. *Journal of Consultant & Clinical Psychology*, 69:683-712.
- SAMUEL, D. B.; & WIDIGER, T. A., (2010). A Comparison of Obsessive-Compulsive Personality Disorder Scales, *Journal of Personality Assessment*, 92 (3), 232-240
 - Sanche - villegas s , A. Schlatter , t., ortuno , F., Lahortiga, F., Pla, J., Beinto, S., Martinez - Gonzalez, (2008). Validity of a self - reported diagnosis of depression among participants in a cohort study using the structured clinical interview for DSM-IV (SCID-I) *Biomed Central Psychiatry*, 8 , 43.
 - Summerfeldt, L., & Antony, M., (2002). Structured & semistructured diagnostic interview, In: M.,M.,Antony & D. Barlow (eds.). *Handbook of Assessment & Treatment Planning For Psychological Disorders*, NY.: The Guilford.
 - Zimmerman, M., & Mattia , J.I. (1999). The reliability and validity of a screening questionnaire for 14 DSM-IV Axis I disorder (the psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire). *Journal of Clinical Psychiatry*, 60, 677-683.
 - Zimmerman & Mattia, J.I (2001) The psychiatric Diagnostic screening Questionnaire : Development, reliability and validity. *Comprehensive Psychiatry*, 42, 175-189.
 - Zimmerman, M. (2002). *The psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire*. Los Angeles: western Psychological services.
 - Zimmerman, M., Sheeran,T.; and Young,D., (2004). The Diagnostic Inventory for Depression: A Self-Report Scale to Diagnose DSM-IV Major

DSM-4 & DSM-5 —————

- Depressive Disorder, *Journal Of Clinical Psychology*, 60(1), 87-110.
- Zimmerman, M., Galione, J.N., Chelminski, I., Young, D., Ruggero, C.J., (2010). Performance of the Bipolar Spectrum Diagnostic Scale in psychiatric outpatients, *Bipolar Disorder*, 12: 528-538.

٢

الفصل الثاني
نص المقابلة
الإكلينيكية لتشخيص
الاضطرابات النفسية DSM-4

الفصل الثاني

نص المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الاضطرابات النفسية DSM-4

- ١ - هذه المقابلة تتم مع المريض إذا كان واعياً بالمرض أو بأهل المريض إذا كان ذهانياً (مثل الفصام).
- ٢ - يقوم اختصاصي علم النفس الإكلينيكي أو اختصاصي الطب النفسي بدور نشط في عملية تشخيص المرض حيث يبدأ بطرح فروض خاصة بتصنيف أعراض المرض لكي يتم تطبيق الجزء الخاص بالمرض.
- ٣ - يمكن تطبيق أكثر من فئة مرضية مثل الاكتئاب أو القلق أو الرهاب أو الذعر.

: التعليمات

دعنا الآن نجمع بعض المعلومات المهمة عن الفترة الحالية والمشكلات السابقة.

- هل لديك أي سؤال قبل أن نبدأ في طرح الأسئلة عليك؟

١- بيانات ديمografية:

- اسم المريض: تاريخ التطبيق: / /
- الجنس: ذكر (١) أنثى (٢)
- تاريخ الميلاد: / / سنة
- هل أنت
- متزوج () - أرمل ()

- مطلق () (لماذا؟) ٤ - منفصل () (لماذا؟)
- لم يتزوج () (لماذا؟) ٥ - هل لديك أطفال؟ نعم (عدهم ، ، ،) أعمارهم (..... ، ، ،)
- لا () مع من تعيش؟
.....

٢ - التاريخ التعليمي أو العلمي:

- أعلى صف دراسي وصلت إليه
..... (عند الفشل في الدراسة: لماذا لم تكمل تعليمك؟)
.....

٣ - التاريخ المهني:

- هل تعمل؟ نعم () لا () لماذا
- ما هي وظيفتك؟ ما هو دخلك تقريبا
- منذ متى تعمل في هذه الوظيفة؟
- هل هناك مشكلات في العمل ما هي
- هل تنفق على نفسك؟ (نعم) (لا) من ينفق عليك الآن
.....

- إذا كان هناك تنقل بين الوظائف حديثا (٦ شهور)، تسأل: لماذا تركت
العمل السابق؟ وكيف تulous نفسك الآن؟
- هل حدث في فترة معينة من عمرك لم تكن قادرا على الذهاب إلى
العمل أو المدرسة؟ نعم () لماذا
- في حالة الإجابة بنعم: متى كان ذلك؟ ماذا كان السبب؟
.....

- كنت منتظم دائما في العمل أو الدراسة ()
.....

٤ - المرض الحالي:

هل خضعت للعلاج من المرض الذي تعانى منه الآن؟

- نعم () لا ()
.....

عند الإجابة بنعم: ضع علامة أمام ما ينطبق على الحالة فيما يلي:

- ملازم للمستشفى - بالمنزل
.....

- منذ متى؟ ما هي الأدوية الموصوفة لك الشهور أو
الأسابيع الماضية

- ما هو تشخيص الأطباء للمرض الذي عانيت منه؟

- هل تعالج الآن: نعم () لا ()

٥- الشكوى الأساسية:

- الآن ووصف المشكلة

- ما الذي جعلك تأتى للعلاج الآن؟

مسح عام للأعراض والمشكلات النفسية المرضية :

الآن دعني أ أسألك عن بعض المشكلات التي قد تكون واجهتها سنتقونم
الآن بتحديدتها فقط وسوف نتكلم بالتفصيل عنها فيما بعد.

١- هل سبق لك أن عولجت من مرض نفسي؟

نعم () لا ()

٢- أ - ما هو هذا المرض وما هي الأدوية التي تتناولها

ب- هل لديك أعراض أخرى جديدة تستلزم الفحص؟

٣- هل تعرضت إلى حادثة خطيرة أو شاهدتها ولا تتساها أبدا؟

نعم () لا ()

٤- هل تتناول مخدرات أو خمور أو عقاقير طبية تؤثر على حالتك النفسية؟

٥- هل هناك اضطراب وخلل في حياتك الاجتماعية أو المهنية؟

نعم () لا ()

٦- قواعد استبعاد الذهان:

أ - استبعاد الفضام

- هل ترى كائنات أو أشياء لا يرها الآخرون؟

نعم () لا ()

- هل تسمع أصوات تأمرك بفعل سلوكيات معينة؟

نعم () لا ()

- هل أنت كسول وفائد الإرادة لا تفعل أي شيء؟
نعم () لا ()
- هل أنت متبدل المشاعر ولا يوجد لديك فرق بين الحزن والفرح؟
نعم () لا ()
- إذا أجاب الشخص بنعم في واحدة من النقاط السابقة يتم تطبيق الجزء الخاص بالفصام وبيان نوع الفصام
- ب- هل تعتقد أن الآخرين يتآمرون عليك وأن أجهزة المخابرات أو الشرطة يراقبونك ويصورونك بالمنزل أو الشارع؟
في حالة نعم: هل تتنابك ضلالات اضطهاد أو أنك مبعوث إلى الله أو أحد أولياء الله الصالحين؟
• يتم تطبيق الجزء الخاص بالفصام "أ" والبارانويا (الهذاشات)
- ٧- هل تتنابك فترات حزن وكآبة وتشاؤم بشأن حياتك الآن وفي المستقبل (أو النشاط والانطلاق والسعادة كنوبة مفردة أو مع الاكتئاب)؟
نعم () لا ()
- في حالة الإجابة بنعم يتم تطبيق بنود الاكتئاب أو الهوس
- ٨- هل حدث لك أية نوبة رعب وشعرت فجأة بالخوف أو القلق أو شعرت بأعراض بدنية متعاقبة وأنك على وشك الموت؟
نعم () لا ()
• في حالة الإجابة بنعم يتم تطبيق القلق والذعر (الهلع)
- ٩- هل حدث أن كنت خائفاً من الخروج من المنزل بمفردك أو أن توجد في زحام أو تقف بطابور أو تسافر بواسطة القطار أو الأتوبيس؟
نعم () لا ()
• في حالة الإجابة بنعم يتم تطبيق البنود الخاصة بفوبوفيا (رهاب)
الأماكن الواسعة
- ١٠- هل هناك أشياء تخاف منها بشكل محدد كالطيور أو رؤية الدم أو الطيران أو الحقن أو الأماكن المرتفعة أو الأماكن الضيقة أو المغلقة أو أنواع محددة من الحيوانات أو الحشرات؟
نعم () لا ()

• في حالة الإجابة بنعم يتم تطبيق بنود الرهاب

١١- هل حدث أن ضايفتك أفكارا ملحة ليس لها معنى بحيث تميل هذه الأفكار لأن تدور برأيك حتى عندما تحاول أن تطردتها من ذهنك؟

نعم () لا ()

• في حالة الإجابة بنعم يتم تطبيق بنود الوسواس

١٢- هل حدث أن كان هناك شيئاً عليك أن تفعله بشكل متكرر ولا يمكنك مقاومته مثل غسل اليدين مرات عديدة أو العد حتى رقم معين أو مراجعة شيء ما عدة مرات للتأكد من أنك قد فعلته بالطريقة الصحيحة؟

نعم () لا ()

• في حالة الإجابة بنعم يتم تطبيق البنود الخاصة بالوسواس القهري

١٣- في الشهور الستة الأخيرة هل كنت قلقاً وعصبياً بشكل واضح ومصاب بالأرق أو أن نبضات القلب سريعة أو أن لديك مشكلات في النوم أو أنك على حافة الموت؟

نعم () لا ()

• في حالة الإجابة بنعم تطبيق بنود القلق العام والهلع في حال ان الشخص يتعرض لما يشبه الذبحة الصدرية أو لما يشبه التوبة القلبية وحينها تطبق بنود الهلع

١٤- هل تعاني من أعراض جسمانية مثل اضطراب المعدة أو الإمساك أو القولون العصبي ويقول الأطباء انه عرض نفسي أو يحدث عمى أو طرشاً مفاجئاً ومرتبطاً بأحداث ضاغطة؟

نعم () لا ()

• في حالة الإجابة بنعم يتم تطبيق الاضطرابات الجسمية نفسية المنشأ

الفصام

اضطراب يفقد فيه الفرد الاتصال بالواقع (اعتقاداته وأفكاره لا تنافق مع الواقع) حيث يعاني من هلاوس وتوهمات (هذاءات) وتبلد في المشاعر واضطرابات في التفكير وتدھور في القدرات العقلية.

ملاحظة هامة:

يتم تصحيح الاختيارات على النحو التالي:

- لا يوجد

- يوجد بدرجة بسيطة

- يوجد بدرجة كبيرة

? - لا يوجد معلومات لهذا البند

وفيما يلي أعراض تفصيلية للفصام بكافة أنواعه (وهي للتذكرة فقط)

أولاً: توهمات (هذاءات):

؟	٣	٢	١	أ - توهمات الاضطهاد
				- يعتقد في وجود مؤامرة ضده من الزملاء أو الأسرة وهناك من يحاول السيطرة عليه.
				- الأمان أو المخابرات تريد السيطرة عليه (أو على عقله).
				- لديه الموهبة والذكاء والعقورية وهناك من يحاول إفشاله.

ب - توهمات العظلمة

؟	٣	٢	١	ب - توهمات العظلمة
				- يعتقد أنه أذكي البشر ولديه نظريات أو طرق علاج لأمراض مستعصية.
				- يعتقد أنهنبي مرسل بدين جديد أو هوالمهدي المنتظر أو المسيح.
				- يعتقد أن لديه القدرة على اختراع أجهزة متطورة لا يستطيع الآخرون القيام بها.
				- يستطيع قراءة أفكار الناس دون أن يتكلموا.

٤	٣	٢	١	ج- توهّمات التوّهم المرضي
				- يعتقد أنه يعاني من مرض خبيث رغم تكذيب الأطباء
				- يعتقد باختفاء أعضاء من جسمه على الرغم من وجودها
				- يشعر بحدوث تغير في حجم عضو من أعضاء جسمه.

٤	٣	٢	١	د- توهّمات التأويل
				- التأويل بالرغم من عدم حقيقة ذلك.
				- نشرات الأخبار تصدر للإشارة أو التلميح لتصرفاته.
				- أجهزة الإعلام تطلب منه أداء سلوكيات معينة.
				- يعتقد أن تصرفات الآخرين يكون له مدلوّل عدواني.

٤	٣	٢	١	س- توهّمات الأهمية
				- يعتقد أنه على اتصال بأهل الكواكب الأخرى
				- يعتقد أنه على علم بكل ما يحدث في أعماق النفس البشرية

٤	٣	٢	١	ص- توهّمات التأثير
				- يعتقد أنه تحت تأثير السحر.
				- يعتقد أن هناك أجهزة منظورة تؤثر على سلوكه.

٤	٣	٢	١	ل- توهّمات الغيرة والخيانة الزوجية
				- يعتقد بخيانة زوجته (أو تعتقد هي بخيانة زوجها).
				- يغير على زوجته من شخص معين دون وجود (سبب حقيقي).

٤	٣	٢	١	م- توهّمات الحب
				- هناك شخص مهم يحبه (ممثلة أو مغنية مشهورة).

DSM-4 & DSM-5

?	٣	٢	١	- توهّمات الجسمية
				- يعاني المريض من خلل جسمى أو يتخيل فقدانه لجزء من الجسم مثل المعدة أو القلب

ثانياً: الهدوس:

?	٣	٢	١	هلاوس سمعية
				- يسمع أصواتاً تطلب منه تنفيذ أوامر معينة.
				- يسمع أصواتاً تلعنه أو تسبه.
				- يسمع أصواتاً تقول له أنه شاذ.

?	٣	٢	١	هلاوس بصرية:
				- يرى أضواء باهرة على الرغم من عدم وجودها.
				- يرى وجوه مخيفة على الرغم من عدم وجودها.
				- يرى حيوانات تزحف نحوه.
				- يرى سيارات تطير في الهواء.

?	٣	٢	١	هلاوس شمية:
				- يشم رائحة كريهة رغم عدم وجودها
				- يشم رائحة وكأنها تصدر منه رغم عدم وجودها

?	٣	٢	١	هلاوس لمسية:
				- يشعر بأن هناك من يلامسه في مناطق الأعضاء الحساسة رغم عدم وجود ذلك.

?	٣	٢	١	هلاوس تذوق:
				- يشعر بوجود طعم مختلف في فمه رغم أنه لا يوجد شيء في الفم.

ثالثاً: اضطراب التفكير:

٤	٣	٢	١	أ - اضطراب التعبير في التفكير:
				- عدم استطاعة المريض الاستمرار في موضوع واحد.
				- نظائر الأفكار وعجزة عن الانتهاء مما بدأه.
				- لا يستطيع التركيز على المعنى أو الفكرة المطلوبة وإظهارها بوضوح
				- لا يميز بين الحقيقة والخيال.
				- عدم استطاعته التفكير تفكيرا تجريديا (أى يفكر تفكيرا عيانيا).

٤	٣	٢	١	ب - اضطراب مجرى التفكير:
				- يشغل من موضوع إلى آخر دون إكمال الموضوع الأول.
				- يتوقف المريض فجأة عن إكمال موضوع يتحدث فيه.
				- يشكو من كثرة الأفكار ولا يستطيع سردها.
				- يشكو من أن محتوى أفكاره تسحب منه من خلال الآخرين.
				- يشكو المريض من أن هناك أفكارا خارجية تتحممه دون إرادته.
				- يشكو المريض من سرقة أفكاره.
				- توجد لديه ضلالات (الحب، العزمية، الغيرة، الاضطهاد، ويمكن أن تجتمع عدة ضلالات معا).

٤	٣	٢	١	رابعاً: اضطرابات الوجودان:
				- يعاني من تأخر الاستجابة الانفعالية (لو تسطح وجوداني).
				- لا يستطيع الشعور بالانفعالات سواء أكانت سارة أو تعيسة (تبليد وجوداني).
				- يتعرض المريض لقلب حاد في الانفعالات بين الانفعالات السارة وغير السارة.

؟	٣	٢	١	خامساً: اضطرابات الإرادة:
				- الكسل وإهمال النظافة الشخصية.
				- عجز المريض عن اتخاذ أي قرارات.
				- يعاني من السلبية المطلقة (العناد والسلوك عكس ما يطلب منه) في التصرفات.
				- يعجز عن وضع الخطط وتنفيذها.
				- نوبات من التصلب والإصرار على رأي بعينه

؟	٣	٢	١	سادساً: الأعراض الكتاتونية (التخسيبة):
				- توقف في بعض الحركات تصل إلى الغيبوبة التامة.
				- لا يرد على الأسئلة ولا يستجيب لأى منه.
				- نوبات من الهياج العدوانية الشديدة.
				- يتخذ المريض وضعاً معيناً (وكانه تمثال) لا يغيره لمدة ساعات أو أيام.
				- يقلد المريض الكلام والإشارات التي تحدث أمامه.
				- يقوم المريض بحركات متكررة بالرأس أو اليدين إلى آخره.
				- لا يتحدث المريض مطلقاً وكأنه أصيب بالبكير.
				- يكرر المريض الكلام دون وجود رابط منطقي بين المفردات، و كانها بلغة جديدة.
				- ينطق المريض بلغة سرية غير مفهومة.

الفصام

؟	٢	٢	١	معايير تشخيص الفصام: تشير إلى توافر المعايير (أ) و (ب) و (ج).
				أ - الأعراض المميزة (الشأن) أو أكثر من فئات مختلفة مثلاً توهّمات (هذاء) مع هلاوس أو هلاوس مع تبلد وجداً، أو هلاوس مع اضطراب في التفكير.
أعراض الفصام				
١ - هلاوس.				
٢ - توهّمات (هذاءات).				
٣ - اضطرابات وجاذبية.				
٤ - اضطرابات في التفكير.				
٥ - أعراض تخسيبية (كتاتونية).				
٦ - اضطرابات في الإرادة (قد يكون العرض الأول في الفصام المبكر).				
• إذا اقترن اضطراب الوجдан مع اضطراب الإرادة فهذا لا يعتبر فصام ويجب انتظار فترة ٦ شهور أو أكثر لحين لظهور أعراض جديدة.				
ب - الأعراض تستمر لمدة ٦ شهور على الأقل.				
ج - هذه الأعراض تؤثر على حياة الفرد الشخصية والاجتماعية والمهنية.				

يتم جمع التقدير (٢) فقط في كل الأعمدة وتشخيص المرض يكون بوجود عرضين على الأقل بتقدير (٢) أي (٤) درجات وإذا زاد عن ذلك فإنه يعني شدة المرض

أنواع الفصام :

لكي يشخص المرض لابد من انطباق الأعراض بدرجة شديدة (٣) على الأقل ولا تحسب الدرجات الأخرى (الدرجة (١) و (٢) لا تعد ولا تحسب).

المجموعة الأولى

معايير تشخيص أنواع الفصام

؟	٣	٢	١	الفصام المتأثر: توفر المعيار "أ" من معايير تشخيص الفصام، و توافر عرضين مما يلى:
				١- تفكك الكلام.
				٢- تفكك السلوك.
				٣- نسطح العواطف أو عدم ملاءمتها
				٤- بشرط عدم توافر خصائص النوع (التخسيبي) الكتاتوني

؟	٣	٢	١	النوع الكتاتوني: يتوفّر اثنان (عرضان) مما يلى:
				١- التوقف الحركي كما يتبين في التخسب وكأنه تمثّل في وضع معين.
				٢- النشاط الحركي المفرط الذي يتسم بعدم وجود هدف.
				٣- السلبية الشديدة (مقاومة كل التعليمات).
				٤- حركات متكررة (غريبة).
				٥- ترديد الكلمات أو الأفعال.

؟	٣	٢	١	الفصام المبكر: يوجد ثلاثة أعراض مما يأتي: ولا بد من توافر البند الأول
				١- يحدث في سن مبكر (المراهقة).
				٢- ضعف الإرادة وبدأ بالكسيل وعدم العناية الشخصية.
				٣- هلاوس.
				٤- توهّمات.
				٥- اضطرابات في التفكير.

				الفحص غير المتميّز:
٤	٣	٢	١	
				أ - تتوافر فيه ما يلي :
				١ - هلاوسن.
				٢ - أعراض سلبية (العناد أو يفعل عكس مما يطلب منه).
				ب - بشرط ألا تتوافر فيه: البارانويا أو تفكك الكلام أو السلوك شديد التفكك أو التخسيبي (الكتاتوني).

يتم الأخذ بالدرجة المتوسطة فقط ل (أ) و (ب) مما يلي:

				الفحص المتبقّي (الأعراض المتبقّية)
٤	٣	٢	١	درجة متوسطة
				أ - وجود ما يدل على استمرار الاضطراب بصورة أقل حدة.
				ب - غياب أو وجود أعراض بصورة مخفضة في اثنين على الأقل مما يلي :
				١ - أعراض سلبية (العناد أو يفعل عكس مما يطلب منه).
				٢ - توهّمات.
				٣ - الهلاوسن.
				٤ - تفكك الكلام.
				٥ - السلوك المتفاكم.
				٦ - الكتاتوني (التخسيبي).

DSM-4 & DSM-5

				الاضطراب الفصامي المؤقت: (الشهر فقط)
؟	٣	٢	١	
				١- تتوافق فيه ما يلي:
				أ - وجود الأعراض المميزة (أ) من معايير تشخيص الفصام.
				ب - استبعاد اضطراب الفصام الوجданى وأضطرابات المزاج.
				ج - استبعاد حالات الإدمان والمرض الجسمى.
				د - وجود نوبة اضطراب لمدة شهر على الأقل (وتقى عن ستة أشهر وإلا أصبحت فصاماً مزمناً).
				٢- وجود أعراض تتناسب مع المرض (مآل) حسن مثل:
				أ - وجود أداء اجتماعى ومهنى جيد قبل المرض.
				ب - عدم وجود تبدل أو تسطيح وجذانى.

				اضطراب الفصام الوجданى:
؟	٣	٢	١	
				١- وجود فترة متصلة من الكتاب أو الهوس أو نوبة الكتاب - هوس مختلطة. بشرط وجود الأعراض الفصامية في (أ)، وتستمر الأعراض الفصامية لمدة أسبوعين على الأقل ولا يصاحبها - في هذه الأثناء - أعراض وجذانى.
				٢- هناك نوعان الأول مرتبط باضطراب ذهانى دورى (هوس - الكتاب أو هوس فقط، والنوع الثانى مرتبط بالكتاب الأساسى).

				الاضطراب الذهانى القصير (الموجز):
؟	٣	٢	١	
				أ - وجود واحد أو أكثر مما يلى:
				١- توهمات.
				٢- هلاوس.
				٣- تفكك الكلام.
				٤- سلوك شديد التفكك أو تخسي (كتاتونى).
				ب - مدة النوبة: إلا تزيد عن شهر واحد، يعود المريض بعدها إلى السواء التام.

نص المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الاضطرابات النفسية DSM-4

؟	٣	٢	١	الاضطراب الذهانى المشترك:
				أ - نشوء توهّم ناجم عن التفاعل مع مريض فصامي آخر (قريب أو صديق أو زميل).
				ب - التوهّم مشابه في محتواه لما لدى الشخص المريض (الأخر).

؟	٣	٢	١	اضطراب ذهانى ناتج عن مرض جسمى:
				أ - وجود هلاوس أو توهّمات.
				ب - يشترط أن تكون الأعراض ناجمة عن مرض جسمى.

؟	٣	٢	١	اضطراب ذهانى ناتج عن تعاطي المواد المخدرة: توفر المحکات الثلاثة التالية:
				أ - هلاوس أو توهّمات ولا يكون الشخص مستبّصاً بأنها ناتجة عن مادة مخدرة.
				ب - الأعراض ناتجة عن التعاطي أو التوقف عن التعاطي.
				ج - قد تكون أعراض جانبية لدواء معين.

المجموعة الثانية

الفصام الذهاني (البارانويا)

وجود توهمات (هذايـات) العـظـمةـ والـعـقـرـيـةـ وـاضـطـهـادـ الآـخـرـينـ،ـ وـيشـكـ بالـآـخـرـينـ وـأـنـهـ يـتـأـمـرـونـ ضـدـهـ،ـ وـأنـ المـخـابـراتـ أوـ الشـرـطـةـ تـراـقـبـهـ،ـ وـأنـ هـنـاكـ كـامـيرـاتـ تـصـورـهـ فـيـ الـبـيـتـ وـالـشـارـعـ،ـ وـأنـ التـلـيـفـزـيـونـ وـالـرـادـيوـ يـوجـهـونـ لـهـ رـسـائـلـ لـكـيـ يـسـلـكـ بـطـرـيـقـةـ مـعـيـنـةـ.

وجود توهمات مع هلاوس مسيطرة على الفرد مع احتفاظ الفرد بقدراته العقلية دون تدهور

؟	٣	٢	١	النوع الذهاني (البارانوي): توفر المعايير التالية:
				أ- الانشغال بوحد أو أكثر من الضلالات
				ب- وجود هلاوس سمعية متكررة
				ج- يشترط عدم وجود أعراض أخرى كفك الكلام وتفكك السلوك وسطح العواطف أو عدم الملاءمة

يختلف عن إضطراب التوهمات بوجود هلاوس سمعية متكررة
ملاحظة: لا تتحسب الدرجات الأخرى (مثل ١)

اضطراب التوهمات

وجود اضطراب التوهمات مسيطرة على الفرد مع احتفاظ الفرد بقدراته العقلية دون تدهور

٤	٣	٢	١	اضطراب التوهمات :
				١ - وجود توهمات (ممكنة الحدوث) مثل: أن هناك من يطارده أو يريد أن يسممه أو أن يصاب بعذوى أو تخدعه زوجته أو أنه مريض).
				ب- بشرط إلا تتوافق فيه المعيار (ا) من معايير تشخيص القصام على الإطلاق، أحياناً توجد هلاوس لمسمى أو شمسيه ترتبط بموضوع التوهم وتدعمه.
				أ. وبشرط إلا يعاني عجزاً ملحوظاً وسلوكه ليس شادياً بصورة واضحة.
				ب. كما يشترط أنه إذا حدثت توبيات وجاذبية مزاجية (مع التوهمات) فإن مدتها تكون قصيرة.
				أنواع التوهمات: ضلاله الحب أو العظمة أو الغيرة أو الاضطهاد أو الجسدية (مثلاً أن معدته غير موجودة) أو المختلطة.
				ج. ويشترط حدوث أكثر من نوع من التوهمات السابقة معاً لمدة ٦ شهور

المجموعة الثالثة

تحسب الدرجة المتوسطة فقط :

٤	٣	درجة متوسطة	٢	١	اضطراب ذهانى غير محدد:
					أ - وجود أعراض فصامية متناقضة ولا تستوفى المعيار (أ) من معايير تشخيص الفصام؛ أي يوجد عرض واحد وبدرجة متوسطة.
					ب - أعراض ذهانية لمدة أقل من شهر.
					ج - هلاوس سمعية فقط.
					د - ضلالات ليست غريبة تماماً تتدخل مع نوبات مزاجية.
					س - ذهان ما بعد الولادة
					و - أعراض ذهانية بدرجات متوسطة ولأسباب غير معلومة و لا يؤثر بشدة على توافق الفرد مع البيئة المحيطة به

ذهان الهلاوس البصرية والسمعية :

- أ - توجد هلاوس بصرية بمفردها أو هلاوس بصرية مع سمعية، مع تماسك في التفكير، ويكون الشخص متاكداً من أن هلاوسه أو ضلالاته حقيقة، مثلاً هناك حالة تقول أنها شاهد الأحداث وهي تتظاهر وتتصطدم بالجدار وهناك حالات تذكر هلاوس مرئية وبصرية فقط (مثل أنه مخاوي وله زوجة من الجن) ولا يشتكى من إيه أعراض أخرى.
- ب - لا تتطبق عليه أعراض الفصام الأخرى.
- ج - مستمر لستة أشهر على الأقل.
- د - لا يؤثر على الحياة الاجتماعية والمهنية.
- ه - يحتاج المريض لعلاج شخصى أو معرفي.

الاكتئاب

قد يكون عرض ثانوي لعرض أساسي (أولى) مثل الفصام أو اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة... الخ ويشعر فيه المريض بالحزن والهم وتحقير الذات واضطرابات النوم وفقدان الشهية (أو زيادتها) وقد تكون الأعراض السابقة مرض مستقل بذاته وغير مصحوب بأعراض نفسية أخرى.

نوبة الاكتئاب الأساسي أو العظمى :

أ- تشخيص بوجود خمسة (أو أكثر) من الأعراض الآتية خلال مدة أسبوعين:				
؟	٣	٢	١	
				١- مزاج مكتئب معظم اليوم ولمدة أسبوعين على الأقل بأن يقول ذلك أو يقولها المحيطين به.
				٢- نقص الاستمتاع بالأنشطة التي يقوم بها الفرد في معظم اليوم.
				٣- نقص أو زيادة ملحوظة في الوزن.
				٤- الأرق أو النوم المفرط كل يوم تقريباً.
				٥- تهيج (هيجان) أو تأخر في الاستجابة الحركية.
				٦- التعب بسرعة.
				٧- الإحساس بانعدام قيمة الذات أو لوم الذات.
				٨- الإحساس المفرط بالذنب.
				٩- ضعف التركيز.
				١٠- أفكار متكررة عن الموت أو التفكير في الانتحار أو محاولة الانتحار.
				١١- تبدد الشخصية (إحساسه ورغباته غريبة عنه) العالم المحيط به خيالي.
				١٢- التشاؤم بشأن المستقبل.
				١٣- الشعور بعدم القيمة.
				١٤- التردد والعجز عن اتخاذ القرار.
				١٥- ضعف الشهية أو زيادتها بشكل ملحوظ.

			- أعراض قلق جسماني (مثل: جفاف الحلق - اضطراب الهضم - الآم بالمعدة أو الأمعاء - خفقان القلب).
			إذا صاحبت بعض الأعراض السابقة أعراضًا ذهانية مثل الضلالات (الهدايات) والهلاوس فيصنف فصام وجданى (بشرط أن يستوفي المعيار "أ" من معايير تشخيص الفصام).

أنواع الاضطراب الاكتئابي :

- ١- اضطراب اكتئابي أساسي نوبة مفردة فقط (مرة واحدة).
- ٢- اضطراب الاكتئاب الأساسي (النوبات المتكررة) أو وجود نوبتين أو أكثر من نوبات الاكتئاب الأساسي (توفر المعيار "أ" في الاكتئاب الأساسي) و تكون هناك فترة توقف للأعراض لفترة لا تقل عن شهرين بين النوبة والأخرى.
- ٣- اضطراب نوبات اكتئابية منفصلة الديستيميا (مدة النوبة لا تقل عن شهرين متتابعين) ولا توجد أفكار انتحارية، ولا يوجد انعدام (خلل شديد) في الشخصية وتتصف بالآتي:

محكات تشخيص الديستيميا			
٤	٣	٢	١
			أ - مزاج مكتتب معظم اليوم، وفي اغلب الأحوال تستمر النوبات مدة سنتين على الأقل
			ب- بالإضافة إلى اثنين مما يلى:
			١- ضعف الشهية أو الإفراط في الأكل.
			٢- الأرق أو الإفراط في النوم.
			٣- التعب السريع.
			٤- نقص تقدير الذات.
			٥- ضعف التركيز أو صعوبة اتخاذ القرار.
			٦- الشعور بفقدان الأمل.

- ٤- **الاضطراب الاكتئابي غير المحدد:**
اضطراب اكتئاب لا يمكن تصنيفه في الفئات السابقة، ومن أمثلة
الاضطراب الاكتئابي غير المحدد:
 - اضطراب عسر المزاج قبل الطمث.
 - اضطراب اكتئاب الخفيف ويشمل عددا قليلا من البنود الخمسة المطلوبة
لتشخيص اضطراب الاكتئاب الأساسي.
 - نوبات الاكتئاب المختصر وتستمر من يومين إلى أسبوعين وتحدث مرة كل شهر ولمدة ١٢ شهر (ولا ترتبط باضطرابات الطمث).
 - الاكتئاب الصاحب للمرحلة المتبقية للفصام (يصنف بأنه فصام متبقى).
 - نوبات اكتئاب أساسية مرتبطة بالفصام النشط مرتبطة بالضلالات ويصنف
بأنه ذهان الضلالات الوجاهية.
وذلك بشرط صعوبة تشخيص الاكتئاب ضمن الأنواع السابقة من الاكتئاب.

نوبات الهوس

محكات تشخيص نوبات الهوس:				
٤	٣	٢	١	
				أ - المزاج المرتفع العالي وسرعة الاستئارة بشكل شاذ ودائم لمدة أسبوع على الأقل (وفي حال الاستمرار قد يستوجب العلاج أو الحجز بالمستشفى).
				ب - هناك ثلاثة (أو أكثر) من الأعراض التالية (وأربعة إذا كان الشخص سريع الاستئارة) بدرجة ملحوظة: <ul style="list-style-type: none"> ١- تضخم الذات أو العظمة. ٢- قلة الحاجة إلى النوم والنشاط الزائد. ٣- الشرارة المبالغ فيها. ٤- تطوير الأفكار.
				٥- تشتت الانتباه (الاهتمام، بالمثيرات الخارجية غير الهامة).
				٦- زيادة النشاط الموجه لهدف اجتماعي أو الجنس أو النفسحركي.

				٧- التورط في أنشطة ممتعة خطيرة مثل الدخول في مشاريع ضخمة فاشلة أو الطيش الجنسي أو الشراء السفيفي).
				٨- لديه قوة خاصة (غالباً مستمدة من الله أو من شخص ذي نفوذ).

- يصبح هوساً ذهانياً إذا كان مصحوباً بضلالات أو هلاوس.

نوبة الهوس الخفي:

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص نوبة الهوس الخفي
				١- فترة محددة من المزاج المرتفع أو المتعاظم أو سهولة الاستئثار (المدة أربعة أيام على الأقل) ولا تزيد عن أسبوعين.
				٢- توفر المعيار "أ" لنوبة الهوس ؛ أي وجود ثلاثة أو أكثر من أعراض الهوس في نوبة الهوس كما سبق.

نوبة هوس وحيدة :

شخص بوجود نوبة هوس واحدة فقط ولا ترتبط بنبوبات اكتتاب أساسى.

الاضطرابات ثنائية القطب وتنقسم إلى:

- ١- نوبة هوس - اكتتاب خفي: توجد نوبة مختلطة واحدة على الأقل (توجد نوبة اكتتاب خفيف تسبق تفاقم المرض "أ" في الاكتتاب،
- ٢- نوبة هوس شديد - اكتتاب شديد: ويشترط توفر المعايير "أ" في الاكتتاب، و توجد نوبة اكتتاب أساسى واحدة أو نوبة مختلطة تسبق نوبة الهوس الشديد ("الحادي")
- ٣- نوبات اكتتاب عظيم متكررة مع نوبات هوس خفي
- ٤- اضطراب المزاج الدوري (السيكوسيميا، أي اكتتاب خفي - هوس خفي): ويستمر مدة سنين على الأقل، وتوجد أعراض هوس خفي مع فترات عديدة من الاكتتاب (لا تستوفي المعايير الخاصة بنوبة

- الاكتئاب الأساسي) (بالنسبة للأطفال والمرادفين يجب أن تكون المدة سنة على الأقل)
- اضطراب ثانوي القطب غير المحدد: وأمثلة ذلك:
 - التبدل السريع جداً بين الهروس والاكتئاب والذي لا يفي بالحد الأدنى للمرة التي يتطلبها تشخيص نوبة الهرس أو الاكتئاب.
 - نوبات من الهرس الخفيف لا تتعرض لها أعراض اكتئابية.
 - نوبة هرس أو مختلطة ترتبط بالفصام المتبقى أو الاضطراب التوهمي أو أي مرض ذهاني آخر.
 - العجز عن التشخيص الدقيق لأي من الفئات السابقة.
 - اضطراب المزاج الناتج عن أمراض جسمية:

٤	٣	٢	١	اضطراب بارز ومستمر في المزاج ويقسم بالآتي:
				١- مزاج مكتتب.
				٢- نقص الاهتمام ونقص الاستمتاع بالأنشطة.
				٣- مزاج مرتفع أو متاعظم.
				٤- سهولة الاستثارة.
				٥- الاضطراب نتيجة مباشرة لأعراض جسمية عامة مثل السرطان أو القلب أو مرض نقص المناعة (الإيدز) أو الإعاقات الجسمية... الخ.

اضطراب المزاج الناتج عن تعاطي المواد المخدرة:

- أ - اضطراب بارز ومستمر في المزاج يتميز بإحدى السماتتين:
 - ١- مزاج مكتتب أو نقص الاهتمام ونقص الاستمتاع بجميع الأنشطة.
 - ٢- مزاج مرتفع أو متاعظم أو سهولة الاستثارة.
- ب- يتشرط أن يكون ناتجاً من التسمم بمادة مخدرة أو التوقف عن تعاطيها (أعراض الانسحاب)
- ج- هناك علاقة سلبية و مباشرة لاستخدام دواء أو عقار معين.

الهوس النوعي

هوس إزالة الشعر:

- فقدان الشعر في منطقة مشعرة بالجسم
- الشعور بالقلق قبل إزالة الشعر
- الاستمتاع بازالة الشعر
- يجب ألا يكون مرتبطاً بهلاوس أو هذاءات أو مرض جسمى أو جلدي
- أن يؤثر ذلك (سلبياً) على الحياة الاجتماعية والمهنية للفرد

هوس السرقة:

- رغبة جامحة لا يستطيع الشخص إيقافها في السرقة واندفاع قهري لسرقة أشياء (تافهة وقد تكون غالبية). وقد لا يحتاجها الفرد.
- يشعر الشخص بالقلق قبل السرقة والارتياح بعد السرقة
- وهي ليست استجابة لهذاءات أو هلاوس

هوس الحرائق:

- الرغبة في إشعال الحرائق في الحدائق في المنازل أو في المحلات وقد يسلم نفسه للشرطة، وهي رغبة جامحة لا يستطيع مقاومتها.
- قلق وتهيج وجاذب قبل إشعال الحرائق وتشوق لإشعال النار ورؤيه توابعه.
- يسعد برؤيه الحرائق في منطقته.
- وقد يشعل النار لإحداث إنذار كاذب للحرائق وقد يشتراك في إطفاء الحرائق.
- وهي ليست نتيجة لهذاءات أو هلاوس.

هوس المقامرة:

- سلوك مرضي متكرر لا يستطيع السيطرة عليه.
- يؤثر بالسلب على العائلة والعمل.

- تسيطر عليه فكرة المقامرة في الماضي والآن والمستقبل.
- يرغب في الإثارة أكثر من مجرد الحصول على المال.
- يشعر بعدم الراحة إذا توقف عن المقامرة.
- قد تكون المقامرة هروبًا من المشكلات الشخصية أو المزاجية.
- يعتمد على الآخرين في تمويل المقامرة.
- إنكار القيام بالمقامرة.
- قد يسرق أو ينصب للحصول على المال.
- قد يفقد زوجته أو عمله نتيجة المقامرة.

اضطراب القلق العام

القلق العام هو حالة من التوتر وعدم الراحة تنتاب الفرد دون وجود سبب (بيئي) واضح لذلك، وينكر الفرد أن ضغوط الحياة (مثل الامتحانات أو مرض الوالد أو مشاكل أسرية الخ) هي السبب في هذا القلق، أي أن القلق هو حالة لا شعورية لإظهار التوتر الذي ينتاب الفرد.

محكّات تشخيص اضطراب القلق العام				
؟	٣	٢	١	
				أ - قلق وشعور بالهم وتوقعسوء والشر لمدة ستة شهور على الأقل، ويكون بسبب العمل أو الأسرة... الخ.
				ب - لا يستطيع الشخص السيطرة على قلقه.
				ج - يقترن القلق بثلاثة (أو أكثر) من الأعراض التالية (بالنسبة للأطفال يكفي عرض واحد فقط).
				١ - الشعور بعدم الراحة.
				٢ - وجود أفكار أو وساوس حول موضوعات مهمة أو غير مهمة.
				٣ - الشعور بأنه على الحافة ومتازم وقد يتعرض للموت.
				٤ - العجز عن بلع الطعام.
				٥ - ضعف التركيز أو أن ذاكرته لا شيء فيها.
				٦ - الشعور بالتعب (من دون بذل مجهود).
				٧ - التهيج بسهولة.

DSM-4 & DSM-5

		٨- عدم الصبر.
		٩- يسهل تشتتِه (بعيداً عن ما يؤديه).
		١٠- تقلص بالعضلات.
		١١- الأرق أو صعوبة النوم أو صعوبة الاستمرار في النوم العميق، أو النوم لساعات قليلة (ثلاث أو أربع ساعات فقط).
		١٢- عرق غزير.
		١٣- متاعب بالمعدة (أو الأمعاء).
		١٤- تقطيع عند التنفس.
		١٥- إسهال.
		١٦- صداع.

كما أن هناك أمراضًا تعتبر مظهراً من مظاهر القلق الشديد (مرض عضوي) مثل التعبية والبهق.

قلق العرض الواحد

قد يحدث للشخص عرض واحد فقط، المهم هو ألا يؤثر ذلك على حياة الفرد الاجتماعية والمهنية والجنسية، وإلا اعتبر مريضاً بالقلق.

الوسواس القهري

وجود أفكار متكررة وملحة وغير منطقية ولا يستطيع الفرد إيقافها رغم علمه أنها خاطئة وغير منطقية، وقد تكون أفكاراً أو أفعالاً أو كليهما.

اضطراب الوسواس القهري:

- ١- فكرة أو صورة لمنظر حسن أو سيء أو جملة معينة أو مقطع موسيقى (مثلاً إن أحداً سيقتله، أو أنه سيشتم رئيسه في العمل أو يتعرض أحد أفراد أسرته لحادثة خطيرة أو للموت إذا لم يفعل سلوكيات أو أفعالاً معينة)
- ٢- الاندفاعات: رغبة جامحة لأن يقوم بأفعال لا يرضى عنها ويحاول مقاومتها. مثلاً التأكد من غلق الأبواب والأجهزة قبل النوم مرات عديدة، ترتيب الأشياء أو الأعمال بطريقة معينة وإن أخطأ فإنه يعيد أفعاله مراراً، وأن هناك أفكاراً تطارده مثل العداوة على الآخرين أو قتل أمه أو الانتحار من مكان مرتفع أو الغناء في مائتٍ أو تسميع جدول الضرب أو شتم الذات الإلهية. والاندفاعات قد تكون تافهة أو خطيرة والشخص يعرف أنها غير منطقية ولكن لا يستطيع التحكم فيها أو وقفها.
- ٣- اجترار الأفكار: تطارده الأفكار بأسئلة يصعب الإجابة عنها مثلاً من خلق الله، لماذا يوجد المرض والمعاناة في هذا العالم، أو أن هناك احتمالاً بأن أباها قد اغتصبها وهي طفلة (لا تعي شيئاً) وقد ترتبط المخاوف المرضية بالوسواس مثل الخوف من أماكن العبادة أو المطابخ أو دورات المياه، ويعتبر ذلك عرضاً ثانوياً لوسواس مرتبط بهذه الأماكن.
- ٤- الطقوس الحركية: مثل غسل الأيدي عشرات المرات أو الخوف من التلوث والاستحمام المتكرر للطهارة أو تكرار الصلاة أو العد الاجباري للأرقام تنازلياً أو تصاعدياً أو مراجعة إغلاق البوتجاز مرات عديدة للغاية أو الترتيب المفرط للأشياء وقد تستمر هذه الطقوس لساعات.

٥- يتم التعامل مع الأفكار الوسواسية والأفعال القهريّة باعتبارهما تعبيراً عن خلل معرفي نابع من مصدر واحد، أي لا يوجد فرق بين الفكرة أو الفعل.

أولاً: الوسواس :

				محكّات تشخيص اضطراب الوسواس
؟	٣	٢	١	
				أ - يجب أن تتوفر النقاط الثلاث التالية لكي يشخص:
				٦- اقتحام أفكار أو اندفاعات أو صور ذهنية متكررة ومستمرة وتسبب له القلق والشعور بالكره والضغط لا تنحور هذه الأفكار حول مشكلات حياتية حقيقة.
				٧- محاولة الشخص تجاهل أو إيقاف هذه الأفكار أو الاندفاعات أو الصور.
				٨- إدراك الشخص أن الأفكار أو الاندفاعات أو الصور الذهنية هي نتاج عقله هو وليس مقحمة عليه من الخارج.
				ب- بشرط أن تعوق هذه الوسواس الفرد عن أنشطة هامة في مجالات حياته السوية كالعمل أو المذاكرة وتستغرق وقتاً طويلاً (أكثر من ساعة في اليوم)

ثانياً: الأفعال القهريّة :

				محكّات تشخيص اضطراب الأفعال القهريّة:
؟	٣	٢	١	
				أ - يجب أن تتوفر النقاط الثلاث التالية لكي يشخص:
				١- سلوكيات متكررة أو أفعال متكررة يدفع الفرد إلى تأديتها استجابة لوسواس أو اتباعاً لقواعد قام بإحداثها ويتوجب عليه أن يطبقها.
				٢- تهدف هذه السلوكيات إلى منع وقوع كرب أو مصيبة له أو لأحد أفراد أسرته.
				٣- يدرك الفرد أن الأفعال القهريّة غير معقولة وغير واقعية.
				٤- هذه السلوكيات تعوق حياة الشخص الطبيعية وأدائه في مختلف المجالات المعتادة.

هناك حالات لا يدرك فيها الشخص أن لديه وساوس مرضية وهذا يحتمل أن:

- ١- أن الشخص ذو ذكاء أقل من المتوسط
- ٢- أن الوساوس قد يكون مقدمة للذهان

اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

تسببه الأحداث والمواقف المروعة مثل الحروب والكوارث والحوادث وموت عزيز. ويستعيد الفرد الخبرات الصارمة في الأحلام وكذلك صور لها وهو يقظ. وينتاب الفرد صداع شديد وأرق وتوتر وكوابيس وصداع وقد يشعر بانفصال وانشقاق لذاته (وكانه شخص آخر أو شخص مختلف) لمدة ساعات أو أيام. وقد يشعر بالقلق والإكتئاب والشعور بالذنب وسرعة في نبضات القلب، وقد يصاب (أحياناً) بهلاوس بصور بصرية غير مرئية.

اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة:

				محكات تشخيص اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة
٤	٣	٢	١	
				أ - تعرض الشخص لحدث صادم بحيث يتوافر فيه شرطين: ١- معايشة الفرد لحدث كبير مثل الموت أو الجرح الخطير أو التهديد الحقيقي للسلامة الجسمانية له أو للآخرين ٢- تسبب هذه المعايشة خوف أو ذعر شديد
				ب - تكرار معايشة الحدث الصادم بطريقة أو أكثر مما يلي (بند واحد يكفي للتشخيص): ١- تراود الشخص ذكريات مؤلمة للحدث بصورة آلية وغير متحكم فيها تتضمن صوراً ذهنية أو أفكاراً أو ادراكات حسية. ٢- تراود الشخص أحلاماً صدمية تدور حول الحدث المؤلم

		<p>٣- يعايش الشخص الحدث وكأنه موجود أمامه. ويتضمن ذلك الخداعات الحسية والهلاوس ونوبات من الذكريات المرتبطة بالحدث الصادم.</p>
		<p>٤- الشعور بالألم النفسي الشديد لأي شيء يذكره بالحدث الصادم.</p>
		<p>٥- وجود تفاعلات فسيولوجية حادة مثل زيادة نبضات القلب أو العرق... الخ.</p>
		<p>ج- محاولة الفرد تجنب المنبهات المرتبطة بالصدمة وقد يحدث له تبلد في الاستجابات العامة (لم تكن موجودة قبل الصدمة) ويتبيّن ذلك في ثلاثة أو أكثر مما يلي:</p>
		<p>١- محاولة الشخص تجنب الأفكار أو المشاعر المرتبطة بالصدمة.</p>
		<p>٢- تجنب الأنشطة أو الأشخاص أو الأماكن التي ربما تثير الذكريات الصادمة.</p>
		<p>٣- ينسى الفرد جانباً أو أكثر من الخبرات الصدمية.</p>
		<p>٤- نقص ملحوظ في الاهتمام أو مشاركة الآخرين في مهام مهمة.</p>
		<p>٥- الشعور بالاغتراب عند الآخرين.</p>
		<p>٦- اضطراب في الوجдан كان يعجز الفرد عن الشعور بالحب.</p>
		<p>٧- التساؤم من المستقبل.</p>
		<p>د- وجود أعراض دائمة لزيادة الاستثارة وتتبيّن في اثنين أو أكثر مما يلي:</p>
		<p>١- صعوبة البدء في النوم أو موافقة النوم.</p>
		<p>٢- سهولة الاستثارة ونوبات الغضب.</p>
		<p>٣- صعوبة التركيز.</p>
		<p>٤- اليقظة المفرطة.</p>
		<p>٥- زيادة استجابة الإjection (الخصبة).</p>

اضطراب الضغط الحاد

يحدث خلال شهر من التعرض لحدث بيئي مثل الحوادث أو التهديد بالموت، وتنبض الاستجابة العاطفية ويشعر بالذنب ونقص التركيز وإخلال الانسجة (كانه في حلم أو منفصل عن جسمه أو أنه غير حي (مش عايش) ولا يستطيع الاستمتاع بمباهج الحياة.

اضطراب الضغط الحادة (شبة الذهانية) :Acute Stress disorder

؟	٣	٢	١	محاكاة تشخيص اضطراب الضغط الحادة (شبة الذهانية)
				أ - تعرض الشخص لحدث صادم يتضمن ما يلي:
				١- مواجهة أو مشاهدة حدث أو أكثر تشمل موت أو إصابة خطيرة حقيقة أو مثلت تهديدا للسلامة الجسمية له أو للآخرين.
				٢- أظهر هذا الحدث خوفاً أو ذعراً أو عجزاً.
				ب- يظهر لدى الشخص ثلاثة أو أكثر من الأعراض التالية:
				١- تبدل الاستجابة الانفعالية.
				٢- حالة من الذهول ونقص الوعي بالأشياء المحيطة.
				٣- عدم الإحساس بالواقع وكأنه خارج الصورة.
				٤- اختلال الانسجة لا يميز بين ذاته عن باقي الخبرات والشعور بعدم واقعية الذات.
				٥- العجز عن تذكر جانب مهم من الصدمة
				ج- معانقة الحدث الصادم باستمرار بوحدة على الأقل من الطرق الآتية:
				١- صور ذهنية متكررة أو أفكاراً أو أحلاماً.
				٢- تحبب ملحوظ للمثيرات التي تثير الذكريات الصدمية.
				٣- ظيور أعراض من القلق أو زيادة الاستثارة وصعوبة النوم وضعف التركيز، التقلقل الحركي (التممل) أو عدم الاستقرار.

اضطرابات التوافق :

٤	٣	٢	١	محكّات تشخيص اضطرابات التوافق
				أ - وجود أعراض انفعالية أو سلوكية استجابة لضغط معروفة حدثت خلال ثلاثة شهور ماضية.
				ب - تتنسّم هذه الأعراض بـ:
				١- كرب ملحوظ ومبالغ فيه عند مواجهة مثل هذه المواقف الضاغطة.
				٢- عجز جوهري وفشل في التكيف في الحياة الاجتماعية والمهنية.
				ج- لا علاقة للأضطراب بالأمراض النفسية الأخرى.
				د- لا يشمل ذلك الحزن العميق كما في الاكتئاب.
				هـ- يختفي الأضطراب بعد زوال سبب الكرب (في خلال ستة شهور).
				و- يعد اضطراباً حاداً إذا كانت فترة حدوثه أقل من ستة شهور.
				ز- يعد الأضطراب مزمناً إذا تجاوزت مدة الستة شهور

الهلع ورهاب الأماكن المفتوحة أو الواسعة

اضطراب الهلع :

تنتاب الفرد نوبات من القلق والخوف الشديد، ويعتقد الفرد أنه قد يموت أو يصاب بالجنون ويستمر لدقائق أو ساعات. وهناك حالات تستمر فيها حالة الهلع لعدة شهور.

نوبات الهلع ورهاب الأماكن المفتوحة تصاحب اضطرابات نفسية عديدة، ولذلك فقد وضعت معايير مستقلة لنوبة الهلع ورهاب الأماكن المفتوحة ولا يجوز تشخيص أي منها كمرض مستقل

نوبة الهلع :

محكات تشخيص نوبة الهلع				
٤	٣	٢	١	
				اضطراب (غير مستقل) أي يرتبط أو يصاحب اضطراب نفسي آخر. وتتبين نوبة الهلع من خلال أربعة (أو أكثر) من الأعراض التالية، وتبلغ الذروة خلال عشر دقائق:
				١- قوة ضربات القلب أو زيادة سرعة هذه الضربات عن المعتاد.
				٢- العرق.
				٣- الارتعاش.
				٤- ضيق التنفس أو الشعور بالاختناق.
				٥- الشعور بغصة (حاجز) في الحلق.
				٦- ألم أو ضيق بالصدر.
				٧- غثيان أو تواعك بالبطن.
				٨- الشعور بالدوخة أو الإغماء.
				٩- الإحساس بأن الشخص قد تغير وأصبح إنساناً آخر.
				١٠- الخوف من الإصابة بالجنون.
				١١- الإحساس بالتنميل (الحدر) أو النخز (في العظام).
				١٢- الخوف من الموت

DSM-4 & DSM-5

رهاب الأماكن الواسعة :

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص نوبة الهلع
				اضطراب (غير مستقل) أي يرتبط أو يصاحب اضطراب نفسي آخر. ويجب توفر المعايير التالية لتحديد وجود أعراض مرضية:
				أ - الخوف من الأماكن أو المواقف التي يكون فيها الهروب صعباً أو لا تتوفر فيها وسائل الإغاثة. مثل وجود الشخص بمفرده خارج البيت أو في السوق (حيث يمكن أن تتفاقم نوبة قلبية ويموت ولا يراه أو يسمعه أحد)، أو أن يكون فوق جسر أو داخل قطار.
				ب - ان يقوم بتجنب هذه المواقف تجنبًا مقصودًا كأن يقلل من ذهابه للسوق.
				ج - يعني إذا واجه موقفاً مثيراً للهلع.
				د - يتشرط ألا يكون من الممكن تفسير هذا الهلع بارجاعه إلى الخوف الاجتماعي.

اضطراب الهلع غير المصحوب بالخوف من الأماكن الواسعة :

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص نوبة الهلع غير المصحوب بالخوف من الأماكن الواسعة
				أ - توفر الشرطان الآتيان:
				١- تكرار حدوث نوبات ذعر غير متوقعة.
				٢- وجود عدة نوبات تتسم بالآتي:
				- شعور بالهم خوفاً من حدوث نوبات جديدة.
				- فلق مرتفع خوفاً من عواقب النوبة (مثل الإصابة بنوبة قلبية أو الإصابة بالجنون)
				- يؤثر على سلوكيات الفرد التي تتعلق بالنوبات (كان يغير جدول أعماله أو يتجنب موقف أو أماكن معينة لكي يقلل من حدوث النوبة).

				٣- يجب استبعاد وجود رهاب الأماكن الواسعة.
				٤- يجب استبعاد وجود الخوف (الرهاب) الاجتماعي.
				٥- أن تؤثر النوبات على حياة الفرد وأنشطته اليومية بشكل يعوقها.

اضطراب البُلْع المصحوب برهاب الأماكن الواسعة :

مُحَكَّمات تشخيص نوبة الهلع المصاحب لرهاب الأماكن المُتَسَعَّة	١	٢	٣	٤
أ - توفر كل من (١) و (٢) مما يلى:				
١- تكرار حدوث النوبات بدون توقع				
٢- تحدث نوبتان على الأقل خلال شهر واحد أو أكثر قليلاً تتسم بالآتي:				
ـ شعور بالهم خوفاً من حدوث نوبات جديدة. ـ فلق مرتفع خوفاً من عواقب النوبة (مثل الإصابة بنوبة قلبية أو الإصابة بالجنون)				
ـ يؤثر على سلوكيات الفرد التي تتعلق بالنوبات (كان يغير جدول أعماله أو يتتجنب موافق أو أماكن معينة لكي يقلل من حدوث النوبة).				
ب - وجود خوف من الأماكن الواسعة	.			
ج- نوبات الهلع ليست ناتجة عن أدوية يتناولها الفرد أو أمراض بدنية أخرى مصاب بها				
د- أن تكون تؤثر النوبات على تكيف الفرد و تعوق أنشطة حياته اليومية				

الرهاّب

خوف غير منطقي (وزائد) ومبالغ فيه من موضوع أو موقف (بيئي) معين، رغم أن ذلك لا يمثل تمديداً أو ضرراً للأشخاص العاديين وتنتاب الفرد أعراض مثل الدوخة وزيادة في سرعة نبضات القلب، والتصلب الحركي.

الرهاّب المحدد (البسيط) :

؟	٢	٢	١	محكّات تشخيص اضطراب الرهاّب المحدد (البسيط)
				أ - وجود خوف ملحوظ ودائم (غير مناسب) من موضوع أو موقف معين (مثل: الخوف من الطائرات والمرتفعات أو الحيوانات أو الحقن أو الدم).
				ب - أن يرتبط ذلك الخوف بنوبة هلم مرتبطة بالموقف. ج - يدرك الشخص أن خوفه غير مناسب لهذه المواقف. د - تجنب المواقف المثيرة للهلع أو تحملها مع المعاناة الشديدة منها.
				هـ - أن تؤثر على تكيف الفرد، وتعوق أنشطة حياته اليومية المهنية أو الاجتماعية أو وجود ضيق مستمر
				أنواع الرهاّب :
				١ - رهاّب الحيوانات (أو الحشرات) ويبداً في مرحلة الطفولة.
				٢ - رهاّب البيئة الطبيعية (العواصف والماء) ويبداً في مرحلة الطفولة.
		.		٣ - رهاّب الدم (رؤيه الدم أو إصابة شخص) والحقن والعمليات الجراحية وهو شائع الحدوث.
				٤ - أنماط الرهاّب الموقتية مثل، رهاّب المواصلات العامة أو الأنفاق أو الكباري، أو المصاعد أو الطائرات أو السيارات والأماكن المغلقة. ويحدث غالباً في الطفولة وكذلك في منتصف العشرينات.

				٥- أنماط أخرى من الرهاب مثل، تجنب المواقف التي قد تؤدي إلى الاختناق أو القيء أو العدوى، أو السقوط على الأرض إذا كان الفرد بعيداً من الحائط و يخاف الأطفال من الأصوات العالية أو ملابس الشخصيات التاريخية أو بعض الدمى.
--	--	--	--	--

الرهاب الاجتماعي :

٤	٣	٢	١	مكبات تشخيص اضطراب الرهاب الاجتماعي
				١- خوف دائم من المواقف الاجتماعية (مثل التحدث أمام جمهور نتيجة لتوقع الخزي والفشل أمامهم)
				ب- التعرض للمواقف الاجتماعية يثير القلق بصورة مرتفعة وربما الهلع.
				ج- يدرك الشخص أن هذا الخوف غير مناسب للموقف.
				د- يتجنب الشخص المواقف الاجتماعية وإذا حدثت فهو يتحملها بمعاناة شديدة.
				هـ- أن تؤثر النوبات على تكيف الفرد وتعوق أنشطة حياته اليومية.
				و- يتشرط ألا يكون الشخص مصاباً باضطراب الشخصية التجنبية.

اضطرابات الجسمية نفسية المنشأ :

٤	٣	٢	١	محكّات تشخيص اضطرابات الجسمية نفسية المنشأ
				١ - وجود تاريخ لشكوى جسمية عديدة، وتتبين في الآتي:
				١- تبدأ قبل سن الثلاثين.
				٢- تستمر لسنوات عديدة.
				٣- يطلب الشخص العلاج ويتردد على الأطباء لمرات عديدة.
				٤- وجود خلل في الأداء الاجتماعي والمهني.
				ب- يعاني الشخص من بعض الأعراض المرضية التالية خلل تاريخه المرضي:
				١- وجود أعراض مرضية (أربعة على الأقل) مما يلى:
				- الرأس.
				- البطن.
				- الظهر.
				- المفاصل.
				- الأطراف.
				- الصدر.
				- المستقيم.
				- إثناء الطمث.
				- إثناء الاتصال الجنسي.
				- إثناء التبول.
				٢- هذا بالإضافة إلى أعراض الألم مثل:
				- العثيان.
				- الانفاس.
				- القيء (في غير حالة الحمل).
				- الإسهال.
				- النفور من أطعمة عديدة.
				٣- عرض جنسي واحد
				المعاناة والشكوى من عرض واحد (على الأقل مما يلى):
				- عدم الاهتمام بالجنس.

				<ul style="list-style-type: none"> - عدم انتظام الطمث. - نزيف مفرط في الطمث. - القيء (طوال فترة الحمل).
				<p>٤- عرض عصبي كاذب (غير مقصور على الألم)</p> <p>- أعراض تحولية (مؤقتة) مثل :</p> <ul style="list-style-type: none"> - اختلال التوافق الحركي. - خلل في التوازن. - الشلل. - الضعف العضلي الموضعي. - صعوبة البلع. - احتباس الصوت. - احتباس البول. - فقدان حاسة اللمس. - فقدان الإحساس بالألم. - ازدواج الرؤية. - العمى. - الصمم <p>- نوبات تشنج (تشبه الصرع)</p> <p>أو أعراض إنسقافية :</p> <ul style="list-style-type: none"> - فقدان الذاكرة - فقدان الوعي (بدون إغماء)
				<p>ج- وجود إما (١) وإما (٢) مما يلى:</p> <p>١- بعد الفحص الطبي، نجد أن الأعراض المذكورة في (ب) لا تصف مرض جسمى معروف ومحدد (مع استبعاد آثار العاققير والمخدرات)</p> <p>٢- أن يكون لدى الشخص مرض جسمى معين ولكن هناك مبالغة مفرطة في المعاناة من المرض، يتعارض مع ما هو متعارف عليه بالنسبة للحالات المماثلة لهذا المرض (الجسمى).</p> <p>د- يجب استبعاد حالات التمارض أو التصنع</p>

الاضطراب الجسمى غير المميز :

٤	٣	٢	١	مذكوات تشخيص الاضطراب الجسمى غير المميز :
				أ - وجود عرض أو أكثر من الشكاوى الجسمية مثل :
				<ul style="list-style-type: none"> - التعب - فقدان الشخصية - شكاوى معدية - شكاوى معوية - شكاوى بولية
				ب - وجود إما (١) أو (٢) المتعلقة بأعراض الألم والأعراض المعدية المعوية التالية :
				<ul style="list-style-type: none"> ١- بعد الفحص الطبى الدقيق يظهر أن الأعراض لا تصف مرضًا جسديًا واضحًا ومحددًا. ٢- يجب استبعاد الحالات المؤقتة للعقاقير أو المخدرات.
				<ul style="list-style-type: none"> - إذا ثبت أن هناك مرضًا محدداً في إن الأعراض والألم .. يكون فيها مبالغة لا تناسب مع ما يعانيه المرضى من هذا المرض.
				<ul style="list-style-type: none"> ج- يحدث خلل في الأداء الاجتماعي والمهنى. د- مدة الاضطراب لا تقل عن ٦ شهور.
				هـ- الأعراض ليست مصطنعة أو إدعاء بالتمارض.

الاضطراب التحولي:

٤	٣	٢	١	محكّات تشخيص الاضطراب التحولي
				أ - وجود ألم أو عجز (واحد أو أكثر) يرتبط بوظيفة حركية إرادية أو حسية، ويوحي ذلك بوجود مرض عصبي أو مرض جسمى
				ب - هناك عوامل نفسية تقتربن بالمرض أو العجز تظهر وجود علاقة سببية بين المرض والضغوط النفسية. ج - العرض ليس متعمداً أو إدعاء بالمرض.
				د - وجود اختلال في الأداء الاجتماعي أو المهني طقماً لنوع العرض (أو العجز). ه - لا يتطابق مع أي مرض نفسي أو جسمى آخر.
				<ul style="list-style-type: none"> • عجز حركي مثل: <ul style="list-style-type: none"> - اختلال التوافق الحركي. - اختلال التوازن. - الشلل أو الضعف الموضعي. - صعوبة البلع. - احتباس الصوت. - احتباس البول. • عجز حسي مثل: <ul style="list-style-type: none"> - فقد اللمس. - فقد الإحساس بالألم. - الرؤية المزدوجة. - فقد الإبصار. - الصمم. - الهللوس. • تشنجات (مثل الصرع): <ul style="list-style-type: none"> - نوبات تشنج (مثل الصرع). - تشنجات حركية (إرادية). - تداخل عدة أعراض (لا تصف مرضًا معيناً).

DSM-4 & DSM-5**اضطراب الألم :**

؟	٣	٢	١	محكات تشخيص اضطراب الألم:
				أ - ألم شديد بمكان محدد (أو أكثر) يستدعي طلب العلاج.
				ب - يؤثر الاضطراب على الأداء الاجتماعي والمهني تأثيرا سلبيا
				ج - هناك علاقة بين الضغوط النفسية والاجتماعية وشدة المرض (أو استمراره).
				د - الألم ليس مصطنعا أو إدعاء بالمرض.

اضطراب الألم المترن بأسباب نفسية :

؟	٣	٢	١	محكات تشخيص اضطراب الألم المترن بأسباب نفسية
				أ - وجودأسباب نفسية واضحة تسبب الألم وشديته واستمرارة خاصة في بداياته المبكرة.
				ب - (لا يشمل ذلك وجود مرض جسمى حقيقي)
				ج - يصبح حادا إذا استمر (أقل من ٦ شهور) ومزمنا إذا استمر (أكثر من ٦ شهور)

اضطراب الألم المترن بأسباب نفسية ومرض جسمى محدد في الوقت نفسه:

؟	٣	٢	١	محكات تشخيص اضطراب الألم المترن بأسباب نفسية ومرض جسمى محدد في الوقت نفسه:
				- وجودأسباب نفسية وعضوية لبدء الألم وشديته واستمراره. يصنف إلى: حاد: أقل من ٦ شهور. مزمن: أكثر من ٦ شهور.

نص المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الاضطرابات النفسية DSM-4

توبه المرض :

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص اضطراب التوهم المرضي
				أ - الانشغال بأن هناك مريضا خطيرا بسبب التقسيم الخطئ للأعراض الجسمية.
				ب- رغم انكار الأطباء بوجود مرض خطير، فإن الشخص يظل منشغلًا بالمرض ويعتقد أن الأطباء جاهلون لا يعرفون تشخيص المرض الخطير الذي يعاني منه.
				ج- الشخص غير مدرك أن ادعاءاته زائدة عن الحد (وغير معقولة).
				د- لا يمثل ذلك اضطرابا ضلاليًا (الاضطراب الضلالي).
				هـ- يؤثر على حياة الفرد الاجتماعية والمهنية تأثيرا سلبيا.
				و- يجب مرور ستة شهور على ظهور الأعراض على الأقل لتحديد الاضطراب.

اضطراب التشوه الوهمي للجسم :

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص اضطراب التشوه الوهمي للجسم.
				أ - الانشغال المفرط بوجود خلل متخيّل في الشكل، وأحيانا تكون هناك غرابة في جزء من الجسم (بطريقة ضعيفة) ولكن الشخص يكون مفرطا في انشغاله.
				ب- يتسبّب في حدوث خلل في الأداء الاجتماعي والمهني.
				جـ- أحيانا ما يكون هناك غرابة واضحة (للشخص وللآخرين) في جزء من الجسم وعندها فمن الطبيعي أن يكون ذلك موضع انشغال من الشخص.

الاضطراب الجسمى الشكل غير المحدد:

والذى لا يستوفى الفئات السابقة. ومثال ذلك:

- الحمل الكاذب والذى يرتبط بعلامات موضوعية مثل كبر البطن وانقطاع الطمث او حدوث الطمث بشكل قليل والإحساس بحركة الجنين والغثيان وحدوث الآم الوضع في الوقت المتوقع للولادة
- توهם مرضى على ألا يكون فاصاما وأن يستمر لمدة 6 شهور على الأقل.
- اضطراب لشكوى جسمية ليس لها تفسير مثل التعب السريع أو ضعف الجسم (أقل من 6 شهور).

اضطرابات الشخصية

اضطراب الشخصية هو سلوكيات ثابتة تقسم بالانحراف عن السلوك السوي، حيث يدرك الفرد ذاته والآخرين والأحداث بصورة غير مماثلة لأفراد الثقافة التي يعيش فيها الفرد. وتقسام سلوكياته بالانفعال الشديد وعدم تناسبها مع المواقف والأحداث والأشخاص الذين يتعاملون معه. كما يتسم بعلاقات سيئة ومتواترة دائمة مع الآخرين، كما أن الفرد لا يستطيع إيقاف اندفاعاته وتهوراته وإهانته أو عدوانه تجاه نفسه وتجاه الآخرين.

المعايير العامة لتشخيص اضطرابات الشخصية:

أولاً: نمط دائم من الخبرة الداخلية والسلوك يحيد (يشد) بدرجة كبيرة عن المعايير الاجتماعية والسلوك في ثقافة الفرد. ويتمثل هذا النمط في مجالين أو أكثر مما يأتي:

- ١- المعرفة: وتعلق بطرق إدراك وفهم الذات وفهم الآخرين والأحداث.
- ٢- الوجdan: يسود الوجدان إنفعالات شديدة والتارجح وعدم التناسب مع الموقف.
- ٣- العلاقات بين الأفراد (علاقات سيئة ومضطربة مع الآخرين كالأسرة أو الأصدقاء أو الزملاء).
- ٤- عدم التحكم في الاندفاعات

ثانياً: نمط دائم من التصلب يشمل جميع المواقف الشخصية والاجتماعية يؤدي إلى الشعور بالكدر أو الكرب (الشعور بالضغط النفسي) واحتلال في الأداء الاجتماعي أو المهني

ثالثاً: يتسم هذا النمط بالإزمان (عدة سنوات) والثبات. ويمكن تعقب بداية الاضطراب من الماضي بداية من مرحلة المراهقة.

رابعاً: يتم التشخيص بداية من عمر 18 سنة.

وتنقسم اضطرابات الشخصية إلى ثلاثة فئات: الفئة (أ) الشخصية البارنوية (الهذانية) واضطراب الشخصية الفصامية، واضطراب الشخصية فصامية النمط. والفئة (ب) وتتضمن اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، واضطراب الشخصية المستيرية، اضطراب الشخصية الترجسية، واضطراب الشخصية التجنبية. والفئة (ج) وتتضمن اضطراب الشخصية الوسواسية التجنبية واضطراب الشخصية الاعتمادية واضطراب الشخصية الوهنية، واضطراب الشخصية غير المحددة النوعية.

الفئة (١) من اضطرابات الشخصية**١- اضطراب الشخصية البارانوية (الهذاينية)**

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص اضطراب الشخصية البارانوية:
				أ - شك شامل في الآخرين وانعدام الثقة فيهم، وتفسير دوافعهم تفسيراً سيناً. ويبدأ منذ مرحلة الرشد المبكرة، يتضح هذا الشك في أربعة أو أكثر مما يلى:
				١- الشك أن الآخرين يستغلونه أو يحاولون إيقاع الأذى به وخداعه.
				٢- يشك في إخلاص وولاء الآخرين (الأصدقاء، الزملاء، الأقارب) بحيث يصبحوا موضع تساؤل.
				٣- تجنب الحديث عن نفسه لاعتقاده أن هذه المعلومات قد يستخدمها الآخرون ضده.
				٤- تفسير الملاحظات البريئة بأنها تتضمن معانٍ الإقلال من الشأن أو التهديد.
				٥- لا يغفر أي إهانة أو إساءة.
				٦- يتصور أن الآخرين يعتدون على شخصه وسمعته ويسارع بأفعال غاضبة.
				٧- تكرار الشك بدون مبرر في إخلاص زوجته، (أو في إخلاص زوجها).

٢- اضطراب الشخصية الفصامية

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص اضطراب الشخصية الفصامية (الانعزالي)
				أ - نمط متواصل من العزلة بعيداً عن الناس مع عدم التجاوب الانفعالي في موافق العلاقات بين الأفراد. ويظهر في سياقات متعددة. ويتحدد بوجود أربعة أو أكثر من الأعراض الآتية:
				١- العزوف عن التعامل الاجتماعي وعدم الاستمتاع بالعلاقات الشخصية الحميمة، بما في ذلك أن يكون جزءاً من الأسرة

				- التفضيل الدائم للأنشطة الفردية التي تتطلب العزلة
				- ضعف الاهتمامات الجنسية
				- الاكتفاء بنمط قليل من المتعة إذا قام بأى نشطة اجتماعية أو مهنية أو أسرية)
				- يفتقر إلى الصدقة الحميمة (فيما عدا الأقرباء من الدرجة الأولى).
				- غير مكترث بالثناء أو النقد من الآخرين.
				- يتسم بالبرود الانفعالي وتنسج العواطف.

٣- اضطراب الشخصية فصامية النمط

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص اضطراب الشخصية فصامية النمط
				أ - نمط شامل من العجز الاجتماعي (العلاقات مع الآخرين) وضعف في القدرة على إقامة علاقات حميمة مع الآخرين مع تحريفات (انحرافات) إدراكيّة ومعرفية مع غرابة في السلوك. ويتحدد هذا النمط بوجود خمسة أو أكثر من الأعراض الآتية:
				١- يعتقد أنه محور اهتمام الآخرين، وأنهم يتحدثون أو يتغامزون أو أن أجهزه الإعلام تتحدث عنه
				٢- الاعتقاد في الخرافات والتخارط والحسنة السادسة والحسن
				٣- يعتقد أن لديه خبرات إدراكيّة غير عاديّة تشمل أوهاما بدنية (خداع حسي بدني) مثلًا لديه قدرة جنسية غير عاديّة أو معدة تهيّم الظلّل (قدرات خارقة).
				٤- غرابة في تقديره وحديثه (تفاصيل غير مطلوبة، تعتقد في الكلام، تدخل في الموضوعات).
				٥- الشك أو الأفكار الإصطهادية.
				٦- عدم ملائمة العواطف للمواقف، وفتور(ضعف) هذه العواطف.
				٧- غرابة أو شذوذ في السلوك والمظهر.
				٨- الافقار للعلاقات الحميمة (فيما عدا أسرته الأولى).

الفئة (ب) من اضطرابات الشخصية

٤- اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع

٤	٣	٢	١	محكّات تشخيص اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع
				أ - هذه الشخصية تتسم بالفشل في بناء علاقات اجتماعية صحيحة، مع الاندفاعة وغياب الشعور بالذنب مع العجز التام عن الاستفادة من الخبرة السابقة ويتسم الشخص بميل شديد للعدوان والاستهانة بحقوق الآخرين وإثبات سلوك مضاد للقانون والأعراف في المجتمع. ويجب أن يتوفّر لدى الفرد ثلاثة أو أكثر من الأعراض التالية:
				١- العجز عن الامتثال للمعايير الاجتماعية المتعلقة بالسلوكيات الجائزة قانونياً (والإتيان بالسلوك الإجرامي مما يعرضه للوقوع تحت طائلة القانون)
				٢- الميل إلى الخداع والغش. ويظهر ذلك في تكرار الكذب والاحتيال على الآخرين والظهور بمظهر الرجل الطيب والمثالى بهدف تضليل الآخرين.
				٣- الاندفاعة والعجز عن التخطيط للمستقبل.
				٤- العدوانية التي تتحدد في تكرار الشجار أو الاعتداء البدني على الآخرين.
				٥- التهور والاستهانة بسلامة نفسه أو الآخرين.
				٦- التحرر من المسؤولية كما يتمثل في فشله المتكرر في الاستمرار في عمل واحد.
				٧- العجز عن الوفاء بالتزاماته المالية.
				٨- غياب الشعور بالذنب، كما يظهر ذلك في عدم الاقتراف بمشاعر الآخرين وتبريير إيزانهم.
				ب- بشرط ألا يقل عمر الشخص عن ١٨ سنة.
				ج- ويشترط وجود اضطرابات سلوكية لها تاريخ مرضي قبل سن الخامسة عشر.

٥- اضطراب الشخصية البنية :

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص اضطراب الشخصية الحدية:
				١- نمط عام من القلب وعدم الثبات في العلاقات مع الآخرين، وكذلك فيما يتعلق بصورة الذات والعواطف مع الاندفاع الشديد (في السلوك والوجدان) ويبداً في مرحلة الرشد المبكر، ويظهر في خمسة بنود أو أكثر مما يلى:
				١- جهود متلاحقة ومستمرة لتجنب هجر الآخرين له سواء أكان حقيقياً أو متخيلاً.
				٢- التقلب ما بين التطرف في التفاس والتطرف في التحقيق (متلماً يحدث في الحب أو الصداقة بين شخصين).
				٣- تذبذب كبير في صورة الذات ما بين التقدير إلى الانتقاص والتقليل من الشأن أو السلوك المشوه للذات.
				٤- الاندفاعية في مجالين على الأقل مثل التبذير أو الجنس أو تعاطي المخدرات أو القيادة المتهورة أو الأكل بشراهة، وجميعهم قد يحدثوا إضراراً بالفرد.
				٥- تكرار السلوك الانتحاري أو التهديد بالانتحار.
				٦- التقلب الوجданى مثل نوبات شديدة من تعكر المزاج أو الاستئناف أو القلق الذي يستمر عاده لبعض ساعات.
				٧- مشاعر مزمنة بأنه فارغ داخلياً.
				٨- غضب شديد لا مبرر له وصعوبة في السيطرة على الغضب ويشمل ذلك تكرار الانفعال والغضب أو ربما الشجار الجسدي.
				٩- تفكير بaranويا (هذاي) مؤقت يظهر عند حدوث ضغوط.
				١٠- أعراض انشقاقية شديدة مثل نسيان تفاصيل الأحداث فيما يتعلق بالمواقف الضاغطة.

٦- اضطراب الشخصية الهيستيرية :

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص اضطراب الشخصية الهيستيرية:
				١- حب الظهور والانفعال المفرط، وتتبين في خمسة (أو أكثر) مما يأتي:
				١- الشعور بالضيق حين لا يكون محظوظاً أنظار الآخرين.
				٢- سلوك يتصف بالإثارة والانفعال أو إغراء جنسي (غير ملائم).
				٣- تحول سريع من الحب إلى الكراهة.
				٤- عدم اهتمام في التعبير عن العواطف.
				٥- يبتسم بالظاهر والملابس بصورة مفرطة.
				٦- يحاول التأثير في الآخرين لإقناعهم بوجهة نظره (التي قد لا يجنبها الصواب).
				٧- استعراض مع مبالغة في الانفعال.
				٨- يسهل التأثير عليه من الآخرين.
				٩- يعتقد أن علاقاته قوية بالآخرين (مع أن ذلك غير واقعي).

الفئة (ج) من اضطرابات الشخصية**٧- اضطرابات الشخصية التجنبية**

١	٢	٣	٤	محكـات تشخيص اضطراب الشخصية التجنبـية:
				يتسـم اصحابـها بـعدم الاعتنـاء بالعـلاقات الاجـتماعـية، ويشـعر بـقلـة الحـيلة وـيـحكم سـلـبيـاً عـلـى نـفـسـه وـالـحسـاسـيـة الـاجـتماعـية، وـيـبدأ في مرـحـلة الرـشـد المـبـكر، ويـتـبـين في أرـبـعة (أو أـكـثـر) مـا يـأتـي:
				١- يـتجـنـب الـاحـتكـاك بـالـآخـرـين (حتـى في العـمل) خـشـية مـن النـقـد أو اللـوم زـ.
				٢- لا يـندـمـج بـسـهـولة مـعـ الآخـرـين إـلا إـذا وـقـعـ آنـهـمـ يـهـتمـون بـهـ.
				٣- يـتجـنـبـ العـلـاقـاتـ الـحـمـيمـةـ (مـثـلـ الحـبـ) لـخـوفـهـ مـنـ الخـزـيـ وـالـسـخـرـيـةـ.
				٤- يـخـشـيـ النـقـدـ أوـ الرـفـضـ مـنـ الآخـرـينـ.
				٥- يـشعـرـ بـقلـةـ الـحـيلـةـ وـالـضـعـفـ فيـ المـوـافـقـ الـاجـتماعـيـةـ الـجـديـدةـ.
				٦- شـعـورـ بـالـنـقـصـ وـالـدـوـنـيـةـ (وـأـنـهـ غـيرـ جـذـابـ).
				٧- يـخـشـيـ الاـشـتـراكـ فيـ أـيـ أـنـشـطـةـ اـجـتمـاعـيـةـ أوـ مـهـنيـةـ لـاحـتمـالـ الـرجـحـ.

٨- اضطراب الشخصية الاعتمادية

١	٢	٣	٤	محـكـاتـ تشـخـصـ اـضـطـرـابـ الشـخـصـيـةـ الـاعـتمـادـيـةـ
				أـ - يـتـوقـ وـيـنتـظـرـ الرـعـاـيـةـ مـنـ الآخـرـينـ دـائـماـ، وـيـؤـدـيـ ذـلـكـ لـسـلـوكـ خـضـوعـ وـخـوفـ مـنـ انـقـطـاعـ الرـعـاـيـةـ، وـيـبـداـ فيـ مـرـحـلةـ الرـشـدـ المـبـكـرـ، وـيـتـبـينـ فيـ خـمـسـةـ (أـوـ أـكـثـرـ)ـ مـاـ يـأتـيـ:
				١- يـنـتـظـرـ النـصـائحـ عـنـ اـتـخـاذـ قـرـاراتـ يـوـمـيـةـ عـادـيـةـ.
				٢- يـعـتـقـدـ تـحـمـلـ الآخـرـينـ لـسـلـوكـيـاتـهـ وـأـفـعـالـهـ.

				٣- لا يعارض الآخرين (الأسر، أو الرؤساء في العمل) غالبا خوفا من فقدان المساندة والاستحسان.
				٤- نقص في الثقة بالنفس عند الحكم على الأمور.
				٥- ينتظر ويتوقع دائمًا طلب الرعاية والعون من الآخرين حتى لو أدى لأشياء بغية (تقديم تنازلات غير مبررة قد تمس الأخلاق أو القيود المتعارف عليها في ثقافة الفرد).
				٦- يشعر بقلة الحيلة والعجز عندما يكون وحده.
				٧- يسعى لتكوين علاقة أخرى للرعاية عندما تقطع صلاته الحميمة مع من يرعوه.
				٨- عقله مشغول دائمًا باحتمال أن يكون وحيدا بدون رعاية.

٩- اضطراب الشخصية الوسواسية

١	٢	٢	٣	٤	محكّات تشخيص اضطراب الشخصية الوسواسية
					أ - الانشغال المفرط بالنظام والترتيب والسعى نحو الكمال وذلك على حساب المرونة، ويبداً مع مرحلة الرشد المبكر. ويتبيّن في أربعة (أو أكثر) مما يأتي:
					١- يشغل بالتفاصيل والتنظيم، بحيث ينحرف عن أهدافه الرئيسية (لا ينجذب المهمة بسبب انشغاله بالتفاصيل).
					٢- الرغبة في الكمال (وهذا مستحبيل للبشر).
					٣- انشغال مفرط ونام للعمل والإنتاج على حساب حياته الاجتماعية.
					٤- يقطض الضمير بدرجة مفرطة.
					٥- متصلب في الموضوعات الأخلاقية والقيم.
					٦- يُؤدي عمله بنفسه (لأنه لا يثق بآداء الآخرين).
					٧- بخيال مع نفسه ومع الآخرين.
					٨- متصلب وعنيف.

اضطراب الشخصية غير المحدد :

هذه فئة لا تستوفى معايير اضطرابات الشخصية السابقة، فقد يوجد (مثلاً أكثر) من اضطراب شخصية لفرد، أو وجود عرض واحد للرغبة في الكمال مثلاً) يحيل حياة الفرد إلى جحيم، وهذه الأعراض تجعل الفرد غير منكيف وتوثر على حياته المهنية والاجتماعية.

وتتضمن هذه الفئة اضطراب الشخصية الاكتابية واضطراب الشخصية العدوانية - السلبية.

المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الأمراض النفسية للراشدين:

(DSM-IV)

صحيفة التسجيل

درجة الفرد	معيار التشخيص	الاضطراب	درجة الفرد	معيار التشخيص	الاضطراب
	توفر (أ، ب)	محكات تشخيص الديستيميا		توفر (أ، ب، ت)	الفصام
	توفر (أ، ب)	نوبات الهوس		توفر (أ، ب، ج، د، ه)	فصام العرض الواحد
4	نوبة الهوس الخفيف			توفر (أ) + درجات	الفصام المتناثر
2	نوبة هوس وحيدة			توفر (أ) + درجات	النوع الكاتاتوني
2	اضطراب شائي القطب I			6	الفصام المبكر
2	اضطراب شائي II			توفر (أ، ب)	الفصام غير المتميز
2	اضطراب شائي III			توفر (أ، ب)	الفصام المتبقى
2	اضطراب شائي IV			توفر (1 ، 2)	الاضطراب الفصامي المؤقت
تحدد	اضطراب شائي القطب غير محدد			2	اضطراب الفصام الوجوداني
6	اضطراب مزاج ناتج عن أمراض جسمية			2 فأكثـر	الاضطراب الذهانـي الوجيز
	توفر (أ، ب، ج)	اضطراب المزاج الناتج عن تعاطي المواد المخدرة		4	الاضطراب الذهانـي المشارك

نص المقابلة الإكلينيكية لتشخيص الاضطرابات النفسية DSM-4

درجة الفرد	معيار التشخيص	الاضطراب	درجة الفرد	معيار التشخيص	الاضطراب
	يحدد	الهوس النوعي		4	اضطراب ذهاني ناتج عن مرض جسمى
	توفر (أ، ب، ج)	القلق العام		6	اضطراب ذهاني ناتج عن تعاطي المخدرات
2		قلق العرض الواحد		11	ذهان غير محدد
	توفر (أ، ب)	الوسواس الظهري		6	البارانويا
8		الأفعال الظاهرة		8	الاضطراب الصدلي (هذاء):
	توفر (أ، ب، ج، د)	اضطراب ما بعد الصدمة		11 فاكثر	الاكتئاب الأساسي
11		توهم المرض		توفر (أ، ب، ج)	اضطراب الضغط الحاد
6		اضطراب التشوّه الوهمي للجسم	=	8 فاكثر	اضطراب الهلع
	يحدد	الاضطراب الجسمى الشكل غير محدد		8	رهاب الأماكن الممتدة
8		اضطراب الشخصية البارانوية		توفر (أ، ب، ج، د)	الهلع غير المصحوب برهاب الأماكن الممتدة
8		اضطراب الشخصية الفصامية		توفر (أ، ب، ج، د)	الهلع المصحوب برهاب الأماكن الممتدة
11		اضطراب الشخصية فصامية النمط		11 يحدد:	الرهاب المحدد (البسيط)

DSM-4 & DSM-5

الدرجة الفرد	معيار التشخص	الاضطراب	الدرجة الفرد	معيار التشخص	الاضطراب
	6 درجات مع توفر (ب، ج)	اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع	12		الرهاب الاجتماعي
	11	اضطراب الشخصية الحية	توفر (أ، ب، ج، د)		الاضطرابات الجسمية نفسية المنشا
	11	اضطراب الشخصية الهمستيرية	توفر (أ، ب، ج، د، ه)		لاضطراب الجسدي غير المميز
	8	اضطرابات الشخصية التجنبية	يحدد:		لاضطراب التحولي
	11	اضطراب الشخصية الاعتمادية		8	اضطراب اللام
	8	اضطراب الشخصية الوسواسية		6	لألم المقترب بأسباب نفسية
				2	لألم المقترب بأسباب نفسية
					حاد-مزمن ومرض جسدي

الفصل الثالث
تشخيص الاضطرابات النفسية لدى
الراشدين: نسخة عربية مستندة إلى الدليل
التشخيصي والإحصائي الخامس DSM-5

الفصل الثالث

تشخيص الاضطرابات النفسية

لدى الراسدين: نسخة عربية مستندة إلى

الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس DSM-5

اضطراب يفقد فيه الفرد الاتصال بالواقع (اعتقاداته وأفكاره لا تتفق مع الواقع) حيث يعاني من هلاوس وضلالات (توهمات) وتبدل في المشاعر واضطرابات في التفكير وتدور في القدرات العقلية.

ملاحظة هامة

يتم تصحيح الاختيارات على النحو التالي :

- ٢ - لا يوجد بدرجة بسيطة
- ٣ - لا يوجد بدرجة كبيرة

١ - لا يوجد

٤ - لا توجد معلومات لهذا البند

معايير تشخيص الفصام :

تشير إلى توافر المعايير (أ) و (ب) و (ج)				
٤	٣	٢	١	
				أ - الأعراض المميزة (أثنان) أو أكثر من قذائف مختلفة مثلاً ضلالات (توبهات) مع هلاوس أو هلاوس مع تبدل وجداً، أو هلاوس مع تفكك في التفكير.
				أعراض الفصام
				١ - هلاوس
				٢ - توبهات
				٣ - تفكك الكلام
				٤ - تفكك السلوك
				٥ - أعراض سلبية (تسطح الانفعال)
				ب - الأعراض تستمر لمدة ٦ شهور على الأقل

جـ- هذه الأعراض تؤثر على حياة الفرد الشخصية والاجتماعية والمهنية

يتم جمع التقدير (٢) فقط في كل الأعمدة وتشخيص المرض يكون بوجود عرضين على الأقل بقدر (٢) أي (٤) درجات وإذا زاد عن ذلك فإنه يعني شدة المرض.

لكي يشخص المرض لابد من انتطاق الأعراض بدرجة شديدة (٢) على الأقل ولا تحسب الدرجات الأخرى (الدرجة ١ لا تعد ولا تحسب).

هناك ٣ مجموعات للفصام تتضمن الأولى أعراض الفصام التقليدية وتتضمن المجموعة الثانية أعراض البرانويا وتتضمن الثالثة الأعراض الفصامية المفردة

المجموعة الأولى

معايير تشخيص أنواع الفصام

النوع الكتاتوني:

٤	٣	٢	١	النوع الكتاتوني:
				١- يتوفّر ثلاثة أعراض مما يلي:
				١- غيبوبة أو خدر (لا علاقة لها بالبيئة المحيطة).
				٢- النشاط الحركي المفرط الذي يتسم بعدم وجود هدف.
				٣- السلبية الشديدة (مقاومة كل التعليمات).
				٤- حركات متكررة (غريبة).
				٥- الخرص (بلا كلام أو كلام قليل للغاية).
				٦- تقليد حديث الآخرين
				٧- تقليد حركات الآخرين
				٨- التهيج بدون سبب
				٩- وضع جسمى غير مريح ويتعارض مع الجاذبية الأرضية
				١٠- نكشير الوجه
				١١- حركات نمطية متكررة وليس لها هدف
				ب- إستبعاد الحالات الإكلينيكية للأمراض الجسمية أو العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية.

اضطراب فصامي الشكل : Schizophreniform Disorder

٤	٣	٢	١	اضطراب فصامي الشكل :
				أ- اثنان أو أكثر مما يلى خلال شهر (أو أقل إذا تمت المعالجة) يجب أن يتواجد (١) أو (٢) أو (٣)
				١- توهمات (ضلالات) ٢- هلاوس
				٣- حديث مفكاك (خروج عن السياق أو حديث غير متماسك)
				٤- تفكك سلوكي ٥- أعراض تخشيبة.
				٦- أعراض سلبية (عدم مناسبة وتناقض التعبيرات الانفعالية)
				ب- ما بين شهر إلى أقل من ٦ شهور

٤	٣	٢	١	اضطراب الفصام الوجданى :
				١- وجود فترة متصلة من الاكتتاب أو الهوس أو نوبة اكتتاب - هوس مختلطة. (طبقاً لمحكمات الاكتتاب الأساسي أو الهوس) بشرط وجود الأعراض الفصامية في (١)، وتستمر الأعراض الفصامية لمدة أسبوعين على الأقل ولا يصاحبها في هذه الأثناء - أعراض وجданية.
				٢- وجود توهمات (ضلالات) أو هلاوس لمدة أسبوعين أو أكثر في غياب نوبات الاكتتاب أو الهوس طوال مدة المرض.
				٣- أعراض النوبات المزاجية (اكتتاب أو هوس) موجودة في أغلب مدة المرض وفي حالات التحسن من المرض.
				ب- هذا الاضطراب ليس نتيجة مواد مخدرة أو أدوية.
				ج- هناك نوعان الأول مرتبط بإضطراب ذهانى دوري (هوس - اكتتاب أو هوس فقط، والنوع الثاني مرتبط بالاكتتاب الأساسي).

المجموعة الثانية

الفصام البارانويا والتوهمي (الضلالات)

وجود توهمات (ضلالات) العظمة والعقربة واضطهاد الآخرين، ويشك بالآخرين وأنهم يتآمرون ضده، وأن المخابرات أو الشرطة تراقبه، وأن هناك كاميرات تصوره في البيت والشارع، وأن التليفزيون والراديو يوجهون له رسائل لكي يسلك بطريقة معينة.

وجود توهمات مع هلاوس مسيطرة على الفرد مع احتفاظ الفرد بقدراته العقلية دون تدهور

النوع الذهاني (البارانوي):

؟	٣	٢	١	النوع الذهاني (البارانوي): توفر المعايير التالية:
				أ - الانشغال بوحد أو أكثر من التوهمات
				ب - وجود هلاوس سمعية متكررة
				ج - يشترط عدم وجود أعراض أخرى كتفكك الكلام و تفكك السلوك و نسطح العواطف أو عدم الملامعة

تختلف البارانويا عن الإضطراب التوهمي بوجود هلاوس سمعية متكررة

الاضطراب التوهمي (الضلالات)

وجود توهمات (ضلالات) مسيطرة على الفرد مع احتفاظ الفرد بقدراته العقلية دون تدهور

الاضطراب التوهمي (هذايى):

الاضطراب التوهمي (هذايى):				
٤	٣	٢	١	
				ا - وجود توهمات (ممكنة الحدوث) لمدة شهر أو أكثر مثل: أن هناك من يطارده أو يريد أن يسممه أو أن يصاب بعدوى أو تخدعه زوجته أو أنه مريض أو أنه عالم أو مرشح لمنصب هام في الدولة أو العالم.
				ب - بشرط الا تتوافق فيه المعيار (أ) من معايير تشخيص الفصام على الإطلاق، أحياناً توجد هلاوس لمسييه أو شمسيه ترتبط بموضوع الضلال وتدعمه.
				ج - وبشرط ألا يعني عجزاً ملحوظاً وسلوكه ليس شاداً بصورة واضحة.
				د - كما يشترط أنه إذا حدثت نوبات وجاذبية مزاجية (مع الضلالات) فإن مدتها تكون قصيرة.
				س - يستبعد الحالات التي تتناول مخدرات أو عقاقير أو اضطرابات نفسية أخرى قد تتدخل مثل الوسواس القهري أو عدم التناقض الجسمى.
				أنواع التوهمات: ضلالات الحب أو العظمة أو الغيرة أو الاضطهاد أو الجسدية (مثلًا أن معدته غير موجودة) أو المختنطة.

المجموعة الثالثة

تحسب الدرجة المتوسطة فقط :

اضطراب ذهانى غير محدد:

٤	٣	٢	١	اضطراب ذهانى غير محدد:
				نرجة متوسطة
				أ - وجود أعراض فصامية متناقضة ولا تستوفي المعيار (أ) من معايير تشخيص الفصام ؛ أي يوجد عرض واحد وبدرجة متوسطة
				ب - أعراض ذهانية مثل الهلاؤس السمعية وتوهمات مع نوبات مزاجية (اكتتاب أو هلاوس)
				ج - هلاوس سمعية فقط.
				د - ضلالات ليست غريبة تماماً تتدافق مع نوبات مزاجية
				س - ذهان ما بعد الولادة
				و - أعراض ذهانية بدرجات متوسطة وأسباب غير معلومة وتأثير بشدة على توافق الفرد مع البيئة المحيطة به

الاضطراب الذهانى القصير (الموجز):

٤	٣	٢	١	الاضطراب الذهانى القصير (الموجز):
				الاضطراب الذهانى القصير (الموجز):
				أ - وجود واحد أو أكثر مما يلى:
				١ - ضلالات.
				٢ - هلاوس.
				٣ - تفكك الكلام (الانحراف عن المسار أو عدم التماส).
				٤ - سلوك شديد التفكك أو تخشبي (كتاثونى).
				ب - مدة النوبة: لا تزيد عن شهر واحد وقد تكون يوماً واحداً يعود المريض بعدها إلى السواء القائم.
				ج - تستبعد الأعراض المشابهة للإكتتاب الأساسي أو الدورى الذهانى أو الفصام أو العقاقير أو المخدرات

الاضطراب الذهانى المشترك:

				الاضطراب الذهانى المشترك:
٤	٣	٢	١	
				أ - نشوء ضلال ناجم عن التفاعل مع مريض فصامى آخر (قريب أو صديق أو زميل).
				ب - الضلال مشابه في محتواه لما لدى الشخص المريض (الأخر).

اضطراب ذهانى ناتج عن مرض جسمى:

				اضطراب ذهانى ناتج عن مرض جسمى:
٤	٣	٢	١	
				أ - وجود هلاوس أو ضلالات.
				ب - يشترط أن تكون الأعراض ناجمة عن مرض جسمى.

اضطراب ذهانى ناتج عن تعاطي المواد المخدرة:

				اضطراب ذهانى ناتج عن تعاطي المواد المخدرة: توفر المحکمات الثلاثة التالية:
٤	٣	٢	١	
				أ - هلاوس أو ضلالات ولا يكون الشخص مستبصراً بأنها ناتجة عن مادة مخدرة.
				ب - الأعراض ناتجة عن التعاطي أو التوقف عن التعاطي.
				ج - قد تكون أعراض جانبية لدواء معين.

ذهان الهلاوس البصرية أو السمعية :

- أ - توجد هلاوس بصرية بمفردتها أو هلاوس بصرية مع سمعية، مع تماسك في التفكير، ويكون الشخص متاكداً من أن هلاوسه أو ضلالاته حقيقة، مثلاً هناك حالة تقول أنها تشاهد الأحذية وهي تتطاير وتصطدم بالجدار وهناك حالات تذكر هلاوس مرئية وبصرية فقط (مثل أنه مخاوى وله زوجة من الجن) ولا يشتكى من أي أعراض أخرى.
- ب - لا تتطبق عليه أعراض الفصام الأخرى.
- ج - مستمر لستة أشهر على الأقل.
- د - تؤثر على الحياة الاجتماعية والمهنية.
- ه - يحتاج المريض لعلاج شخصي أو معرفي.

الاكتئاب

قد يكون عرض ثانوي لعرض أساسي (أولى) مثل الفحص أو اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ... الخ ويشعر فيه المريض بالحزن والهم وتحير الذات وأضطرابات النوم وقدان الشهية (أو زيادتها) وقد تكون الأعراض السابقة مرض مستقل بذاته وغير مصحوب بأمراض نفسية أخرى.

اضطراب ثنائي القطب :

لتشخيص اضطراب ثنائي القطب النوع الأول، يكون من الضروري توفر المحكّات التالية لنوبة هوسية. النوبة الهوسية هذه قد يسبقها أو يليها نوبة تحت هوسية (خفيفة) أو نوبة اكتئابية أساسية.

اضطراب والأعراض

اضطراب ثنائي القطب

؟	٣	٢	١	اضطراب ثنائي القطب
				لتشخيص اضطراب ثنائي القطب النوع الأول، يكون من الضروري توفر المحكّات التالية لنوبة هوسية. النوبة الهوسية هذه قد يسبقها أو يليها نوبة تحت هوسية (خفيفة) أو نوبة اكتئابية أساسية.

النوبة الهوسية Manic Episode

؟	٣	٢	١	النوبة الهوسية Manic Episode
				ـ فترة محددة يكون فيها المزاج وبصورة شاذة ومتواصلة مرتفعاً ومتضخماً أو مستثاراً، مع توجه غير طبيعي نحو الأهداف في الأنشطة أو الطاقة وحيث يستمر لمدة أسبوع على الأقل ويستمر طوال اليوم (أو أي فترة إذا كان دخول المستشفى ضرورياً).
				ـ إثناء فترة اضطراب المزاج، يستمر ثلاثة أعراض (أو أكثر) من الأعراض التالية (أربعة أعراض إذا كان المزاج مستثاراً فقط) وكانت هذه الأعراض موجودة بشكل واضح مع تغير ملحوظ في السلوكيات المعتادة:

			<p>١- تضخم تقدير الذات أو الشعور بالعظمة.</p> <p>٢- انخفاض الحاجة إلى النوم (مثلا، الشعور بالراحة بعد نوم ٣ ساعات فقط).</p> <p>٣- ثرثرة أكثر من المعتاد أو الضغط للاستمرار في الكلام.</p> <p>٤- تطابير الأفكار أو خبرة شخصية بتسابق الأفكار.</p> <p>٥- التشتت (أي تحويل الانتباه بسهولة إلى مثيرات خارجية غير هامة أو ليست ذات صلة) الملحوظ</p> <p>٦- ازدياد النشاط الهاون (إما اجتماعيا - في العمل أو في المدرسة - أو جنسيا) أو هياج فسيولوجي (أي نشاط غير غرضي وليس موجه بهدف)</p> <p>٧- الانغماس المفرط في الأنشطة الممتعة التي تحمل إمكانية كبيرة لعواقب مؤلمة (مثل، إسراف في عمليات الشراء أو طيش جنسي أو استثمارات حمقاء في مجال الأعمال).</p> <p>جـ- اضطراب المزاج يكون من الشدة بما يكفي لينسبب اختلالاً واضحاً في الأداء المهني أو في الأنشطة الاجتماعية المعتادة أو في العلاقات مع الآخرين. أو أن اضطراب المزاج هذا يتطلب دخول المستشفى لمنع الأذى للذات أو للآخرين، أو وجود أعراض ذهانية.</p> <p>دـ- لا تترجم الأعراض عن تأثيرات فسيولوجية مباشرة لمادة (مثل سوء استخدام عقار، تناول دواء أو معالجة أخرى) أو عن حالة طيبة أخرى</p>
			<p>ملاحظة: التوبات الهوسية التي سببها العلاج بمضادات الاكتئاب (مثل، الأدوية، الجلسات الكهربائية)، واستمرت بمستوى كامل للأعراض لفترة تتعدي التأثير الفسيولوجي لتلك العلاجات وكانت دليلاً كافياً لوجود نوبة هوسية فيهاً مما يمكن تشخيص ذلك كاضطراب ثانوي القطب من النوع الأول.</p> <p>ملاحظة: المحكات من (أ) إلى (د) تشكل نوبة هوس. ويجب أن يكون هناك نوبة هوس واحدة على الأقل في حياة الفرد لكي يتم تشخيصه على أنه اضطراب ثانوي القطب من النوع الأول.</p>

النوبة تحت الهوسية (الخفيفة) Hypomanic Episode

٤	٣	٢	١	Hypomanic Episode
				أ - فترة محددة متميزة يكون فيها المزاج وبشكل مستمر مرتفعاً ومتضخماً، أو مستثاراً، مع زيادة غير طبيعية في النشاط والطاقة وتدوم بشكل مستمر طوال اليوم ولمدة أربعة أيام على الأقل.
				ب - يتواجد أثناء فترة اضطراب المزاج ثلاثة (أو أكثر) من الأعراض التالية (أربعة إذا كان المزاج مستثاراً فقط) بشكل واضح:
				١- تضخم تقدير الذات أو العظمة.
				٢- انخفاض الحاجة إلى النوم (مثلاً، يشعر المريض بالكفاية بعد نوم 3 ساعات فقط).
				٣- أكثر ثرثرة من المعتاد أو الضغط لمتابعة الكلام.
				٤- تطابير الأفكار أو خبرة ذاتية بتسابق الأفكار.
				٥- الشتت (أي تحول الانتباه بسهولة نحو مثيرات خارجية غير هامة أو غير ذات صلة).
				٦- ازدياد النشاط الهدف (إما الاجتماعي، في العمل أو المدرسة، أو الجنسي) أو هياج نفسي حركي.
				٧- انغماس مفرط في الأنشطة الممتعة التي تحمل إمكانية كبيرة لعواقب مؤلمة (مثل الانخراط في شراءات مصرفية غير مقيدة، أو طيش جنسي أو استثمارات حمقاء في مجال الأعمال).
				ج- يصاحب النوبة تبدل واضح في الأداء الوظيفي، لا يكون معهوداً عند الشخص في غياب الأعراض.
				د- يلاحظ اضطراب المزاج والتغير في الأداء الوظيفي من قبل الآخرين.
				هـ- لا تكون النوبة شديدة بما يكفي لتسبب اختلالاً كبيراً في الأداء الاجتماعي أو المهني ولا يحتاج لدخول المستشفى، ولا يكون هناك مظاهر ذهانية.

			- لا تترجم الأعراض عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة لمادة (مثل سوء استخدام عقار، أو تناول دواء أو علاج آخر)
			ملاحظة: النوبات تحت الهوسية (الخفيفة) والتاجمة عن العلاج بمضاد الاكتئاب (مثل الدواء، الجلسات الكهربائية) وتختفي استمرارية اعراضها التأثير الفسيولوجي لتلك العلاجات، تكون كافية لتشخيص الاضطراب ثنائي القطب.

النوبة الاكتئابية الأساسية Major Depressive Episode

٤	٣	٢	١	النوبة الاكتئابية الأساسية Major Depressive Episode
				١ - وجود خمسة أعراض (أو أكثر) من الأعراض التالية لمدة أسبوعين، والتي تمثل تغيراً عن الأداء الوظيفي السابق، على أن يكون واحد من الأعراض التالية موجوداً على الأقل - إما (١) مزاج مكتئب أو (٢) فقد الاهتمام أو السرور.
				ملاحظة: لا تكون هذه الأعراض - بصورة واضحة - ناجمة عن حالة طيبة أخرى
				١- مزاج منخفض معظم اليوم، كل يوم تقريباً، ويعبر عنه بما ذاتياً (مثل الشعور بالحزن أو بالفراغ) أو يلاحظ من قبل الآخرين (مثل أن يبدو حزينًا دامعًا)
				٢- تضليل واضح في الاهتمام أو الاستمتاع بكل الأنشطة أو معظمها وذلك معظم اليوم في كل يوم تقريباً) و(ويستدل على ذلك بالرواية الذاتية أو بمشاهدة الآخرين).
				٣- فقد وزن كبير بدون اتباع حمية (رجيم) غذائية، أو كسب وزن (مثل، التغير في الوزن لأكثر من 5% في الشهر) أو انخفاض الشهية أو زيادتها، كل يوم تقريباً.

			٤- أرق أو فرط نوم كل يوم تقريبا.
			٥- هياج أو بطيء نفسيحركي، كل يوم تقريبا (ملاحظ من قبل الآخرين، وليس مجرد أحاسيس شخصية بالتململ أو البطء).
			٦- تعب أو فقد طاقة (الحيوية) كل يوم تقريبا.
			٧- أحاسيس بانعدام القيمة أو شعور مفرط أو غير مناسب بالذنب (والذي قد يكون توهميا) كل يوم تقريبا، وليس مجرد لوم الذات أو شعور بالذنب لكونه مريضا).
			٨- انخفاض القدرة على التفكير أو التركيز، أو عدم الجسم، كل يوم تقريبا (إما معبر عنه ذاتيا أو ملاحظ من قبل الآخرين).
			٩- أفكار متكررة عن الموت (وليس مجرد خوف من الموت)، أو تفكير انتحاري متكرر بدون خطة محددة، أو محاولة الانتحار أو خطة محددة للانتحار.
			ب- سبب الأعراض ضيقاً مرضياً واضحاً أو اختلالاً في الأداء الاجتماعي أو المهني أو في مجالات هامة أخرى من التوظيف النفسي.
			ج- لا تترجم الأعراض عن تأثيرات فسيولوجية مباشرة ل المادة أو عن حالة طبية أخرى
			ملاحظة: لا تُعمل الأعراض بصورة أفضل من خلال الفقد، أي، بعد فقد عزيز، أو خراب مالي أو كوارث طبيعية، أو أزمة طبية حادة أو العجز الجسمى، إذ تستمر الأعراض لأكثر من شهرين أو تتصف باختلال وظيفي كبير أو اشغال مرضي بانعدام القيمة أو تفكير انتحاري أو أعراض ذهانية أو تأخر نفسيحركي ويجب استخدام الحس الإكلينيكي بمهارة التفريق بينهما مع التاريخ الشخصي للمريض.

الاضطراب ثانى القطب النوع الأول:

٤	٣	٢	١	الاضطراب ثانى القطب النوع الأول:
				أ - توفر محكّات تشخيص نوبة هوسية واحدة على الأقل كما وصفت في الأعلى
				ب - حدوث النوبات الاكتئابية والهوسية لا يمكن إرجاعه إلى اضطراب الفصام الوجданى أو الفصام أو الاضطراب شبيه الفصامي أو الاضطراب الضلالي (التوهّمي) أو أي طيف فصام مميز أو غير مميز أو أي اضطراب ذهانى آخر
				١ - حدد إذا كان النوبة الأحدث هوس أو هوس خفيف أو اكتئاب أو غير مميزة
				٢ - حدد إذا كانت الشدة خفيف أم متوسط أم شديد
				٣ - حدد إذا كانت مع أو بدون أعراض ذهانية، حدد إذا كان في حالة من تحسن جزئي أو تحسن كلي، أو غير مميز
				٤ - حدد ما إذا كانت مصحوبة - بـ قلق وضيق أو ملامح مختلطة أو سرعة الدورات، أو أعراض مالنخوليا (سوداوية)، أو ملامح نمطية، وما إذا كانت الحالة المزاجية تنسق مع الملامح الذهانية أم لا، ما إذا كان هناك أعراض كتاتونية، إذا كان البداية قبل الولادة، إذا كان الاضطراب موسمى النمط

الاضطراب ثانى القطب النوع الثاني

٤	٣	٢	١	الاضطراب ثانى القطب النوع الثاني
				أ - لتشخيص الاضطراب ثانى القطب النوع الثاني، يكون من الضروري توفر المحكّات التالية لنوبة تحت هوسية (خفيفة) حالية أو سابقة و نوبة على الأقل من اكتئاب أساسى حالية أو سابقة

				ب- لم يحدث أبداً للمرضى نوبة هوس
				ج- نوبة الهوس الخفيف أو الاكتئاب لا تفسر في ضوء اضطراب الفحص الوج다اني أو الفحص أو او الاضطراب الشبيه بالفحص أو الاضطراب الضلالي (التوهmi) أو طيف الفحص المميز أو غير المميز أو اي اضطراب ذهاني آخر.
				د- أن تكون أعراض الاكتئاب أو الهوس الخفيف المتكررة تسبب ضيقاً مرضياً واضحاً أو خلاً في التوظيف الاجتماعي والمهني أو مجالات أخرى مهمة من السلوك

حدد إذا ما كان:	٤	٣	٢	١
١- حدد إذا كانت النوبة الأحدث هي هوس خفيف أم اكتئاب				
٢- حدد ما إذا كانت النوبة مصحوبة قلق وضيق أو ملامح مختلطة أو سرعة الدورات، وما إذا كانت الحالة المزاجية تنافق مع الملامح الذهانية أم لا، وما إذا كان هناك أعراض كتائنية، إذا كان البداية قبل الولادة، إذا كان الاضطراب موسمى النمط				
٣- حدد إذا كان في حالة من تحسن جزئي أو تحسن كلي				
٤- حدد إذا كانت شدة الحالة المزاجية خفيفة أم متوسطة أم شديدة.				

الاضطراب الدوري (النوابي)**محكّات التشخيص للأضطراب النوابي:**

محكّات التشخيص للأضطراب النوابي:				
؟	٣	٢	١	
				أ - عامان (منهما عاما على الأقل في مرحلة الطفولة أو المراهقة) حيث تكون هناك فترات طويلة من تواجد أعراض تحت هوسية (خفيفة) إلى تصل إلى حد التشخيص لنوبة تحت هوسية (خفيفة) وفترات طويلة من الأعراض الاكتئابية التي لا تصل إلى حد تشخيص النوبة الاكتئابية الأساسية.
				ب - خلال هذين العامين تتوارد الأعراض على الأقل نصف الوقت ولا يخلو الشخص من الأعراض لفترة تزيد عن شهرين.
				ج - لا تصل الأعراض إلى درجة من الشدة تكفي لتشخيص الهوس أو الهوس الخفيف أو الكتاب الأساسي.
				د - إلا يمكن تفسير الأعراض بارجاعها إلى اضطراب الفصام الوجدني أو الفصام أو الاضطراب الشبيه بالفصام أو الاضطراب الضلالي (التوهمي) أو طيف الفصام المميز أو غير المميز أو أي اضطراب ذهاني آخر.
				ه - لا تترجم الأعراض عن تأثيرات فسيولوجية مباشرة لمادة (مثل سوء استخدام عقار، أو تناول دواء) أو حالة طبية أخرى.
				و - أن تسبب الأعراض ضيقا مرضيا أو خلال واضحا في المجال الاجتماعي أو المهني أو مجالات أخرى مهمة من التوظيف النفسي
				ز - حدد ما إذا كانت مصحوبة باضطراب قلق.

DSM-4 & DSM-5

اضطراب ثانوي القطب والاضطرابات المشابهة الناجمة عن استخدام مواد نفسية أو أدوية

٤	٣	٢	١	اضطراب ثانوي القطب والاضطرابات المشابهة الناجمة عن استخدام مواد نفسية أو أدوية
				<p>أ - اضطراب بارز ومستمر في المزاج يسيطر على الصورة الإكلينيكية ويتسم بمزاج منتشيا (مرتفعا) أو متضخما أو مستثارا، مع أو بدون مزاج اكتئابي أو تضاؤل ملحوظ في المتعة والاهتمام بكل أو معظم الأنشطة.</p>
				<p>ب - ثمة دليل من القصة أو الفحص الجسدي أو نتائج المعمل على وجود كل من (١) و(٢) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ١ - حدثت أعراض المعيار (أ) خلال الانسماح بمادة أو الامتناع عنها أو بعد تناول دواء. ٢ - هذه المادة أو الدواء قادر على إحداث الأعراض التي وصفت بالمعايير (أ)
				<p>ج - لا يمكن تفسير الاضطراب برجاءه إلى اضطراب مزاج غير محدث بمادة. قد تتضمن الدلائل على أن الأعراض يعلوها بصورة أفضل اضطراب مزاج غير محدث بمادة ما يلي:</p>
				<p>ان تسبّب الأعراض بدء استخدام المادة (أو استخدام الدواء)؛ تستمر الأعراض لمدة كبيرة من الوقت (مثلاً حوالي شهر) بعد توقف الامتناع الحاد أو الانسماح الشديد أو أن هذه الأعراض تزيد بشكل جوهري عما يمكن توقعه أخذين بعين الاعتبار نمط أو مقدار المادة المستخدمة أو مدة الاستخدام؛ أو أن هناك دليلاً آخر يقترح وجود اضطراب مزاج غير محدث بمادة مستقلة (مثل تاريخ لتوبات لا ترتبط باستخدام مواد نفسية أو أدوية).</p>
				<p>د - لا يحدث الاضطراب حصراً أثناء سير حالة هذيان.</p>
				<p>ه - تسبّب الأعراض ضيقاً مرضياً واضحاً أو اختلالاً في الأداء الاجتماعي أو المهني أو في مجالات هامة أخرى من الأداء الوظيفي.</p>

الاضطراب ثانى القطب العائد الى حالة طيبة أخرى

الاضطراب ثانى القطب العائد الى حالة طيبة أخرى				
؟	٣	٢	١	
				أ - اضطراب بارز ومستمر في المزاج يسيطر على الصورة الإكلينيكية ويتسم بمزاج منتشياً (مرتفعاً) أو متضخماً أو مستثاراً، مع أو بدون مزاج اكتئابي أو تضاؤل ملحوظ في المتعة والاهتمام بكل أو معظم الأنشطة.
				ب - هناك دليل من تاريخ المرض، والفحص البدني والنماذج المعملية على أن الاضطراب هو نتيجة مرضية لحالة طيبة أخرى.
				ت - لا يحدث الاضطراب حسراً أثناء سير حالة هذيان
				ث - تسبب الأعراض ضيقاً مرضياً واضحاً أو اختلالاً في الأداء الاجتماعي أو المهني أو في مجالات هامة أخرى من الأداء الوظيفي. أو ضرورة دخول المستشفى لمنع إيذاء الذات أو الآخرين أو وجود ملامح ذهانية.

الاضطرابات الاكتئابية

اضطراب اختلال المزاج غير المنتظم

اضطراب اختلال المزاج غير المنتظم				
؟	٣	٢	١	
				أ - انفجارات مزاجية شديدة متكررة تظهر بصورة لفظية أو سلوكية أو كلامها وتكون بشدة كبيرة لا تناسب مع شدة الموقف المثير أو مدته.
				ب - لا تنسق تلك الانفجارات المزاجية مع المرحلة الارتقائية للفرد
				ج - أن تحدث تلك الانفجارات المزاجية ثلاثة مرات أو أكثر خلال الأسبوع
				د - تكون الحالة المزاجية للفرد بين هذه النوبات المزاجية الانفجارية في حالة من الاستثاره أو الغضب طوال اليوم وتتكرر كل يوم، ويلاحظها المحيطين (كالوالدين، المعلمين، الأقران)

				هـ- أن تكون المحاولات السابقة جميعاً موجودة لفترة ١٢ شهر أو أكثر، بحيث لا يكون الفرد من خلال هذه السنة بعد ثلاث شهور متالية خالياً من كل الأعراض المذكورة أعلاه.
				و- أن يكون المحك (أ) والمحك (د) تحدث في موقعين على الأقل من ثلاثة (مثل، البيت والمدرسة والأقران) وان تكون شديدة في واحدة منهم على الأقل.
				ز- ان لا يتم التّشخيص قبل السادسة من العمر أو بعد سن الثامنة عشر.
				ح- ان يكون تاريخ الملاحظة يشير الى ان المحاولات من (أ - هـ) ظهرت لأول مرة قبل سن العاشرة.
				ط- ان يكون هناك فترة محددة تستمر لأكثر من يوم واحد تتواجد خلالها الأعراض الكاملة (باستثناء المدة) لنوبة هوس أو هوس خفيف.
				ي- أن لا تحدث السلوكيات حسرياً أثناء نوبة اكتئابية أساسية والا يمكن تفسيرها باضطراب نفسي آخر (كاضطرابات طيف التوحد، او اضطراب ما بعد الصدمة، اضطراب ضعف الانتباه وفرط الحركة)
				كـ- أن لا يعزى الاضطراب إلى تأثير فسيولوجي لمادة نفسية أو حالة طبية أو عصبية.

اضطراب الاكتئاب الأساسي

٥	٤	٣	٢	١	Major Depressive disorder
					أ - وجود خمسة أعراض (أو أكثر) من الأعراض التالية لمدة أسبوعين، والتي تمثل تغيراً عن الأداء الوظيفي السابق، على أن يكون واحد من الأعراض على الأقل إما (1) مزاج مكتئب أو (2) فقدان الاهتمام أو السرور.
					ملاحظة: لا تضمن الأعراض الناجمة بصورة جلية عن حالة طيبة أخرى

			١- مزاج منخفض معظم اليوم، كل يوم تقريباً، ويُعبر عنه إما ذاتياً (مثل الشعور بالحزن أو بالفراغ) أو يلاحظ من قبل الآخرين (مثل أن يبدو حزيناً داعماً).
			ملاحظة: يمكن أن يكون عند الأطفال أو المراهقين مزاج مستثار.
			٢- تضليل واضح في الاهتمام أو الاستمتاع بكل الأنشطة أو معظمها وذلك معظم اليوم في كل يوم تقريباً) و (ويستدل على ذلك بالرواية الذاتية أو بمحظة الآخرين).
			٣- فقد وزن كبير بدون اتباع حمية غذائية، أو كسب وزن (مثل، التغير في الوزن لأكثر من 5% في الشهر) أو انخفاض الشهية أو زيادتها، كل يوم تقريباً.
			ملاحظة: الإخفاق في كسب الوزن المتوقع، عند الأطفال يؤخذ كمؤشر كافي لهذا العرض
			٤- أرق أو فرط نوم كل يوم تقريباً.
			٥- هياج أو بطيء نفسيركي، كل يوم تقريباً (ملاحظ من قبل الآخرين، وليس مجرد أحاسيس شخصية بالتململ أو البطأة).
			٦- تعب أو فقد طاقة كل يوم تقريباً.
			٧- أحاسيس بانعدام القيمة أو شعور مفرط أو غير مناسب بالذنب (والذي قد يكون توهماً) كل يوم تقريباً، وليس مجرد لوم الذات أو شعور بالذنب لكونه مريضاً.
			٨- انخفاض القدرة على التفكير أو التركيز، أو عدم الحسم، كل يوم تقريباً (إما معبر عنه ذاتياً أو ملاحظ من قبل الآخرين).
			٩- أفكار متكررة عن الموت (وليس مجرد خوف من الموت)، أو تفكير انتحاري متكرر بدون خطة محددة، أو محاولة الانتحار أو خطة محددة للانتحار.

		<p>ب- تسبب الأعراض ضيقاً مرضياً واضحاً أو احتلالاً في الأداء الاجتماعي أو المهني أو في مجالات هامة أخرى من التوظيف النفسي.</p> <p>ج- لا تترجم الأعراض عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة لمادة أو عن حالة طبية أخرى</p>
		<p>ملاحظة: لا تُعلل الأعراض بصورة أفضل من خلال فقد، أي، بعد فقد عزيز، إذ تستمر الأعراض لأكثر من شهرين أو تتصف باختلال وظيفي كبير أو انشغال مرضي بانعدام القيمة أو تفكير انتحاري أو أعراض ذهانية أو تأخر نفسياً حركياً ويجب استخدام الحس الإكلينيكي بمهارة للتفريق بينهما مع التاريخ الشخصي للمريض.</p>
		<p>د- لا يمكن تفسير النوبة الاكتئابية الأساسية بإرجاعها إلى اضطراب الفصام الوجدي، أو الفصام أو الاضطراب شبه الفصامي، أو الاضطراب التوهمي، أو طيف الفصام المميز أو غير المميز أو أي اضطراب ذهاني آخر.</p>
		<p>هـ - لا يكون قد أصيب الفرد بأي نوبة هوس أو هوس خفيف.</p>
		<p>حدد ما إذا كانت هناك:</p> <ul style="list-style-type: none"> - نوبة وحيدة أو معاودة (متكررة) - نوبة خفيفة أن متقطعة أو شديدة - مع أو بدون ملامح ذهانية - مع شفاء جزئي أو شفاء كامل للأعراض <p>- حدد ما إذا كان الاضطراب يصاحبه:</p> <ul style="list-style-type: none"> - فلاق وضيق - ملامح مختلطة - ملامح ملانخوليا - ملامح غير نمطية

تشخيص الاضطرابات النفسية لدى الراشدين: DSM-5

				- ملامح مزاجية ملائمة أو غير ملائمة
				- ملامح كثاثونية
				- ع ظهور بعد الولادة
				- ذات نمط موسمي

الاضطراب الاكتئابي المستمر (الديستيميا)

١	٢	٣	٤	الاضطراب الاكتئابي المستمر (الديستيميا)
				هذا الشخص كان يحمل اسم الاضطراب الاكتئابي المزمن والاضطراب الديستيمي في الصورة الرابعة من الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية DSM-IV
				أ - مزاج اكتئابي تقريبا طوال اليوم في معظم الأيام كما يبدو في الشعور الذاتي أو يلاحظه الآخرون لمدة عامين على الأقل ملحوظة: بالنسبة للأطفال والمرأهقين قد يكفي وجود المزاج الحاد وان تستمر الأعراض لمدة عام واحد.
				ب - تتوارد أثناء المزاج المكتتب اثنين أو أكثر من التالي: ١ - فقدان شهية أو زيادة في الشهية للأكل ٢ - أرق أو زيادة في النوم ٣ - فقدان الطاقة أو الشعور بالتعب ٤ - انخفاض تقدير الذات ٥ - ضعف التركيز أو صعوبة في اتخاذ القرارات ٦ - شعور بفقدان الأمل
				ج - في خلال فترة العاشرين (عام واحد بالنسبة للمرأهقين والأطفال) من الاضطراب، لم يخلو الفرد من وجود الأعراض بالمحكمين (أ و ب) لمدة تزيد عن شهرين.
				د - قد تتوارد محكات الاضطراب الاكتئابي الأساسي لمدة عامين متواصلين.
				هـ - لم يحدث أبدا نوبة هوس أو هوس خفيف ولم يتتوفر في أي وقت محكات المزاج التوابي

DSM-4 & DSM-5

			<p>و- ليس من الأفضل تفسير الاضطراب على أنه اضطراب فصام وجذاني مستمر أو فصام أو اضطراب توهمي أو طيف فصامي مميز أو غير مميز أو أي اضطراب ذهاني.</p> <p>ز- لا تعزى الأعراض إلى تأثيرات فسيولوجية لمادة (مثل سوء استخدام عقار أو دواء)</p> <p>ح- ان تسبب الأعراض عجزاً إكلينيكياً واضحاً أو خللاً في مجال التوظيف النفسي أو الاجتماعي أو المهني</p> <p>حدد ما إذا كان:</p>
			<p>١- نوبة خفيفة أو متوسطة أو شديدة</p> <p>٢- مع أو بدون ملامح ذهانية</p> <p>٣- مع شفاء جزئي أو شفاء كامل للأعراض</p> <p>٤- حدد ما كانت الاضطراب يصاحبه قلق وضيق</p> <p>٥- مع ملامح مختلطة</p> <p>٦- مع ملامح ملانخوليا</p> <p>٧- مع ملامح غير نمطية</p> <p>٨- مع ملامح مزاجية ملائمة أو غير ملائمة</p> <p>٩- مع ظهور قبل الولادة</p> <p>١٠- مع شفاء تام أو شفاء جزئي</p> <p>١١- مع ظهور مبكر (قبل عمر ٢١) أو ظهور متاخر (بعد عمر ٢١)</p>

اضطراب ضيق ما قبل الدورة الشهرية

اضطراب ضيق ما قبل الدورة الشهرية				
	٤	٣	٢	١
				أ - في الدورة الكبيرة للتبويض، تتوارد خمس أعراض في آخر أسبوع قبل الدورة الشهرية وتبدأ في التحسن في خلال أيام قليلة بعد بدء الدورة الشهرية وتتصبح خفيفة أو متنحية في الأسبوع التالي للدورة الشهرية
				ب - واحد أو أكثر من الأعراض التالية (يجب أن تتوارد):
				١ - تأرجح وجدياني ملحوظ (مثل، تارجح في المزاج، مع شعور مفاجئ بالحزن أو البكاء أو حساسية زائدة للرفض)
				٢ - استثارة أو غضب ملحوظ أو زيادة في الصراعات الشخصية
				٣ - مزاج مكتتب ملحوظ، ومشاعر فقدان الأمل، وأفكار تقلل من قيمة الذات
				٤ - فلاق وتوتر ملحوظ ومشاعر انك على الحافة
				ج - واحد (أو أكثر) من الأعراض التالية يجب أن يتوفّر لتكميل خمسة أعراض عندما تجمع مع أعراض المحك (ب) :
				١ - انخفاض الاهتمام بالأنشطة المعتادة (مثل العمل والأصدقاء والهوايات)
				٢ - إحساس بصعوبة في التركيز.
				٣ - ارهاق، وسرعة في التعب مع شعور بنقص الطاقة
				٤ - تغير ملحوظ في الشهية، أو أكل زائد أو لهفة لتناول الأطعمة
				٥ - أرق أو زيادة في النوم
				٦ - الإحساس بأنه مغمور (غرقان) بالمشكلات أو فقد للتحكم
				٧ - أعراض بدنية مثل ل Leone أو ورم بالثدي، أو آلم في المفاصل أو العضلات، الإحساس بالبدانة أو ازدياد الوزن

				ملحوظة: يجب أن تتوفر المحكات (أ، ب، ج) لمعظم فترات الدورة الشهرية للعام السابق.
				د- ان ترتبط الأعراض بقدر مرضي واضح أو تتدخل مع الأنشطة الاجتماعية المعتادة والمدرسة و العمل أو العلاقات بالآخرين (مثل تجنب الأنشطة الاجتماعية، انخفاض الإنتاجية والكفاءة في العمل أو المدرسة أو المنزل)
				هـ- الاضطراب ليس مجرد ظاهر لأعراض اضطراب آخر كاضطراب الكتاب الأساسي، اضطراب الهلع، اضطراب الكتابي المستمر (الديستيميا)، أو اضطرابات الشخصية (بالرغم من أنها قد تحدث متزامنة مع تلك الاضطرابات)
				و- يجب أن يتأكد حدوث المحك (أ) بواسطة التقديرات المتتالية اليومية لاثنين من الدورات لذاك الأعراض (وقد يتم وضع التخمين المبدئي قبل التأكيد بواسطة التقديرات اليومية)
				ز- أن لا تعزي الأعراض تأثيرات فسيولوجية لمادة (مثل سوء استخدام عقار أو دواء أو علاج آخر) أو بعزوها لحالة طبية أخرى مثل انخفاض نشاط الغدة الدرقية

الاضطراب الكتابي الناتج عن استخدام مواد أو أدوية

الاضطراب الكتابي الناتج عن استخدام مواد أو أدوية	٤	٣	٢	١
أ - اختلال واضح ومستمر في المزاج يسيطر على الصورة الإكلينيكية ويتسم بمزاج اكتئابي أو انخفاض ملحوظ في السرور والاهتمام أو في معظم الأنشطة				
ب- يوجد دليل من التاريخ، أو الفحص البدني، أو النتائج المعملية لكل من (١) و (٢) التاليين:				
١- الأعراض في المحك (أ) تطورت أثناء أو بعد التسمم بمادة أو الانسحاب أو التعرض للدواء				

				٢- أن تكون المادة أو الدواء المستخدم قادر على إنتاج الأعراض المذكورة في المحك (١)
				ج- ان لا يكون من الأفضل تفسير الاختلال بواسطه اضطراب اكتئابي غير محدث بمادة او دواء.
				د- الا يكون الاضطراب قد حدث حصريا اثناء حالة من الهذيان.
				هـ- ان يتسبب الاختلال في كدر مرضي واضح أو خلل في مجالات التوظيف الاجتماعي أو المهني أو أي مجال مهم آخر في حياة الفرد

الاضطراب الاكتئابي الناتج عن حالة طيبة أخرى

٩	٣	٢	١	الاضطراب الاكتئابي الناتج عن حالة طيبة أخرى
				أ - اختلال واضح ومستمر في المزاج يسيطر على الصورة الإكلينيكية ويتسم بمزاج اكتئابي أو انخفاض ملحوظ في السرور والاهتمام أو في معظم الأنشطة.
				ب - يوجد دليل من التاريخ، أو الفحص البدني، أو النتائج المعملية ان هذا الاختلال هو نتيجة مرضية مباشرة لحالة طيبة أخرى
				ج- ان الاختلال لا يفسر بشكل أفضل بواسطة اضطراب نفسي آخر (مثل اضطراب سوء التوافق المصحوب بإضطراب اكتئابي، الذي يكون الضغط المسبب له هو حالة طيبة خطيرة
				د- الا يحدث الاضطراب بشكل حصري اثناء حالة من الهذيان.
				هـ- ان يتسبب الاختلال في كدر مرضي واضح أو خلل في مجالات التوظيف الاجتماعي أو المهني أو أي مجال مهم آخر في حياة الفرد

اضطراب اكتئابي آخر محدد:

؟	٣	٢	١	اضطراب اكتئابي آخر محدد:
				وينطبق على الاضطراب الاكتئابي غير مكتمل الأعراض التي تكفي لتشخيصه في فئة من الحالات السابقة مثل:
				١- الاكتئاب القصير المعاود من يومين إلى ١٣ يوم
				٢- نوبة اكتئابية قصيرة ٤-٤ يوم
				٣- نوبة اكتئابية بدون أعراض كافية

اضطراب اكتئابي غير محدد:

؟	٣	٢	١	اضطراب اكتئابي غير محدد:
				يوضع للأعراض الاكتئابية غير الكافية لتشخيصه في فئة سابقة أو تحتاج لمزيد من الملاحظة لوضع حكم إكلينيكي دقيق

اضطرابات القلق

اضطراب قلق الانفصال

Separation Anxiety Disorder

٤	٣	٢	١	محكّات التشخيص: اضطراب قلق الانفصال
				أ - عدم تلاعُم نمائي وخوف أو قلق مفرط يتعلّق بالانفصال عن الأشخاص الذين تعلّق بهم (ارتبط بهم) الفرد وتكون علاماته أو مظاهره على الأقل ثلاثة مما يلي:
				١- كرب أو كدر مفرط متكرر (دوريا) عندما يتوقع الفرد الانفصال أو يمر بتجربة انفصال عن المنزل أو عن الشخصيات الرئيسية والمهمة التي يتعلّق بها.
				٢- انزعاج (خشية) متواصل ومفرط بشأن فقدان الشخصيات البارزة المهمة في حياته التي يتعلّق بها الفرد أو بشأن احتمال حدوث ضرر أو أذى لهذه الشخصيات مثل المرض، الإيذاء الجسدي، الكوارث أو الموت.
				٣- انزعاج (خشية) مستمر ومفرط بشأن التعرض لحدث مشئوم (مثل التعرض لفقد للضياع "فقدان الطريق"، أو التعرض للخطف، أو التعرض لحادثة مفاجئة، أو أن يصبح الفرد مريضاً) يتسبّب في انفصال الفرد عن الشخصية البارزة المهمة (الراشد) التي يتعلّق بها.
				٤- نفور (كره) كراهية أو رفض مستمر بأن يخرج الفرد بعيداً عن المنزل للذهاب إلى المدرسة أو إلى العمل أو إلى أي مكان آخر بسبب الخوف من الانفصال.
				٥- خوف مفرط ومستمر أو نفور (كره) كراهية بشأن أن يكون الشخص وحيداً (يمفرده) أو بدون الشخصيات البارزة المهمة في حياته التي يتعلّق بها في المنزل أو في أماكن أخرى.
				٦- نفور (كره) أو رفض متواصل لأن ينام الفرد بعيداً عن المنزل أو يمضي الفرد إلى النوم بدون أن يكون على مقرّبه من الشخصية البارزة المهمة في حياته التي يتعلّق بها

				٧- تكرار الكوابيس المتعلقة بموضوعات الانفصال.
				٨- تكرار الشكوى من الأعراض الجسدية (مثل الصداع، المغص أو الم في المعدة، الغثيان، القيء) عند حدوث الانفصال عن الشخصيات البارزة الرئيسية التي يتعلق بها الفرد أو عند توقع ذلك.
				ب- الخوف، القلق أو التجنب الذي يستمر بشكل دائم على الأقل ٤ أسابيع لدى الأطفال وعلى نحو نموذجي آ شهور أو أكثر لدى الراشدين.
				ت- الاضطراب يسبب كدر أو كرب إكلينيكي ذو دلالة أو تأثيرات سلبية في المجالات الاجتماعية، الأكاديمية، المهنية أو في المجالات العملية الهامة الأخرى.
				ث- الاضطراب لا يفسر على نحو أفضل بواسطة اضطراب نفسي آخر (مثل: اضطراب الطيف التوحدي، أو رهاب الأماكن المنسعة).

الصمت الانتقائي Selective Mutism

١	٢	٢	؟	محكات التشخيص: الصمت الانتقائي
				أ - إخفاق ثابت للتحدث (التكلم) في مواقف اجتماعية محددة يكون من المتوقع أن يتكلم فيها الفرد (مثل: المدرسة) وكره التحدث في مواقف أخرى.
				ب- الاضطراب يتعارض مع (ويؤثر سلباً على) الإنجاز التعليمي أو المهني أو مع التواصل الاجتماعي.
				ت- الاضطراب يدوم شهراً على الأقل (لا ينطبق على الشير الأول في المدرسة).
				ج- إلخاف في التحدث لا يعزى إلى نقص المعرفة أو عدم الألفة على اللغة السفلية المتطلبة في المواقف الاجتماعية.
				ث- الاضطراب لا يفسر على نحو أفضل بواسطة اضطراب لاتصال (التواصل). Communication Disorder

الرهاب النوعي Specific Phobia

محكات التشخيص: الرهاب النوعي			
٤	٣	٢	١
			أ - علامات للخوف أو القلق بشأن موضوع أو موقف محدد (مثل: الخوف من الطيران، أو المرتفعات، أو الحيوانات، أو الحقن، أو رؤية الدماء)
			ب- رهاب الموضوع أو الموقف دائمًا ما يثير خوف أو قلق فوري.
			ج- التجنب النشط لموضوع أو موقف الرهاب أو تحمله مع خوف أو قلق حاد.
			د- الخوف أو القلق لا يتاسب (مبالغ فيه) مع الخطير الحقيقي لوضع الموضوع أو الموقف المحدد (المعين) وللبيئة الاجتماعية - الثقافية.
			س- الخوف، القلق أو التجنب يكون متواصل وبشكل دائم ونمطي لمدة ٦ شهور أو أكثر.
			ص- الخوف، القلق أو التجنب يسبب كدر أو كرب إكلينيكي نو بذلة وله تأثيرات سلبية في المجالات الاجتماعية أو المهنية أو في المجالات العملية الهامة الأخرى.
			هـ- الاضطراب لا يفسر على نحو أفضل بواسطة أعراض اضطراب نفسي آخر (مثل رهاب الأماكن المتعددة، أو اضطراب الوسواس - القهري، أو اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، أو اضطراب القلق الاجتماعي).
			ويتم تحديد المتباه المثير للمخاوف المرضية:
			١- الحيوانات مثل العناكب والحشرات والكلاب.
			٢- بيئية طبيعية (مثل المرتفعات والعواصف والبحر).
			٣- الدم - الحقن - الإصابة (مثل الحقن والإجراءات الإسعافية الطبية).
			٤- المواقف (مثل الطائرات والمصاعد والأماكن المغلقة).
			٥- مثيرات أخرى (مثل الاختناق أو القيء).

اضطراب القلق الاجتماعي

Social Anxiety Disorder

الرهاب الاجتماعي Social phobia

٤	٣	٢	١	محكّات التشخيص: الرهاب الاجتماعي
				<p>أ - علامات للخوف أو القلق بشأن واحد أو أكثر من المواقف الاجتماعية التي يكون فيها الفرد معرض لاحتمالية التفاص (إمعان النظر) بواسطة الآخرين ومن أمثلة هذه المواقف موافق التفاعل الاجتماعي (مثل: القيام بمحادثة، أو مقابلة أشخاص غير ملوفين أو غرباء)، ويكون الفرد فيها ملاحظاً من الآخرين عند الطعام أو الشراب) أو قيام الفرد بتادية عملاً أمام الآخرين (مثل الحديث أو إلقاء خطبة).</p>
				<p>ب - مخاوف الفرد التي سيظهرها الفرد بطريقة ما أو أعراض القلق التي يظهرها الفرد ستقيم سلبياً من الآخرين (مثل الشعور بالإهانة أو الحرج أو الارتكاك وستؤدي إلى رفض أو إيذاء من الآخرين).</p>
				<p>ت - الموقف الاجتماعية دائماً ما تثير الخوف أو القلق.</p>
				<p>ث - تجنب الموقف الاجتماعية أو تحملها مع خسوف أو قلق حاد.</p>
				<p>ج - الخوف أو القلق الزائد لا يتناسب مع التهديد الحقيقي لوضع الموقف الاجتماعي وللسياق الاجتماعي - التنافي:</p>
				<p>س - الخوف، أو القلق أو التجنب يستمر بشكل دائم نمطياً لمدة ٦ شهور أو أكثر.</p>
				<p>هـ - الخوف، القلق أو التجنب يسبب كدر أو كرب إكلينيكي ذو دلالة أو تأثيرات سلبية في المجالات الاجتماعية، المهنية أو في المجالات العملية الهامة الأخرى</p>
				<p>و - الخوف، القلق أو التجنب لا يفسر على نحو أفضل بواسطة أعراض اضطراب نفسي آخر مثل اضطراب الهلع، اضطراب الطيف التوحدي.</p>

				لــ في حالات طبية أخرى (مثل الشلل الرعاش والمسمنة والحرق الشديدة أو الإصابة) الموجودة فإن الخوف أو القلق أو التجنب لا يكون متعلقاً بهذه الحالات أو أنه زائد وبطريقة مفرطة.
--	--	--	--	--

يتم تحديد ما إذا كان الخوف مقتصر على الحديث أو الأداء أمام جمهور.

اضطراب الهلع : Panic Disorder

٤	٣	٢	١	محكات التشخيص: اضطراب الهلع
				١- نوبات هلع غير متوقعة متكررة، نوبة الهلع تكون موجة مفاجئة للخوف الحاد أو للضجر (الانزعاج) الحاد تبلغ ذروتها خلال دقائق وأنشأه أربع دقائق زمنية أو أكثر تظهر الأعراض التالية:-
				٢- خفقان القلب بسرعة وقوة، قوة ضربات القلب أو زيادة معدل سرعة ضربات القلب.
				٣- الارتعاش
				٤- الشعور بقسر النفس (الشهيق والزفير متتابع) smothering
				٥- الشعور بالاختناق
				٦- الشعور بغصة في الحلق
				٧- ألم أو ضيق بالصدر
				٨- غثيان أو تواعك بالبطن
				٩- الشعور بالدوخة، عدم الاستقرار، الإصابة بالدوار أو بالإغماء
				١٠- الشعور بقشعريرة أو بحمى (صهد بالجسم)
				١١- الحس الزائف (تشوش الحس) (الإحساس بالخذر أو التنميم أو الإحساس بوخذ حفيظ)

			١٢ - فقدان الشعور بالواقع (الشعور بالزيف وبأن لا شيء حقيقي) أو اختلال الإنمية (فقدان الشعور بالشخصية) Depersonalization (يكون هناك انفصال بين الفرد - الذات) وكأنه في حلم
			١٣ - الخوف من فقدان التحكم أو من الإصابة بالجنون
			١٤ - الخوف من الموت
			ب- نوبة واحدة على الأقل يعقبها شهر (أو أكثر) بوحدة أو كلا مما يأتي:-
			١- هم أو ازعاج مستمر بشأن زيادة نوبات الهلع أو نتائجها (مثل فقدان السيطرة، التعرض لنوبة قلبية، الإصابة بالجنون)
			٢- تغير غير تكيفي ذو دلالة (هام) في السلوك المرتبط بالنوبات (على سبيل المثال السلوك المخصص لتجنب نوبات الهلع مثل تجنب موافق التدريب (الممارسة) أو موافق غير المألوفة للفرد)
			٣- الاضطراب لا يمكن عزوه إلى التأثيرات الفسيولوجية لمادة ما أو للمواد المخدرة (مثل إساءة استخدام العقاقير أو المخدرات، الأدوية) أو حالة طبية أخرى (مثل اضطراب فرط نشاط الغدة الدرقية، أو اضطراب القلب أو الرئتين).
			٤- الاضطراب لا يفسر أو يعلل على نحو أفضل بواسطة اضطراب نفسي آخر (مثلاً نوبات الهلع لا تظهر فقط كاستجابة للخوف من موافق الاجتماعية كما في اضطراب القلق الاجتماعي، أو في الاستجابة للرهاب المحدد بموضوعات أو موافق كما في الرهاب المحدد (النوعي) Specific Phobia، أو في الاستجابة للوسواس كما في اضطراب الوسواس - القهري، أو في الاستجابة لإعادة تذكر الأحداث الصادمة كما في اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، أو في الاستجابة لانفصال عن الشخصيات البارزة التي يتعلّق بها الفرد كما في اضطراب قلق الانفصال.

نوبة الهلع النوعي Panic Attack Specifies

ملاحظة:- ظهور الأعراض بغرض تحديد نوع نوبة الهلع، ومع ذلك فإن نوبة الهلع المحددة (النوعية) لا تكون (لا تعد) اضطراب عقلي Mental Disorder ولا يمكن تشخيصها بمفردها.

٤	٣	٢	١	نوبة الهلع النوعي
				<p>نوبات الهلع تحدث في سياق أي اضطراب للقلق بالإضافة إلى اضطرابات النفسية الأخرى (مثل اضطرابات الكتاب، اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، اضطرابات استخدام المواد المخدرة) وبعض الحالات الطبية (مثل: أمراض القلب، أو أمراض الجهاز التفصي، أو أمراض المعدة والأمعاء)، وفي هذه الحالة وعند تحديد نوع نوبة الهلع الموجودة فإنه يجب ملاحظتها (الإشارة إليها ورصدها) بوصفها نوبة هلع محددة (نوعية) (مثل اضطراب ضغط ما بعد الصدمة مع نوبات الهلع). أما فيما يتعلق باضطراب الهلع، فنوبة الهلع الموجودة تكون متضمنة داخل المحك الخاص بالاضطراب ولا تستخدم نوبة الهلع في هذه الحالة بوصفها نوبة هلع محددة (نوعية)، ونوبة الهلع (النوعية والمحددة) تتصنف بأنها موجة مفاجئة من الخوف الحاد أو الضجر الحاد تبلغ ذروتها في مدى دقائق وأثناء أربع دقائق (أو أكثر) تظهر الأعراض التالية:</p>
				<p>١- خفقان القلب بسرعة وقوه، قوة ضربات القلب أو زيادة معدل سرعة ضربات القلب.</p>
				<p>٢- العرق.</p>
				<p>٣- الارتعاش.</p>
				<p>٤- الشعور بقصور النفس (تسارع الشهيق والزفير).</p>
				<p>٥- الشعور بالاختناق.</p>

				٦- ألم أو ضيق في الصدر .
				٧- غثيان أو توّعك بالبطن.
				٨- الشعور بالدوخة، عدم الاستقرار، الإصابة بالدوار أو بالإغماء.
				٩- الشعور بقشعريرة أو بحمى (حرارة أو صهد بالجسم).
				١٠- الحس الزائف (الإحساس بالخذر أو التتميل أو الإحساس بوخز خفيف)
				١١- فقدان الشعور بالواقع (الشعور الزائف) أو اختلال الإلية (يكون هناك انفصال بين الفرد - الذات).
				١٢- الخوف من فقدان التحكم أو من الإصابة بالجنون.
				١٣- الخوف من الموت.
				ملاحظة: يجب الانتهاء للأعراض التي تتأثر بالثقافة مثل الصراخ والإغماء في المأتم في مصر.

رهاب الأماكن المتعددة : Agoraphobia

٤	٣	٢	١	محكات التشخيص: رهاب الأماكن المتعددة
				١- خوف أو قلق واضح بشأن اثنين (أو أكثر) من المواقف الخمس التالية:
				١- استخدام وسائل المواصلات (النقل) العامة (مثل السيارات أو، الأتوبيسات، أو القطارات، أو السفن، أو الطائرات).
				٢- وجود الفرد في أماكن (مساحات) مفتوحة (مثل موقف السيارات، ساحات السوق، الجسور).
				٣- وجود الفرد في أماكن مسجدة (لها أسوار) (مثل المتاجر، المسارح، دور السينما).
				٤- الوقوف في طابور أو وجود الفرد وسط حشد (في مكان مزدحم بالأفراد).
				٥- وجود الشخص بمفرده خارج المنزل.

			بـ- الفرد يخاف أو يتتجنب هذه المواقف بسبب الأفكار التي توجّد لديه بأن الفرار (الهروب) من هذه المواقف قد يكون صعباً أو أن مساعدة الآخرين قد لا تكون متاحة مما يؤدي إلى ظهور أعراض إعاقة أخرى)، مثل: (الخوف من أن يصبح الفرد مسنًا، الخوف من عدم القدرة على التحكم في النفس).
			تـ- موقف رهاب الأماكن المتعددة دائمًا ما تثير الخوف أو القلق.
			ثـ- موقف رهاب الأماكن المتعددة يتتجنبها الفرد بهمه ونشاطه، أو أن يطلب وجود رفيق معه في هذه الأماكن أو قد يتحملها مع قلق أو خوف حاد.
			جـ- الخوف أو القلق الزائد لا يتناسب مع الخطير الحقيقي لوضع موقف رهاب الأماكن المتعددة وللسياق الثقافي - الاجتماعي.
			حـ- الخوف أو، القلق أو التجنب يستمر بشكل متواصل على نحو نمطي لمدة 6 شهور أو أكثر.
			ءـ- الخوف أو، القلق أو التجنب يسبب كدر أو كوب إكلينيكي ذو دلالة أو تأثيرات سلبية في المجالات الاجتماعية، المهنية أو في المجالات العملية الهامة الأخرى.
			هـ- إذا ظهرت حالة طبية أخرى مثل: (مرض التهاب الأمعاء، مرض باركشنون أو الشلل الرعاش) فان الخوف، القلق أو التجنب يكون مرتفعاً بشكل واضح.
			ىـ- الخوف، القلق، أو التجنب لا يفسر على نحو أفضل بواسطة أعراض اضطراب نفسي آخر على سبيل المثال: الأعراض لا تقتصر على الرهاب المحدد، نمط رهاب الموقف ولا تتضمن فقط الموقف الاجتماعية (مثل اضطراب القلق الاجتماعي) ولا ترتبط على وجه الحصر بالوسواس (كاضطراب

				الوسواس القهري) أو بادراك الخلل أو العيب في المظهر الجسدي (اضطراب الشكل الشاذ للجسد/ عدم تناسق شكل الجسم (Body Dysmorphic Disorder أو بإعادة تذكر الأحداث الصادمة (كاضطراب ضغط ما بعد الصدمة) أو بالخوف من الانفصال (كاضطراب فلاق الانفصال).
--	--	--	--	--

اضطراب القلق العام :Generalized Anxiety Disorder

٤	٣	٢	١	اضطراب القلق العام
				أ - فلاق وشعور مفرط بالهم (توقع وترقب الشر) يحدث لأيام كثيرة لفترة لا تقل عن ٦ شهور، بشأن عدد من الأحداث أو الأنشطة (مثل العمل أو الانجاز المدرسي).
				ب - يجد الشخص صعوبة في السيطرة على شعوره بالهم.
				ت - يقترن القلق أو الشعور بالهم بثلاثة (أو أكثر) من الأعراض الستة التالية (على الأقل بعض هذه الأعراض تظهر لأيام كثيرة في السنتين الأخيرتين، وبالنسبة للأطفال يكفي عرض واحد فقط).
				١ - الشعور بعدم الراحة أو الشعور بالإثارة المرتفعة أو بالترقبة (أو يشعر أنه على حافة الهلاكية).
				٢ - الشعور بالتعب بسهولة.
				٣ - صعوبة التركيز أو أن يكون العقل فارغا.
				٤ - التهيج بسهولة.
				٥ - تقلص العضلات.
				٦ - اضطرابات النوم (الصعوبة في أن يدخل الفرد في النوم، أو أن يبقى نائماً أو الأرق، أو النوم غير المشبع).

				ثـ- القلق، الشعور بهم أو الأعراض البدنية تسبب كدر أو كوب الإكلينيكي ذو دلالة (هام) أو تأثيرات سلبية في المجالات الاجتماعية، المهنية أو في المجالات العملية الهامة الأخرى.
				جـ- الاضطراب لا يعزى إلى التأثيرات الفسيولوجية لمادة مخدرة (مثل إساعة استخدام العقاقير، المخدرات، الأنوية) أو الحالة طبية أخرى (مثل فرط نشاط الغدة الدرقية).
				دـ- الاضطراب لا يفسر أو يعلل على نحو أفضل بواسطة اضطراب نفسي آخر مثل (اضطراب الهلع أو، الرهاب الاجتماعي أو، اضطراب الوسواس القهري أو، اضطراب تلق الانفصال أو، اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، أو فقدان الشهية العصبي، أو اضطراب الشكل غير المتناسب للجسد، أو اضطراب قلق الأمراض الجسمية، أو الفصام أو اضطراب الهذيان).

اضطراب القلق الناجم عن مواد مخدرة أو طيبة

Substance / Medication - Induces Anxiety Disorder

٥	٣	٢	١	اضطراب القلق الناجم عن مواد مخدرة أو طيبة
				أـ- نوبات الهلع أو القلق تكون سائدة في الصورة الإكلينيكية.
				بـ- يوجد دليل (أدلة) من تاريخ الحالة، أو الفحص البدني أو نتائج المختبر في كلا من النقاطين التاليتين:
				١ـ- الأعراض في المحك (أ) تظهر أثناء أو تظهر سريعا عقب التسمم (الانسمام) بالمادة المخدرة Substance أو الانسحاب أو بعد التعرض لتناول الدواء.
				٢ـ- حالة تعاطي (استخدام، الانغماس في المادة المخدرة/ أو الدواء) تكون قادرة على إحداث الأعراض في المحك (أ).

				<p>ب- الاضطراب لا يفسر أو يعلل على نحو أفضل بواسطة اضطراب القلق الذي لا يحدّثه تعاطي المادة المخدرة/ الدواء، كما لا يفسّره ومثل هذا الدليل يضطر - القلق المستقل يمكن أن يتّصل ما يلي (إدمان المواد المخدرة/ الأدوية المسبب لاضطراب القلق) يسبقها بداية استخدام المادة المخدرة/ الدواء، الأعراض تستمر بشدة طوال الفترة الزمنية (نحو شهر واحد) بعد الانسحاب الحاد (الشديد) عن المادة المخدرة / الدواء أو في فترة التسمم (الانسحام) الشديد، أو يوجد دليل آخر يشير إلى وجود اضطراب القلق المستقل غير المرتبط بإدمان مادة مخدرة / دواء (مثل تاريخ متواتر لعدم تعاطي مادة مخدرة / دواء).</p> <p>ت- الاضطراب يسبب كدراً أو كرباً إكلينيكياً ذو دلالة أو يحدث تأثيرات سلبية في المجالات الاجتماعية، المهنية أو في المجالات العملية الهامة الأخرى.</p>
--	--	--	--	---

اضطراب القلق الناشئ عن حالة طبية أخرى

Anxiety Disorder Due to Another Medical Condition

٤	٣	٢	١	اضطراب القلق الناشئ عن حالة طبية أخرى
				أ - نوبات الهلع أو القلق تكون سائدة في الصورة الإكلينيكية.
				ب- يوجد دليل من تاريخ الحالة، الفحص الجسدي أو نتائج المختبر بأن الاضطراب يكون نتيجة مباشرة لمرض فسيولوجي.
				ت- الاضطراب لا يفسر أو يعلل على نحو أفضل بواسطة اضطراب نفسي آخر.
				ث- الاضطراب لا يظهر (لا يحدث) على وجه الحصر أثناء فترة النذيان.

				جـ- الاضطراب يسبب كدراً أو كرباً إكلينيكياً ذو دلالة أو تأثيرات سلبية في المجالات الاجتماعية، المهنية أو في المجالات العملية الهامة الأخرى.
				ملاحظة: يجب عمل التشخيص لهذا الاضطراب بدلاً من التشخيص بالتسنم بالمواد المخدرة أو أنها أعراض انسحابيه (للمادة المخدرة) و فقط عندما تكون الأعراض في المحك (أ) مميطرة وواضحة في الصورة الإكلينيكية وأنها شديدة بدرجة كافية Warrant لجذب الانتباه الإكلينيكي.

اضطراب القلق النوعي الآخر :

هذه النقطة خصصت للعرض الذي به خصائص الأعراض لاضطراب القلق التي تسبب الكدر الهام إكلينيكياً أو العجز في المجالات الاجتماعية والمهنية أو المجالات الهامة في حياة الفرد، ولكن لا ينطبق عليها كل المحکات لأي اضطراب في فئات تشخيص القلق السابقة.

فئة اضطراب القلق النوعي الآخر تستخدّم في المواقف التي يختار (يقرر) الطبيب أن يتّناول السبب النوعي للعرض الذي لا ينطبق عليه أي محکات لاضطراب القلق النوعي.

اضطراب القلق النوعي الآخر				
٤	٣	٢	١	
				وينجز هذا بواسطة تدوين "اضطراب القلق النوعي الآخر" الذي يتبعه السبب النوعي (المحدد) مثلاً اضطراب القلق العام الذي يحدث لأيام أقل من غيرها.
				أمثلة لتصنيف اضطراب القلق الآخر يتضمن ما يلي:
				١- نوبات عرض محددة.
				٢- القلق العام لا يحدث لأيام كثيرة.
				٣- نوبات التنفس
				٤- نوبة عصبية

اضطراب القلق غير النوعي (غير المحدد)

هذه الفئة خصصت لعرض الذي به خصائص الأعراض باضطراب القلق الذي يسبب الكدر الإكلينيكي أو العجز في المجالات الاجتماعية أو المهنية أو المجالات الأخرى السائدة ولكن لا ينطبق عليها المحكات الكاملة لأي اضطراب لفئة تشخيص اضطرابات القلق.

وستستخدم فئة اضطراب القلق غير النوعي في المواقف التي يقرر فيها الطبيب انه لا يحدد سبب بأن هذه المحكات لا تتطبق على اضطرابات القلق النوعي، والتي تكون هناك معلومات غير كافية لعمل تشخيص نوعي أكثر مثل ذلك موقف عيادات الطوارئ وبالمستشفيات.

الوسواس القهري والاضطرابات ذات الصلة

وجود أفكار متكررة وملحة وغير منطقية ولا يستطيع الفرد إيقافها رغم علمه أنها خاطئة وغير منطقية، وقد تكون أفكاراً أو أفعالاً أو كليهما.

اضطراب الوسواس القهري :

- ـ فكرة أو صورة لمنظر حسن أو سيء أو جملة معينة أو مقطع موسيقى مثلاً إن أحداً سيفتلة، أو أنه سيشتم رئيسه في العمل أو يتعرض أحد أفراد أسرته لحادثة خطيرة أو للموت إذا لم يفعل سلوكيات أو أفعالاً معينة
- ـ الاندفاعات: رغبة جامحة لأن يقوم بأفعال لا يرضى عنها ويحاول مقاومتها. مثلاً التأكد من غلق الأبواب والأجهزة قبل النوم مرات عديدة، ترتيب الأشياء أو الأعمال بطريقة معينة وإن أخطأ فإنه يعيد أفعاله مراراً، وأن هناك أفكاراً تطارده مثلاً العذوان على الآخرين أو قتل أحدهم أو الانتحار من مكان مرتفع أو الغناء في ماتم أو تسميع جدول الضرب أو شتم الذات الإلهية. والاندفاعات قد تكون تافهة أو خطيرة والشخص يعرف أنها غير منطقية ولكن لا يستطيع التحكم فيها أو وقفها.
- ـ اجترار الأفكار: تطارده الأفكار بأسئلة يصعب الإجابة عنها مثلاً من خلق الله، لماذا يوجد المرض والمعاناة في هذا العالم، أو أن هناك

احتمالاً بأن أباها قد اغتصبها وهي طفولة (لا تعني شيئاً) وقد ترتبط المخاوف المرضية بالوسواس مثل الخوف من أماكن العبادة أو المطابخ أو دورات المياه، ويعتبر ذلك عرضاً ثانوياً لوسواس مرتبط بهذه الأماكن.

٤- الطقوس الحركية: مثل غسل الأيدي عشرات المرات أو الخوف من التلوث والاستحمام المتكرر للطهارة أو تكرار الصلاة أو العد الإيجاري للأرقام تنازلياً أو تصاعدياً أو مراجعة إغلاق البوتجاز مرات عديدة للغاية أو الترتيب المفرط للأشياء وقد تستمر هذه الطقوس ساعات.

٥- يتم التعامل مع الأفكار الوسواسية والأفعال القهيرية بإعتبارهما تعبيراً عن خلل معرفي نابع من مصدر واحد، أي لا يوجد فرق بين الفكرة أو الفعل.

أولاً: الوساوس :

محكّات تشخيص: اضطراب الوساوس				
١	٢	٣	٤	٥
أ - يجب أن تتوفّر النقاط الثلاث التالية لكي يشخص:				
١- اقتحام أفكار أو اندفاعات أو صور ذهنية متكررة ومستمرة وتسبّب له القلق والشعور بالكره والضغط لا تتمحور هذه الأفكار حول مشكلات حياتية حقيقة.				
٢- محاولة الشخص تجاهل أو إيقاف هذه الأفكار أو الاندفاعات أو الصور.				
٣- إدراك الشخص أن الأفكار أو الاندفاعات أو الصور الذهنية هي نتاج عقله هو وليس مقحمة عليه من الخارج.				
ب- بشرط أن تعيق هذه الوساوس الفرد عن أنشطة هامة في مجالات حياته اليومية كالعمل أو المذاكرة وتستغرق وقتاً طويلاً (أكثر من ساعة في اليوم)				

ثانياً: الأفعال القهريّة :

٤	٣	٢	١	محكّات تشخيص: اضطراب الأفعال القهريّة:
				١ - يجب أن تتوفر النقاط الثلاث التالية لكي يشخص:
				١ - سلوكيات متكررة أو أفعال متكررة يدفع الفرد إلى تأديتها استجابة لوسواس أو أتباعاً لقواعد قام بإحداثها ويتوّجّب عليه أن يطبقها.
				٢ - تهدف هذه السلوكيات إلى منع وقوع كرب أو مصيبة له أو لأحد أفراد أسرته.
				٣ - يدرك الفرد أن الأفعال القهريّة غير معقوله وغير واقعية.
				٤ - هذه السلوكيات تعوق حياة الشخص الطبيعية وأدائه في مختلف المجالات المعتادة.

هناك حالات لا يدرك فيها الشخص أن لديه وساوس مرضية وهذا يحتمل أن:

- ١ - أن الشخص ذو ذكاء أقل من المتوسط
- ٢ - أن الوسواس قد يكون مقدمة للذهان

اضطرابات التشوه الجسّمي:

٤	٣	٢	١	محكّات التشخيص: اضطرابات التشوه الجسّمي
				أ - الانشغال بوحد أو أكثر لعيوب ونواقص مدركة في شكل الجسم لا يلاحظها الآخرين أو أنها عيب طفيف.
				ب - أثناء مسار الإضطراب فإن الشخص يؤدي سلوكيات متكررة (مثلاً مراجعة دائمة للشكل في المرأة، أو أداء تعديلات زائدة مثل الماكياج أو إغلاق الفم عند وجود بروز في الأسنان... الخ، أو التقاط الجلد أو البحث عن الطمانة من الآخرين، وربما تكون هناك أفعال عقلية مثل مقارنة بنهشه - دائمًا - بالآخرين في الواقع أو على المستوى التخييلي فيما يتعلق بنواقص أو عيوب الشكل).

				ج- يسبب هذا الانشغال كرب أو عجز جوهري في حياة الشخص الاجتماعية والمهنية أو العمل.
				د- هذا الانشغال لا يرجع للسمنة المفرطة الواضحة أو التحافة المرضية (الشرة العصبي).
				ويجب تحديد ما إذا كان هناك:
				- تشوه عقلي: حيث يشغل الشخص بفكرة أنه (أو أنها) صغيرة الحجم للغاية أو أن العضلات بها نقص هذا التحديد يتم حتى في حالة وجود أشكال تشوه أخرى لدى الفرد.
				تحديد ما إذا كان هناك:
				- وجود درجة من الاستبصار خاص بمعتقدات التشوه الجسми مثل (أنه أو أنها) قبيحة أو أنها مشوه أو مسخ.
				- في حال وجود استبصار جيد بان أفكاره غير حقيقة.
				- أو في حال وجود استبصار ضعيف اعتقاد الفرد أن أفكاره محتملة أن تكون حقيقة.
				- في غياب الاستبصار اعتقاد الفرد أن التشوه الطفيف هو تشوه حقيقي تماماً.

اضطراب الكركبة :

٤	٣	٢	١	مكبات التشخيص: اضطراب الكركبة
				أ- صعوبة متواصلة في نبذ (مفارة) أو ترك الممتلكات بصرف النظر عن قيمتها الحقيقة (غالباً الثمن أو رخيصة).
				ب- ترجع هذه الصعوبة إلى الحاجة المدركة بحفظ المتعلقات والشعور بالكرب إذا ترك تخلص من هذه المتعلقات.

		<p>جـ- ينجم عن صعوبة التخلص من الممتلكات تراكم هذه الممتلكات والتي تسبب ازدحام وتسبب الفوضى في أماكن المعيشة واعقادهم أنهم سوف يستخدمونها، وإذا كانت المناطق (أماكن تجمع الممتلكات) غير فوضوية ربما يكون ذلك بسبب تدخلات من أطراف ثلاثة مثل (الأسرة والعمال أو السلطات).</p>
		<p>دـ- تسبب الكركبة كرب دال وعجز في الجوانب الاجتماعية والمهنية وال المجالات الأخرى (منها الحفاظ على بيئة آمنة له ولآخرين).</p>
		<p>سـ- الكركبة ليس لها علاقة بأي مرض آخر مثل (اصابات الدماغ وأمراض الأوعية المخية).</p>
		<p>صـ- الكركبة ليست عرض جانبي لمرض نفسي آخر مثل التوهمات (في الاكتتاب أو القهري أو الكسل الوسواسي (الهزاءات) في العناصر أو أي مرض ذهني آخر، أو التوحد ويحدد التشخيص إذا : إذا ما كان هناك اكتساب مفرط: إذا كانت هناك صعوبة في نبذ الممتلكات المصاحبة لفرط الاكتساب للعلاقات التي لا يحتاجها أو أن مساحة الشقة صغيرة ولا تكفي.</p> <p>وتحديد ما إذا كان هناك :</p>
		<p>- استبصار جيد للمعتقدات والسلوكيات بأنها تمثل مشكلة (استمرار الحفاظ على الممتلكات دون داع، والانتظار والتمسك المفرط).</p>
		<p>- استبصار ضعيف يعتقد أن معتقداته وسلوكياته في الكركبة لا تمثل مشكلة</p>
		<p>- غياب الاستبصار حيث يعتقد أن معتقداته وسلوكياته في الكركبة لا تمثل مشكلة (رغم أنها تمثل مشكلة).</p>

اضطراب نتف الشعر : Trichotillo Mania

محكات التشخيص: اضطراب نتف الشعر	١	٢	٣	٤
أ - الانقاط المتكرر لشعر الفرد وينجم عنه فقد الشعر.				
ب- محاولات متكررة لإيقافه أو وقف التقط الشعر.				
ج- يسبب هذا الانقاط كرب دال إكلينيكي أو عجز اجتماعي أو مهني الخ				
س- التقط الشعر لا ينجم عن أي مرض آخر.				
ص- هذا الانقاط لا يمكن اعتباره ناجم عن اضطراب عقلي آخر مثل حالات اضطراب أو تشوه الجسم.				

اضطراب التقط الجلد : Excoriation

محكات التشخيص: اضطراب التقط الجلد	١	٢	٣	٤
أ - التقط متكرر للجلد ينجم عنه أذى للجلد.				
ب- يحاول الفرد وقف أو تخفيض (هذا العرض) لالتقط الجلد.				
ج- التقط الجلد يسبب كرب دال أو عجز اجتماعي أو مهني أو أي مجال هام آخر في حياة الفرد.				
س- لا يعود ذلك للأثار الفسيولوجية للعقاقير (مثل الكوكايين) أو أي مرض جلدي.				
ص- التقط الجلد ليس عرضاً لاضطراب عقلي آخر مثل التوهمات أو الهلاوس اللمسية في الأمراض الذهانية كما أنه ليس محاولة لتحسين صورة الفرد في اضطراب التشوه الجسمي.				

DSM-4 & DSM-5

الأعراض الوسواسية والاضطرابات ذات الصلة الناجمة عن عقاقير مخدرة أو علاج طبي:

؟	٣	٢	١	محكات التشخيص: الأعراض الوسواسية والاضطرابات ذات الصلة الناجمة عن عقاقير مخدرة أو علاج طبي
				- وجود الأعراض (الوسواس، الكركبة، التشوه الجسми ... الخ).
				- وجود دليل بأن العقاقير هي المسيبة للعرض.
				- إن العرض لا يأتي أثناء حالات الهذيان المرضية.
				- الاضطراب يسبب كرب وعجز في الأنشطة الاجتماعية والمهنية والشخصية.

الاضطراب غير المحدد للوسواس القهري والاضطرابات ذات الصلة :

؟	٣	٢	١	الاضطراب غير المحدد للوسواس القهري والاضطرابات ذات الصلة مثل :
				الاضطراب غير المحدد للوسواس القهري والاضطرابات المشابهة:
				إن الأعراض غير كافية أو غير شديدة كي تتطبق عليها معايير الاضطراب (الوسواس القهري أو الاضطرابات المشابهة) مثل:
				- وجود اضطرابات التشوه الجسми في حالات وجود تشوهات فعلية يلاحظها الآخرون مثل السمنة أو النحافة المفرطة وأن ذلك يسبب عجز دال أو كرب نفسي.
				- اضطراب التشوه الجسми مع عدم وجود سلوكيات متكررة أو أي أفعال عقلية ناجمة عن انشغاله بالظاهر الجسми.
				- اضطراب السلوك المتكلر المتمرّك حول الجسم مثل: قضم الأظافر وعض الشفافيف وقرص الخدود (لكي تكون حمراء) وهناك محاولات متكررة لإنقاص أو وقف هذه السلوكيات وتسبب كرب أو عجز دال في المجال الاجتماعي والمهني والشخصي.

			- الغيرة الوسواسية: الشك المفرط المرضي في إخلاص الزوج (أو الزوجة) تؤدي لسلوكيات متكررة، أو أفكار عقلية بشأن عدم الإخلاص يسبب عجز دال في المجال الاجتماعي أو المهني أو الشخصي وكرب نفس.
			- الوسوسة الشخصية البارانوية المفرطة من حدوث عاهة للفرد.
			- الوسوسة المفرطة من تراجع الحالة الصحية لحد الموت.
			- الوسوسة المفرطة من وجود رائحة مفقرة للجسم.

اضطراب ضغط ما بعد الصدمة

Posttraumatic Stress Disorder اضطراب ضغط ما بعد الصدمة

٤	٣	٢	١	اضطراب ضغط ما بعد الصدمة
				ملاحظة: المحكات التالية تطبق على الراغبين والراهقين والأطفال أكبر من ٦ سنوات.
				١- التعرض لخبرة الموت الفعلية (والنجاة منها) أو حدوث إصابة خطيرة أو اغتصاب جنسي في واحد أو أكثر مما يلي:
				١- الخبرة المباشرة للحدث (أو الأحداث) الصدمي.
				٢- مشاهدة - شخصيا - الحدث (أو الأحداث) الصادمة أو المميتة لأخرين.
				٣- العلم بحدوث حدث (أو أحداث) صائم لأحد أفراد الأسرة أو صديق مقرب، في حالات الموت الفعلي أو تهديد الحياة، هذا الحدث يمثل موقف عنف أو حادثة.
				٤- الخبرة بالposure المتكرر أو المتطرف لتفاصيل بغيضة (مكررها) للحادث الصدمي (مثلاً مشاهدة أجزاء مبتورة - لشخص - في حادث سيارة، أو التعرض لتفاصيل اغتصاب طفلة (أو طفل).

			<p>ملاحظة :</p> <p>أ - المحك الرابع 4 A لا ينطبق على مشاهدة هذه الخبرات الصادمة عبر أجهزة الإعلام أو الأفلام أو الصور إلا إذا كان ذلك مرتبطاً بالعمل (صحفى حوادث مثلاً).</p> <p>ب- وجود واحد أو أكثر من الأعراض الدخيلة المرتبطة مع الحادث الصدمي والذي يبدأ بعد الحادثة (أو الحوادث) :</p>
			<p>١- تكرار دوري ولا إرادى ومتطرف للذكريات المؤلمة.</p> <p>ملاحظة: الأطفال أكبر من ٦ سنوات يمكن أن يمثل أو يعبر الطفل مراراً عن موضوع أو جوانب الحادث الصادم.</p>
			<p>٢- أحلام متكررة مفزعه حيث يكون المضمون (مع - أو) مؤثراً في الأحلام المرتبطة بالحادث الصادم.</p> <p>ملاحظة: قد يوجد لدى الأطفال أحلام مرعبة بدون مضمون يمكن التعرف عليه.</p>
			<p>٣- ردود فعل انشقاقية في الذاكرة (مثلاً استعراض لا إرادى للحدث الصدمي) حيث يشعر أو يتصرف الشخص وكأن الحادث الصادم يتكرر مراراً.</p> <ul style="list-style-type: none"> ردود الأفعال هذه يمكن أن تحدث على متصل من التعبير المنطوف لدرجة فقدان الوعي بالبيئة المحيطة بالشخص. <p>ملاحظة: في الأطفال قد يمثل الطفل الخبرة الصادمة وكأنه في مسرحية.</p>
			<p>٤- كرب ومشقة نفسية شديدة أو مطولة (المدة طويلة) عند التعرض لمنبهات داخلية أو خارجية تمثل أو تذكر بالحدث الصدمي.</p>
			<p>٥- ردود فعل فسيولوجية ملحوظة لمنبهات الداخلية أو الخارجية التي ترمز أو تمثل الحدث الصدمي.</p>

			ج- تجنب متواصل ومستمر للمنبهات المرتبطة بالحادث الصادم، يبدأ بعد الحادثة كما يبينه (يظهره) واحد أو اثنين مما يلي:
			١- تجنب أو بذل جهد لتجنب الذكريات المؤلمة والأفكار والمشاعر عن (أو مرتبطة بقرب) مع الحدث الصادم.
			٢- تجنب أو جهر لتجنب الذكريات الخارجية مثل الأشخاص أو الأماكن أو الحوارات أو الأنشطة أو الموضوعات أو المواقف التي تثير ذكريات أو أفكار أو مشاعر مؤلمة أو المرتبطة عن قرب بالحدث الصادم.
			د- حدوث تغيرات سلبية في المعارف والحالة المزاجية مرتبطة بالحدث الصادم يبدأ أو يصبح أسوأ بعد حدوث الحدث الصادم كما يبينه (يظهره) اثنين أو أكثر مما يلي:
			١- العجز (عدم القدرة) عن تذكر جانب هام من الحدث الصادم (من المعتمد أن يرجع ذلك لفقد ذاكرة انسقافية وليس نتاج للعوامل الأخرى مثل إصابة الدماغ أو الكحوليات أو العقاقير).
			٢- معتقدات سلبية مستمرة أو متضخمة أو توقعات عن ذات الفرد أو الآخرين أو العالم (مثلًا أنا سيء، لا يمكن أن نثق بأحد أو أن العالم أصبح خطيراً وسيئاً تماماً أو أن الجهاز العصبي قد دمر تماماً).
			٣- أفكار ومعارف مستمرة ومشوهة عن سبب أو عواقب الحدث الصدمي تؤدي بالفرد إلى توبیخ نفسه أو الآخرين.
			٤- حالة انفعالية سلبية مستمرة (مثل الخوف أو الفزع أو الغضب أو الشعور بالذنب أو العار).

DSM-4 & DSM-5

			٥- مشاعر بالانفصال والغرابة عن الآخرين.
			٦- نقص الاهتمام والمشاركة بدرجة ملحوظة في الأنشطة الحياتية الهامة في حياة الفرد.
			٧- عجز مستمر للاستمتاع بالانفعالات الإيجابية (مثلا العجز عن الخبرة بالسعادة أو الرضا عن الحياة أو مشاعر الحب).
			٨- تغيرات ملحوظة في الاستئارة والاستجابة المرتبطة بالحدث الصادم يبدأ أو يصبح أسوأ بعد الحدث الصدمي كما يبينه اثنان أو أكثر مما يلي
			٩- سلوك اهتياج أو نوبات غضب (بدون أو بقليل من الاستفزاز من أحد) يعبر عنه عادة (نمطيا) بعدوان لفظي أو جسمى تجاه الآخرين أو الموضوعات أو الأشياء.
			١٠- سلوك طائش أو مدمر للذات.
			١١- يقطنة مفرطة.
			١٢- رد فعل انتقاضي أو خضه (إجفال) مبالغ فيه.
			١٣- صعوبات في التركيز.
			١٤- اضطرابات في النوم (مثلا صعوبة في النوم أو صعوبة في البقاء نائما أو نوم قلق)
			١٥- مدة الاضطراب (المحكات ب، ج، س، ص) تستمر لأكثر من شهر.
			١٦- يسبب الاضطراب مشقة إكلينيكية جوهرية أو عجز في الجوانب الاجتماعية والمهنية والشخصية.
			١٧- هذا الاضطراب لا يرجع لأسباب فسيولوجية أو عقاقير أو مخدرات.

٤	٣	٢	١	يجب تحديد ما إذا كان الاضطراب يحدث مع:
				<ul style="list-style-type: none"> • أعراض انشقاقية (في الذاكرة): الأعراض المرضية تتطبق على محكمات اضطراب مشقة ما بعد الصدم بالإضافة فإن الاستجابة للضغط يجعل الشخص يخبر (يعاني) أعراض مستمرة أو متكررة في واحد مما يلي: <p>١- اختلال الانبهة:</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - خبرات مستمرة ومتكررة للشعور بالانفصال عن الذات وكأن الشخص يراقب نفسه من الخارج أو كان الشخص يحيا في حلم شاعراً بعدم الواقعية للذات أو الجسم أو أن الوقت يمر ببطء. <p>٢- عدم الواقعية: Derealization</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - خبرات مستمرة ومتكررة بعدم الواقعية بالبيئة المحيطة (فالعالم المحيط بالفرد غير حقيقي ومثل الحلم وبعيد وربما مشوه). <p>ملاحظة:</p>
				<ul style="list-style-type: none"> - لاستخدام هذه الأنماط الفرعية فإن الأعراض الانشقاقية يجب ألا تعزى إلى آثار فسيولوجية للعقاقير (مثل التسمم بالمخدرات) أو نوبات غيبوبة. - ويجب تحديد ما إذا كان ذلك مع:
				<ul style="list-style-type: none"> - تعبير مرجأ: إذا كانت محكمات التشخيص ليست منطقية حتى بعد ٦ شهور على الأقل بعد الحادثة (مع أن البداية والتعبير عن بعض الأعراض يمكن أن تكون فورية).

اضطراب الضغط الحاد:

٤	٣	٢	١	اضطراب الضغط الحاد: Acute Stress Disorder
				<p>أ - التعرض للتهديد بالموت أو الموت الحقيقي أو إصابة خطيرة أو انتهاك جنسي في واحد أو أكثر مما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- التعرض المباشر للحدث الصدمي. ٢- مشاهدة الحدث مباشرة وشخصياً - عندما تحدث للأخرين. ٣- التعلم (العلم) أن الحدث الصدمي حدث لأحد أقربائه أو أحد أصدقائه المقربين. <p>ملاحظة:</p> <p>- في حالات التعرض للموت (أو الموت الحقيقي) لأحد الأقارب أو لصديق مقرب يجب أن تكون الحادثة قاسية (وعنيفة) أو حادث خطير.</p>
				<p>١- المرور بخبرة التعرض المتكرر أو المتطرف لتفاصيل بغيضة (مكررها) للحدث الصدمي. مثلاً أن يكون الشخص أول من يجمع بقايا جثة أو أن يكون ضابطاً بوليس يتعرض مروراً لتفاصيل إساءة استغلال الأطفال (قتل - تعذيب - قتل).</p> <p>ملاحظة:</p> <p>- لا يشمل ذلك التعرض لهذه الخبرات في الأفلام أو أجهزة الإعلام أو الصور، إلا إذا كان ذلك مكملاً للخبرات المباشرة كما سبق ذكرها.</p>
				<p>ب- وجود تسع (أو أكثر) من الأعراض التالية في أي من الفئات الخمس للتطفل (الاقتحام, Intrusion)، أو المزاج السلبي أو تفكك الذاكرة أو التجنب (الحدث الصدمي) أو الاستثناء (التهيج) والتي تبدأ أو تصبح أسوأ بعد الحادث الصدمي.</p>

أعراض التطفل (الاقتحام):				
٤	٣	٢	١	
				١- ذكريات للكرب Distress متكررة وغير إدارية ومتطلفة للحدث الصدمي.
				٢- أحلام كرب متكررة حيث يكون المحتوى و (أو) الذي يؤثر على الحلم له علاقات بالحدث الصدمي.
				٣- ردود الفعل التفككية (لذاذة) مثل: الاسترجاع لذكريات الحادث الصدمي حيث يشعر الفرد أو يتصرف كأن الحادث الصدمي يتكرر ويعود ردود الفعل هذه يمكن أن تحدث على متصل من التعبير المتطرف حيث يحدث فقدان كامل للوعي للبيئة المحيطة بالفرد.
				٤- الكرب الشديد والمطهول (الممتد) أو الاستجابات الفسيولوجية الملحوظة استجابة للمنبهات الداخلية أو الخارجية التي ترمز أو تمثل أحد جوانب الحادث الصدمي.
				المزاج السيئ :
				٥- العجز المستمر (والمتو اصل) للشعور بانفعالات إيجابية (سارة) مثلا العجز عن الشعور بالسعادة أو الرضا أو الحب.

الأعراض التفككية:				
٤	٣	٢	١	
				٦- تغير الحس (الإدراك) لواقع البيئة المحيطة بالفرد أو تغير إدراك الشخص لنفسه من وجهة نظر مختلفة عن السابق، ويصبح في دوار (دوخة)، ويشعر بالبطء في مرور الوقت.
				٧- العجز عن تذكر جانب هام من الحادث الصدمي (ويرجع ذلك - نمطيا - لفقد ذاكرة تفككه)، وليس للعوامل الأخرى المحتملة (مثل التعرض لحادث إصابة بالدماغ أو تناول الكحوليات أو العقاقير).

				اعراض التجنب:
٤	٣	٢	١	
				- يبذل الشخص جهود متواصلة لتجنب ذكريات الكرب والأفكار والمشاعر المرتبطة والقريبة بالحادث الصدمي.
				- يبذل الشخص جهود متواصلة لتجنب كل ما يذكره (كمبهرات) خارجياً مثل الناس أو الأماكن أو الأحاديث أو الأنشطة أو الموضوعات أو المواقف التي تثير ذكريات الكرب أو الأفكار أو المشاعر القريبة الارتباط من الحدث الصدمي.

				اعراض التهيج:
٤	٣	٢	١	
				١٠- اضطرابات في النوم (صعوبة النوم أو البقاء مستيقظاً أو النوم المضطرب (القلق).
				١١- سلوك تهيج ونوبات غضب (بقليل أو بدون استفزاز)، كما يعبر عنه عادة (نمطياً) بدعوان لفظي أو فيزيقي (جسدي) تجاه الناس أو الأشياء.
				١٢- يقظة مفرطة.
				١٣- مشكلات (أو صعوبات) في القراءة على التركيز.
				١٤- استجابة إيجاف (خضة) مبالغ فيها.
				جـ- مدة الاضطراب (اعراض المحك به) يكون من ٣ إلى ٣٠ يوم بعد التعرض للحادث.
				ملاحظة: تبدأ الأعراض عادة فوراً بعد الحادث الصدمي لكنها تجد مقاومة لثلاثة أيام على الأقل وحتى شهر وذلك لكي نطبق عليها محك الاضطراب.
				دـ- يسبب الاضطراب كرب جوهري إكلينيكي أو عجز في الجوانب الاجتماعية والمهنية والشخصية أو مجالات أخرى هامة للفرد.

				س- هذا الاضطراب لا يكون بسبب آثار فسيولوجية (مثل العلاجات الطبية أو الكحول) أو لأي سبب طبي آخر (مثل إصابات الدماغ) كما يكون بعيداً عن اضطراب الذهان الموجز .brief
--	--	--	--	---

اضطراب التوافق: Adjustment Disorder

٤	٣	٢	١	اضطراب التوافق: Adjustment Disorder
				١- تطور (وزيادة) في الأعراض الانفعالية والسلوكية كرد فعل (استجابة) لمثير المشقة (الضغوط) المحددة والتي تحدث خلال ٣ شهور من بداية الضغوط.
				٢- هذه الأعراض أو السلوكيات دالة إكلينيكيا كما يستدل عليها من واحد أو كلا الاثنين مما يلي :
				أ - كرب ملحوظ لا يتاسب مع شدة الضغوط ويؤخذ في الحسبان السياق الخارجي والعوامل الثقافية التي ربما تؤثر على شدة وطريقة ظهور الأعراض.
				ب - عجز جوهري في الوظائف (الجوانب) الاجتماعية والمهنية والشخصية وال المجالات الأخرى المؤثرة.
				٣- هذا الاضطراب المتعلق بالضغط لا ينطبق عليه محكات أي اضطراب عقلي آخر، وليس مجرد استفحال لاضطراب عقلي مصاب به الشخص
				٤- لا تمثل الأعراض مشاعر متوقعة عند فقدان عزيز.
				٥- في حال انتهاء الضاغط أو عواقبه، فإن الأعراض لا توجد لأكثر من ٦ شهور إضافية.
				يتم تحديد ما إذا كان هناك:
				* وجود الأعراض مع حالة مزاجية اكتئابية: سيطرة حالة مزاجية سيئة، اندفاع واهتياج، ومشاعر باليس.
				* وجود الأعراض مع القلق: سيطرة العصبية والهم والانفجار Heriness (أو قلق الانفصال).

		<ul style="list-style-type: none"> * وجود الأعراض مختلطة بالقلق والمزاج الاكتئابي: سيطرة خليط من الاكتئاب والقلق
		<ul style="list-style-type: none"> * وجود الأعراض مع اضطراب في السلوك (التصرف) وسيطرة اضطراب الانفعال Conduct.
		<ul style="list-style-type: none"> * وجود الأعراض مع اضطراب في الحالة الانفعالية والسلوك وسيطرة كلا من الأعراض الانفعالية (مثل الاكتئاب أو القلق) واضطراب السلوك (التصرف).
		<ul style="list-style-type: none"> * وجود الأعراض غير المحددة: للاستجابات سيئة التوافق للشخص، والتي لا يمكن تصنيفها كأحد الأنماط الفرعية المحددة لاضطراب التوافق.
		<p>اضطرابات أخرى محددة للصدمة والاضطرابات ذات الصلة بالضغط:</p> <ul style="list-style-type: none"> - حيث لا ينطبق أي من الأعراض السابقة التي تميز اضطراب الصدمة واضطراب الضغوط ومثال ذلك :
		<ul style="list-style-type: none"> ١- الاضطرابات المماثلة لعدم التوافق مع تأخر في بداية ظهور الأعراض والتي تحدث بعد ٣ شهور على الأقل (بعد وجود الظروف الضاغطة)
		<ul style="list-style-type: none"> ٢- الاضطرابات المماثلة لعدم التوافق مع استمرار لأكثر من ٦ شهور مع عدم توажд الضغوط.
		<ul style="list-style-type: none"> ٣- النوبات العصبية.
		<ul style="list-style-type: none"> ٤- أعراض ثقافية أخرى.
		<ul style="list-style-type: none"> ٥- اضطراب مستمر ومركب لموت عزيز :
		<ul style="list-style-type: none"> ٦- يتميز هذا الاضطراب بحزن شديد ومتواصل.
		<p>اضطراب صدمة وضغوط غير محددة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - حيث لا تتطبق الأعراض على الاضطرابات السابقة، والشدة دون المطلوب أو أن هناك نقص في المعلومات (مثل الوجود في عيادة الطوارئ).

الاضطرابات الجسمية والاضطرابات ذات الصلة

الأعراض الجسمية والاضطرابات المرتبطة بها

Somatic symptoms and related disorders

٤	٣	٢	١	محكات التشخيص: الأعراض الجسمية والاضطرابات المرتبطة بها
				أ - واحد أو أكثر من الأعراض الجسمية التي تسبب الكدر أو ينبع منها خلاً كبيراً في الحياة اليومية
				ب - أفكار ومشاعر وسلوكيات متزايدة ترتبط بالآعراض الجسمية وترتبط بالقلق على الصحة كما تبدو في واحد على الأقل من الأعراض التالية:
				١ - أفكار غير مناسبة ومستمرة (متواصلة) حول خطورة الأعراض التي يعانيها الفرد
				٢ - مستوى مرتفع ومستمر من القلق حول صحة الشخص أو الأعراض التي يعانيها
				٣ - تكرис وقت وطاقة كبيرين لهذه الأعراض والقلق على الصحة.
				ت - بالرغم من أن أي من هذه الأعراض الجسمية قد لا يتواجد بشكل مستمر إلا أن حالة الاهتمام والقلق تظل موجودة (الفترة تزيد عن ٦ أشهر). حدد ما إذا كان الاضطراب مصاحب بآل مسيطر وهذا التحديد للأفراد الذين لديهم أعراض جسمية مسيطرة تشمل الألم
				- حدد ما إذا كان: الاضطراب خفيف أو متوسط أو شديد
				- حدد ما إذا كان هناك مسار متواصل يتميز بشدة الأعراض والعجز الملحوظ ولمدة طويلة (أكثر من ٦ شهور).
				- حدد ما إذا كان يسبقه زمنياً اضطراب الألم النفسي.

				- حدد شدة المرض ما إذا كان خفيفاً (عرضين فقط من المحك بـ)، أو متوسط (أكثر من عرضين)، أو شديد (أكثر من عرضين بالإضافة إلى شكاوى جسمية متعددة) أو (عرض واحد مصحوب بعرض جسمى شديد للغاية)
--	--	--	--	--

اضطراب القلق من المرض Illness anxiety disorder

				اضطراب القلق من المرض
٤	٣	٢	١	
				أ - الانشغال بالتأكد من أن يكون مصاباً أو سيصاب بمرض خطير
				ب - أعراض جسمية غير موجودة أو، إذا وجدت، تكون متوسطة الشدة فقط. وإذا كان توجد حالة طيبة أو خطورة عالية للإصابة بمرض طبي (مثل، وجود تاريخ عائلي قوي) فإن الانشغال يكون متزايد وغير مناسب بشكل واضح (مع المرض المفترض).
				ج - وجود مستوى مرتفع من القلق على الصحة، ويكون الشخص منتبه بشدة لحالته الصحية
				د - يؤدي الفرد سلوكيات متزايدة مرتبطة بالصحة (مثلاً، يراجع الفرد جسمه بشكل متكرر لقصصي علامات المرض) أو (العكس) يظهر تجنباً غير تكيفي (مثل تجنب مواعيد الطبيب والذهاب إلى المستشفيات)
				ه - الانشغال بالمرض يظل مستمراً لمدة أكثر من ستة أشهر، لكن المرض المحدد الذي يخاف منه قد يتغير عبر هذا الوقت
				و - هذا الانشغال المرتبط بالمرض لا يفسر بشكل أفضل بواسطة اضطراب نفسي آخر مثل، اضطراب الأعراض الجسمية، اضطراب الهلع، اضطراب القلق المعمم، اضطراب عدم التناقض الجسدي، اضطراب الوسواس القهري، الاضطراب التوهمي، الجسدي النوع

				حدد ما إذا كان: النمط الساعي للعلاج كالذهاب للأطباء أو إجراء التحاليل الطبية أو (العكس) أي النمط المتجنب للعلاج
--	--	--	--	---

الاضطراب التحولي (اضطراب الأعراض العصبية الوظيفية)
(Conversion disorder Functional Neurological symptom disorder)

الاضطراب التحولي (اضطراب الأعراض العصبية الوظيفية)	٤	٣	٢	١
أ - واحد أو أكثر من الأعراض التحولية للوظائف الحركية الإرادية أو الحسية.				
ب - نتائج إكلينيكية تقدم دليلاً على عدم الاتساق بين العرض والحالة الطبيعية والعصبية المتعارف عليها				
ج - العرض أو الخلل لا يمكن تفسيره بشكل أفضل بعزوه إلى اضطراب نفسي أو طبي آخر				
د - أن يسبب العرض أو الخلل كدراً مرضياً واضحاً أو اضطراباً في المجالات الاجتماعية أو المهنية أو أي مجال مهم آخر في حياة الفرد أو تتطلب تقييمات (فحوصات) طبية				
حدد ما إذا كان:				
- مصاحباً لوهن أو شلل				
- مع حركات غير طبيعية (ارتفاع أو حركات ضعيفة "واهنة" أو اضطرابات في المشي				
- مع أعراض اضطراب في البصر				
- مع أعراض اضطراب في الكلام				
- مع أعراض التشنج أو في صورة نوبات				
- مع تخدّر أو فقدان الإحساس				
- مع أعراض حسية خاصة (بصرية أو شمية أو اضطراب بالسمع)				
- مع أعراض مختلطة				
- حدد ما إذا كان هناك نوبة حادة (أقل من ٦ شهور) أو				

				متواصلة (تزيد مدتها عن ٦ شهور)
				- حدد ما إذا كانت مصحوبة بضغوط نفسية أو لا يصاحبها ضغوط نفسية

العوامل النفسية المؤثرة في الحالات الطبية الأخرى:

؟	٤	٣	٢	١	العوامل النفسية المؤثرة في الحالات الطبية الأخرى
					أ - وجود حالة أو عرض طبي (خلاف الأرض طراب النفسي)
					ب - عوامل نفسية أو سلوكية تؤثر في الحالة الطبية بأحد الطرق التالية:
					١- أن تؤثر العوامل على مسار الحالة الطبية كما تبدو في ارتباط قوى مؤقت بين العوامل النفسية وتطور أو تزاييد الحالة الطبية أو تأجيل الشفاء منها
					٢- أن تتدخل هذه العوامل مع العلاج للحالة الطبية (مثل عدم طاعة التعليمات الطبية)
					٣- أن تشكل هذه العوامل مخاطر صحية إضافية للفرد
					٤- أن تؤثر العوامل في الأساس الفسيولوجي المرضي، أو في الأعراض المرسبة (المسببة) أو الظاهرة أو المفاجمة أو تستدعي الانتباه الطبي
					ج- العوامل النفسية والسلوكية في المحك (ب) لا يمكن تفسيرها بشكل أفضل بواسطة اضطراب اضطراب نفسي آخر (مثل، اضطراب الألم، اضطراب الاكتتاب الأساسي، اضطراب كرب ما بعد الصدمة)
					حدد ما إذا كان: خفيف، متوسط، شديد، شديد جدا

الاضطرابات المزيفة (الاخلاقية) factitious disorder

				الاضطرابات المزيفة (الاخلاقية) الملحة بالذات
٤	٣	٢	١	
				أ - تزييف علامات أو أعراض جسمية أو نفسية مرضية أو اختلاق قصة عن التعرض لإصابة أو للمرض ويكون مرتبط بوضوح بخداع محدد
				ب - يقدم الفرد نفسه للأخرين على أنه مريض، أو مصاباً أو مضطرباً
				ج - السلوك الخادع يظل موجوداً حتى في حال غياب المكافآت الخارجية الظاهرة
				د - لا يفسر السلوك بشكل أفضل بعزوه إلى اضطراب نفسي آخر مثل اضطراب التوهمي أو أي اضطراب ذهاني آخر
				حدد ما إذا كانت: نوبة واحدة أو نوبات متكررة

الاضطرابات المزيفة (الاخلاقية) الملحة بالأخرين:

				الاضطرابات المزيفة (الاخلاقية) الملحة بالأخرين
٤	٣	٢	١	
				أ - تزييف علامات أو أعراض جسمية أو نفسية مرضية أو اختلاق قصة عن التعرض لإصابة أو للمرض لشخص آخر ويكون مرتبط بوضوح بخداع محدد
				ب - يقدم الفرد الشخص الآخر (الضحية) للأخرين على أنه مريض، أو مصاباً أو مضطرباً
				ج - السلوك الخادع يظل موجوداً حتى في حال غياب المكافآت الخارجية الظاهرة
				د - لا يفسر السلوك بشكل أفضل بعزوه إلى اضطراب نفسي آخر مثل اضطراب التوهمي أو أي اضطراب ذهاني آخر
				حدد ما إذا كانت: نوبة واحدة أو نوبات متكررة

DSM-4 & DSM-5**الأعراض الجسمية والاضطرابات ذات الصلة الأخرى النوعية:**

٤	٣	٢	١	الأعراض الجسمية والاضطرابات ذات الصلة الأخرى النوعية
				١- اضطراب الأعراض الجسمية القصير: مدة الاضطراب أقل من ٦ أشهر
				٢- اضطراب القلق من المرض القصير: مدة الاضطراب أقل من ٦ أشهر
				٣- اضطراب القلق من المرض بدون سلوكيات زائدة مرتبطة بالصحة
				٤- الحمل الكاذب: اعتقاد خاطئ بالحمل يرتبط بعلامات موضوعية دالة على الحمل

الأعراض الجسمية والاضطرابات ذات الصلة غير النوعية:

٤	٣	٢	١	الأعراض الجسمية والاضطرابات المرتبطة بها غير النوعية
				وهي اضطرابات الأعراض الجسمية وتسبب ضيقاً أو احتلالاً في المجال الاجتماعي أو المهني أو مجال هام آخر من حياة الفرد ولا تكفي لتشخيص أي من الأعراض الجسدية والاضطرابات المرتبطة بها السابقة.

اضطرابات الشخصية

اضطراب الشخصية هو سلوكيات ثابتة تتسم بالانحراف عن السلوك السوي، حيث يدرك الفرد ذاته والآخرين والأحداث بصورة غير مماثلة لأفراد الثقافة التي يعيش فيها الفرد. وتتسم سلوكاته بالانفعال الشديد وعدم تناسبها مع المواقف والأحداث والأشخاص الذين يتعاملون معه. كما يتسم بعلاقات سيئة ومتورطة دائمة مع الآخرين، كما أن الفرد لا يستطيع إيقاف اندفاعاته وتهوراته وإهانته أو عدوانه تجاه نفسه وتجاه الآخرين.

المعايير العامة لتشخيص اضطرابات الشخصية:

أولاً: نمط دائم من الخبرة الداخلية والسلوك يحيد (يشد) بدرجة كبيرة عن المعايير الاجتماعية والسلوك في ثقافة الفرد. ويتمثل هذا النمط في مجالين أو أكثر مما يأتي:

- ١- المعرفة: وتعلق بطرق إدراك وفهم الذات وفهم الآخرين والأحداث.
- ٢- الوجود: يسود الوجود انفعالات شديدة والتارجح وعدم التمايز مع الموقف.

٣- العلاقات بين الأفراد (علاقات سيئة ومصطنعة مع الآخرين كالأسرة أو الأصدقاء أو الزملاء).

٤- عدم التحكم في الاندفاعات

ثانياً: نمط دائم من التصلب يشمل جميع المواقف الشخصية والاجتماعية يؤدي إلى الشعور بالذعر أو الكرب (الشعور بالضغط النفسي) واحتلال في الأداء الاجتماعي أو المهني

ثالثاً: يتسم هذا النمط بالأزمان (عدة سنوات) والثبات عبر مدى واسع من المواقف الشخصية والاجتماعية. ويمكن تعقب بداية الاضطراب من الماضي بداية من مرحلة المراهقة.

رابعاً: يؤدي الاضطراب إلى كرب جوهري إكلينيكي أو عجز في المجالات الحياتية الهامة مثل الجوانب الاجتماعية والمهنية.. الخ

خامساً: يتم التشخيص بداية من المراهقة وبداية الرشد.

DSM-4 & DSM-5

سادساً: هذه الأعراض لا تتدخل ولا تتطبق على اضطرابات النفسية الأخرى.

سابعاً: هذه الأعراض لا تعزى لأسباب فسيولوجية مثل تعاطي المخدرات أو العاقير الطبية أو إصابة الدماغ.

وتقسام اضطرابات الشخصية إلى ثلاثة فئات: الفئة (أ) الشخصية البارنوية (الهذانية) واضطراب الشخصية الفاصامية، واضطراب الشخصية فاصامية النمط. والفئة (ب) وتتضمن اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، واضطراب الشخصية المستيرية، اضطراب الشخصية الترجسية، واضطراب الشخصية التجنبية. والفئة (ج) وتتضمن اضطراب الشخصية القهرية واضطراب الشخصية الاعتمادية واضطراب الشخصية الوسواسية القهرية، واضطراب الشخصية غير المحددة النوعية.

الفئة (١) من اضطرابات الشخصية**١- اضطراب الشخصية البارانوية (الذهانية)**

؟	٣	٢	١	محكات تشخيص: اضطراب الشخصية البارانوية:
				١- شك شامل في الآخرين وانعدام الثقة فيهم، وتقسير دوافعهم تقسيراً سبيلاً. وبينما منذ مرحلة الرشد المبكرة، يتضح هذا الشك في أربعة أو أكثر مما يلي:
				١- الشك - بدون دليل كاف - أن الآخرين يستغلونه أو يحاولون إيقاع الأذى به وخداعه.
				٢- يشك في إخلاص وولاء الآخرين (الأصدقاء، الزملاء، الأقارب) بحيث يصبحوا موضع تساؤل.
				٣- تجنب الحديث عن نفسه لاعتقاده أن هذه المعلومات قد يستخدمها الآخرون ضده.
				٤- تقسير الملاحظات البريئة بأنها تتضمن معانٍ الإقلال من الشأن أو التهديد.
				٥- لا يغفر أي إهانة أو إساءة.
				٦- يتصور أن الآخرين يعتدون على شخصه وسمعته ويسارع بفعال غاضبة.
				٧- تكرار الشك بدون مبرر في إخلاص زوجته، (أو في إخلاص زوجها).
				ب- لا ينطبق عليها معايير الفصام أو الإضطراب الدورى أو الاكتئاب المصحوب بأعراض ذهانية أو لأى أسباب فسيولوجية أو طبية أخرى
				ج- قد تكون هذه الأعراض بداية للفصام.

٢- اضطراب الشخصية الفصامية

محكات تشخيص: اضطراب الشخصية الفصامية (الانعزالي)				
٤	٣	٢	١	
١- نمط متواصل من العزلة بعيداً عن الناس مع عدم التجاوب الانفعالي في مواقف العلاقات بين الأفراد. ويبظهر في سياقات متعددة. ويتحدد بوجود أربعة أو أكثر من الأعراض الآتية:				
١- العزوف عن التفاعل الاجتماعي وعدم الاستمتاع بالعلاقات الشخصية الحميمة، بما في ذلك أن يكون جزءاً من الأسرة				
٢- التفضيل الدائم للأنشطة الفردية التي تتطلب العزلة				
٣- ضعف الاهتمامات الجنسية				
٤- الاكتفاء بنمط قليل من المتعة هذا إذا قام بـأى نشطة (اجتماعية أو مهنية أو أسرية)				
٥- يفتقر إلى الصداقـة الحمـيمـة (فيـما عـدا الأـقـرـبـاءـ منـ الـدـرـجـةـ الـأـوـلـىـ).				
٦- غير مكترث بالثناء أو النقد من الآخرين.				
٧- يتسـمـ بالـبرـودـ الـانـفـاعـيـ وـتـسـطـحـ الـعـواـطـفـ.				
بـ- لاـيـكـونـ الشـخـصـ مـرـيـضـ بـالـفـصـامـ أوـ الـاضـطـرـابـ الدـورـىـ أوـ الـاكـتـابـ الـذـهـانـىـ أوـ الـذـهـانـ أوـ التـوـحـدـ أوـ كـعـرـضـ لـنـتـائـجـ فـسيـولـوجـيـةـ أوـ طـبـيـةـ				

٣- اضطراب الشخصية فصامية النمط

محكات تشخيص: اضطراب الشخصية فصامية النمط				
٤	٣	٢	١	
١- نمط شامل من العجز الاجتماعي (العلاقات مع الآخرين) وضعف في القدرة على إقامة علاقات حميمية مع الآخرين مع تحريفات (انحرافات) إدراكيّة ومعرفية مع غرابة في السلوك تبدأ في مرحلة الرشد المبكر. ويتحدد هذا النمط بوجود خمسة أو أكثر من الأعراض الآتية:				

تشخيص الاضطرابات النفسية لدى الراشدين: DSM-5

			١- يعتقد أنه محور اهتمام الآخرين، وأنهم يتحدثون أو يتغامزون عنه (مع إستبعاد الهداءات المرجعية كما في (بارانويا))
			٢- الاعتقاد في الخرافات والتخارط والحسنة السادسة والحسن، ولا يتفق ذلك مع المعايير الثقافية الفرعية التي قد تعتقد بالتخارط أو الحسنة السادسة.
			٣- يعتقد أن لديه خبرات إدراكيه غير عادية تشمل أو هاما بدنية (خداع حسي بدني) مثلاً لديه قدرة جنسية غير عادية أو معدة تهضم الظلط (قدرات خارقة).
			٤- غرابة في تفكيره وحديثه (تفاصيل غير مطلوبة، تعقد في الكلام، تداخل في الموضوعات، التحزلق في اللغة واستخدام المحسنات البدعية في اللغة).
			٥- الشك أو الأفكار الإضطهادية.
			٦- عدم ملائمة العواطف للمواقف، وفتور(ضعف) هذه العواطف.
			٧- غرابة أو شذوذ في السلوك والمظهر.
			٨- الافتقار للعلاقات الحميمة (فيما عدا أسرته الأولى).
			٩- قلق اجتماعي متزايد لا يتناقض مع الحميمية السوية مع الآخرين ويميل لأن يرتبط مع مخاوف إضطهادية (بارانويا) وليس بسبب أحکام سلبية عن الذات.
			ب- لا يحدث بسبب الفصام أو الاضطراب الدورى أو الاكتئاب الذهانى أو أي مرض ذهانى آخر أو التوحد
			ج- لا يكون مقدمة للفصام.

الفئة (ب) من اضطرابات الشخصية

١- اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص: اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع
				١- هذه الشخصية تنسق بالفشل في بناء علاقات اجتماعية صحيحة، مع الاندفاعة وغياب الشعور بالذنب مع العجز التام عن الاستفادة من الخبرة السابقة ويتسنم الشخص بميول شديد للعدوان والاستهانة بحقوق الآخرين وإثبات سلوك مضاد للقانون والأعراف في المجتمع. ويجب أن يتتوفر لدى الفرد ثلاثة أو أكثر من الأعراض التالية:
				٢- العجز عن الامتثال للمعايير الاجتماعية المتعلقة بالسلوكيات الجائزة قانونياً (والإتيان بالسلوك الإجرامي مما يعرضه للوقوع تحت طائلة القانون)
				٣- الميل إلى الخداع والغش. ويظهر ذلك في تكرار الكذب والاحتيال على الآخرين والظهور بمظهر الرجل الطيب والمثالي بهدف تضليل الآخرين.
				٤- الاندفاع والعجز عن التخطيط للمستقبل.
				٥- التهيج والعدوانية التي تتعدد في تكرار الشجار أو الاعتداء البدني على الآخرين.
				٦- التهور والاستهانة بسلامة نفسه أو الآخرين.
				٧- التحرر من المسئولية كما يتمثل في فشله المتكرر في الاستمرار في عمل واحد.
				٨- العجز عن الوفاء بالتزاماته المالية.
				٩- غياب الشعور بالذنب والتندم، كما يظهر ذلك في عدم الاكتراث بمشاعر الآخرين وتبرير إياذتهم.
				ب- بشرط ألا يقل عمر الشخص عن ١٨ سنة.
				ج- ويشترط وجود اضطرابات سلوكية لها تاريخ مرضي قبل سن الخامسة عشر.

				د - الاضطراب ليس بسبب الفحص أو الاضطراب الدوري
--	--	--	--	---

٢- اضطراب الشخصية البنية

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص: اضطراب الشخصية الحدية:
				أ - نمط عام دائم من التقلب وعدم الثبات في العلاقات مع الآخرين، وكذلك فيما يتعلق بصورة الذات والعواطف مع الاندفاع الشديد (في السلوك والوجودان) ويبداً في مرحلة الرشد المبكر، ويظهر في خمسة بنود أو أكثر مما يلى:
				١- جهود متلاحقة ومستمرة لتجنب هجر الآخرين له سواء أكان حقيقاً أو متخيلاً.
				٢- التقلب ما بين التطرف في التقديس والتطرف في التحقير (متلماً يحدث في الحب أو الصداقة بين شخصين).
				٣- تذبذب كبير في صورة الذات ما بين التقدير إلى الانقصاص والتقليل من الشأن أو السلوك المشوه للذات.
				٤- الاندفاعية في مجالين على الأقل مثل التبذير أو الجنس أو تعاطي المخدرات أو القيادة المتهورة أو الأكل بشهادة، وجميعهم قد يحدثوا إضراراً بالفرد.
				٥- تكرار السلوك الانتحاري أو التهديد بالانتحار أو تشويه الذات.
				٦- التقلب الوجداني مثل نوبات شديدة من تغير المزاج أو الاستثارة أو القلق الذي يستمر عاده لبعض ساعات ونادراً ما يستمر لأيام قليلة.
				٧- مشاعر مزمنة بأنه فارغ داخلياً.
				٨- غضب شديد لا مبرر له وصعوبة في السيطرة على الغضب ويشمل ذلك تكرار الانفعال والغضب الثابت أو ربما الشجار الجسدي المتكسر.

DSM-4 & DSM-5

				٩- تفكير بارانويا (هذاي) مؤقت يظهر عند حدوث ضغوط.
				١٠- أعراض انشقاقية شديدة مثل نسيان تفاصيل الأحداث فيما يتعلق بالموافق الضاغطة.

٣- اضطراب الشخصية الهيستيرية

محكّات تشخيص: اضطراب الشخصية الهيستيرية:			
٤	٣	٢	١
			١- حب الظهور وجذب الانتباه والانفعال المفرط، تبدأ في الرشد المبكر وتوجد في عدة سياقات وتنبني في خمسة (أو أكثر) مما يأتي:
			١- الشعور بالضيق حين لا يكون محظوظاً بنظر الآخرين.
			٢- سلوك يتسم بالإثارة والانفعال أو إغراء جنسي (غير ملائم) للآخرين.
			٣- تحول سريع من الحب إلى الكراهة.
			٤- عدم اهتمام وضحللة في التعبير عن العواطف.
			٥- يهتم بالظهور الجسمى والملابس بصورة مفرطة.
			٦- يحاول التأثير في الآخرين - لجذب الآخرين - لإقناعهم بوجهة نظره (التي قد لا يجانبها الصواب).
			٧- استعراض مع مبالغة في الانفعال.
			٨- يسهل التأثير عليه من الآخرين.
			٩- يعتقد أن علاقاته قوية بالآخرين (مع أن ذلك غير واقعي).

٤- اضطراب الشخصية النرجسية

محكات تشخيص: اضطراب الشخصية النرجسية:				
٤	٣	٢	١	
				أ - نمط دائم من الشعور بالعظمة والتضخم (في الخيال أو السلوك)، وال الحاجة للاعجاب ونقصان التعاطف مع الآخرين وبدأ في مرحلة الرشد المبكر ويظهر في عدة سياقات كما يتبيّن في خمسة أو أكثر مما يلى:
				١- لديه شعور بالعظمة لأهمية الذات (مثلاً يضخم من إنجازاته و عقريته، ويتوقع أن يعترف به كمنتفوق مع أن إنجازاته عادية وليس عقريّة كما يعتقد).
				٢- يشغل بخيالاته إنجازاته الكبيرة أو قوته أو لمعانه أو جماله أو حبه المثالي (الذى لا مثيل له في العالم).
				٣- يعتقد أنه مميز و فريد وأنه يتقاهم فقط مع كبار القوم أو كبار السياسيون والمفكرون.
				٤- يطلب اعجاب متزايد من الآخرين.
				٥- لديه حس بالتأهل (أو التلقيب)، مثلاً توقعات غير مبررة وغير منطقية لطريقة علاج مفضلة بصفة خاصة، أو طاعة عمياء لتوقعاته (غير المنطقية والمبالغ فيها).
				٦- يمهد لعلاقات مع الآخرين (الاحتياط على الآخرين لتحقيق نجاحات لنفسه).
				٧- نقص التعاطف ولا يرغب في الاعتراف بمشاعر واحتياجات الآخرين.
				٨- يحسد الآخرين غالباً أو أن الآخرين يحسدونه. يظهر الكبر وسلوكيات واتجاهات منغطرسة.

الفئة (ج) من اضطرابات الشخصية

١- اضطرابات الشخصية التجنبية

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص: اضطراب الشخصية التجنبية:
				يتسم أصحابها بعدم الاعتناء بالعلاقات الاجتماعية، ويسعى بقلة الحيلة ويرى سلبياً على نفسه والحساسية الاجتماعية، وينبأ في مرحلة الرشد المبكر، ويتبين في أربعة (أو أكثر) مما يأتي:
				١- يتجنب الاحتكاك بالآخرين (حتى في العمل) خشية من النقد أو اللوم ز.
				٢- لا يندمج بسهولة مع الآخرين إلا إذا وثق أنهم يهتمون به.
				٣- يتجنب العلاقات الحميمة (مثل الحب) لخوفه من الخزي والسخرية.
				٤- يخشى النقد أو الرفض من الآخرين.
				٥- يشعر بقلة الحيلة وضعف في المواقف الاجتماعية الجديدة.
				٦- شعور بالنقص والدونية (وأنه غير جذاب).
				٧- يخشى الاشتراك في أي نشطة اجتماعية أو مهنية لاحتمال الحرج.

٢- اضطراب الشخصية الاعتمادية

٤	٣	٢	١	محكات تشخيص: اضطراب الشخصية الاعتمادية
				١- يتوقع وينتظر الرعاية من الآخرين دائماً، ويؤدي ذلك لسلوك خضوع وخوف من انقطاع الرعاية، وينبأ في مرحلة الرشد المبكر، ويتبين في خمسة (أو أكثر) مما يأتي:
				١- ينتظر النصائح عند اتخاذ قرارات يومية عادلة.
				٢- يعتقد تحمل الآخرين لسلوكياته وأفعاله.

				-٣ لا يعارض الآخرين (الأسر، أو الرؤساء في العمل) غالبا خوفا من فقدان المساندة والاستحسان.
				-٤ نقص في الثقة بالنفس عند الحكم على الأمور.
				-٥ ينتظر ويتوقع دائما طلب الرعاية والعون من الآخرين حتى لو أدى لأشياء بغيضة (تقديم تنازلات غير مبررة قد تمس الأخلاق أو القيود المتعارف عليها في ثقافة الفرد).
				-٦ يشعر بقلة الحيلة والعجز عندما يكون وحده.
				-٧ يسعى لتكوين علاقة أخرى للرعاية عندما تقطع صلاته الحميمة مع من يرعونه.
				-٨ عقله مشغول دائما باحتمال أن يكون وحيدا بدون رعاية.

٣- اضطراب الشخصية الوسواسية

١	٢	٣	٤	محكات تشخيص: اضطراب الشخصية الوسواسية
				١- الانشغال المفرط بالنظام والترتيب والسعى نحو الكمال وذلك على حساب المرونة، ويبداً مع مرحلة الرشد المبكر. ويتبيّن في أربعة (أو أكثر) مما يأتي:
				١- يشغل بالتفاصيل والتنظيم، بحيث ينحرف عن أهدافه الرئيسية (لا ينجذب المهمة بسبب انشغاله بالتفاصيل).
				٢- الرغبة في الكمال (وهذا مستحب للبشر).
				٣- انشغال مفرط ونام للعمل والإنتاج على حساب حياته الاجتماعية.
				٤- يقط الضمير بدرجة مفرطة.
				٥- متصلب في الموضوعات الأخلاقية والقيم.
				٦- يؤدي عمله بنفسه (لأنه لا يثق باداء الآخرين).
				٧- بخيل مع نفسه ومع الآخرين.
				٨- متصلب وعنيف.

اضطراب الشخصية غير المحدد :

هذه فئة لا تستوفى معايير اضطرابات الشخصية السابقة، فقد يوجد (مثلاً أكثر من اضطراب شخصية للفرد، أو وجود عرض واحد للرغبة في الكمال مثلاً) يحيل حياة الفرد إلى جحيم، وهذه الأعراض تجعل الفرد غير متكيف وتأثر على حياته المهنية والاجتماعية.

وتتضمن هذه الفئة اضطراب الشخصية الاكتابية واضطراب الشخصية العدوانية - السلبية.

يعرض هذا الكتاب

لحكات تشخيص الاضطرابات النفسية بصورة مبسطة بحيث يسهل على المختص في علم النفس والطب النفسي الوصول إلى التشخيص الدقيق بأبسط الطرق . ويعرض الكتاب لحكات التشخيص كما وردت في الدليلين:

DSM-4 & DSM-5

وهناك اختلافات جوهرية بين تصنيف الاضطرابات في الدليلين وصدور الدليل الخامس لا يجعلنا نستغنى عن الدليل الرابع وهناك اعتراضات كثيرة وجوهرية من كثير من الأطباء النفسيين وأخصائي علم النفس على الدليل الخامس وهناك توقع صدور نسخة جديدة معدلة في القريب العاجل

وقد قدم المؤلفون طريقة جديدة لحساب الدرجات عند تشخيص الاضطرابات النفسية تعتمد على الوزن النسبي للبند وقد حاولنا المزج بين المنهج الظيفي وعلم النفس ونعتقد أن ذلك يساعد في دقة تشخيص الاضطرابات النفسية كما أظهرتها الدراسة التي أجريناها وعرضنا لها في هذا الكتاب .

ISBN 978-977-05-2876-1



مكتبة الأنجلو المصرية
THE ANGLO-EGYPTIAN BOOKSHOP
<http://www.anglo-egyptian.com>